
Modelos Estocásticos (INDG-1008): Tarea 01

Semestre: 2017-2018 Término I

Instructor: Luis I. Reyes Castro

Instrucciones: Por favor entregue todas sus soluciones menos el código fuente de manera escrita en un solo archivo en formato PDF de acuerdo al siguiente formato:

`apellido1_apellido2.tarea_01.pdf`

Además, por favor entregue todas las funciones en Python que se le soliciten en un solo archivo de acuerdo al siguiente formato:

`apellido1_apellido2.tarea_01.py`

Problema 1.1. Un fabricante tiene una máquina complicada. Al comienzo de cualquier día, si la máquina funciona bien entonces con probabilidad p la misma estará descompuesta para el final del día y pasará el resto del siguiente día en reparación. Modele esta situación como una cadena de Markov con tres estados y construya la matriz de transición de la cadena en función de p . Además, determine el porcentaje promedio de utilización de la máquina.

Problema 1.2. En el problema anterior, suponga que el fabricante tiene una máquina de repuesto que utiliza solamente cuando la máquina principal está descompuesta. Similar al caso de la máquina principal, si la máquina de repuesto está funcionando bien entonces con probabilidad q se descompondrá antes del final del día y requerirá un día entero para reparar. Modele esta situación como una cadena de Markov con y construya la matriz de transición de la cadena en función de p y q . Provea el grafo de la cadena. No necesita calcular probabilidades en estado estable.

Problema 1.3. Suponga que usted trabaja en una concesionaria de maquinaria de construcción. Usted ha sido encargado con calcular el costo de la garantía de tres años para excavadoras que ofrece la empresa. De los archivos del departamento de ventas, usted ha podido observar que:

- Solo el 2% de los clientes piden la garantía en el primer año.
- El 5% de los clientes que no tuvieron problemas con su máquina en el primer año piden la garantía en el segundo año.
- El 9% de los clientes que no tuvieron problemas con su máquina en el primer y segundo año piden la garantía en el tercer año.

Suponiendo que cada excavadora se vende en 200 mil dólares, calcule el costo promedio de una garantía de tres años.

Problema 1.4. Suponga que usted ha sido encargado con del manejo del inventario de algunos productos no-perecederos en un supermercado que abre todos los días a sus clientes por la misma cantidad de tiempo. Para mantener una consistencia en el manejo de inventario a través de los varios productos que se venden en el supermercado, el gerente ha dispuesto que todos los inventarios se controlen mediante políticas de punto de reposición.

Más precisamente, al final de cada día se cuenta el inventario del producto y si este es menor o igual a I_{rep} unidades se hace un pedido de reposición por Q_{rep} unidades al proveedor, el cual es entregado por el mismo al comienzo del siguiente día antes de la hora de apertura de la tienda; caso contrario, no se hace un pedido de reposición. Fíjese que bajo estas suposiciones

el máximo inventario posible es:

$$I_{max} = I_{rep} + Q_{rep}$$

Adicionalmente, como es de costumbre en este campo de estudio, usted hace la suposición simplificatoria que las demandas del producto D_1, D_2, \dots constituyen una secuencia de variables aleatorias i.i.d. con distribución Poisson con parámetro λ . Más aún, si para cada día t denotamos a I_t como el inventario a la hora de apertura de la tienda del t^{avo} día, a D_t como la demanda del día, *i.e.*, la cantidad que se vendería ese día si el inventario fuere inagotable, a R_t como la cantidad repuesta entre la noche del t^{avo} día y la hora de apertura del $(t+1)^{\text{avo}}$ día, tenemos que:

$$I_{t+1} = \max\{0, I_t - D_t\} + R_t; \quad R_t = \begin{cases} Q_{rep}, & \text{si } 0 \leq I_t \leq I_{rep}; \\ 0, & \text{caso contrario;} \end{cases}$$

Con todo esto en mente, para cada problema de manejo de inventario con demanda λ y política de punto de reposición (I_{rep}, Q_{rep}) podemos construir una Cadena de Markov en $n = I_{max} + 1$ estados. Más precisamente, los estados serían: Cero unidades en inventario, una unidad en inventario, dos unidades en inventario, y así sucesivamente, hasta I_{max} unidades en inventario.

Primera Actividad: (X Puntos)

Escriba una función en Python que tome como entrada (1) el parámetro λ de la distribución Poisson de la demanda, (2) el inventario de reposición I_{rep} y (3) la cantidad por reposición Q_{rep} , y que produzca como única salida la matriz de transición de la cadena de Markov correspondiente como un arreglo `numpy` de tamaño (n, n) . Por favor defina el nombre de su función como `construye_mat_inventario`. Por ejemplo, yo usaría mi función así:

```
1 import numpy as np
2 from reyes_castro_tarea_01 import construye_mat_inventario
3 # Entradas:
4 lambda_dem = 6.9 # Parametro de la demanda
5 I_rep = 5 # Inventario de reposicion
6 Q_rep = 5 # Cantidad por reposicion
7 # Salida: Matriz de probabilidad de la Cadena de Markov
8 P = construye_mat_inventario( lambda_dem, I_rep, Q_rep)
```

Sugerencia: Para hacerse la vida más fácil a la hora de calcular probabilidades le recomiendo que utilice la función `poisson.pmf()` de la librería `scipy.stats`. Click aquí para más información. Por ejemplo:

```
1 from scipy.stats import poisson
2 # Le asignamos a 'prob' la probabilidad de que una
3 # variable aleatoria Poisson con parametro mu = 4.8
4 # tome el valor k = 3
5 prob = poisson.pmf( mu = 4.8, k = 3)
```

Segunda Actividad: (Y Puntos)

Construya la matriz de transición para el problema para cada uno de los siguientes casos:

Caso	λ	I_{rep}	Q_{rep}
Producto A - Política 1	1.6	3	2
Producto A - Política 2	1.6	1	4
Producto B - Política 1	4.1	2	5
Producto B - Política 2	4.1	4	3

Por favor presente sus matrices como tablas con los decimales redondeados a tres dígitos.

Nota: Usted puede llevar a cabo esta actividad aún sin haber realizado la primera.

Tercera Actividad: (Z Puntos)

Calcule la distribución en estado estable para cada uno de los cuatro casos de la actividad anterior. Por favor presente sus resultados en dos tablas separados, una para cada producto, de tal manera que se pueda apreciar la influencia de la política de manejo de inventario sobre la distribución estacionaria de la cadena.

Cuarta Actividad: (W Puntos)

Para comparar las políticas necesitamos una función de utilidad. En nuestro caso, la función de utilidad será la diferencia entre la utilidad neta por ventas y el costo de retención de la mercadería. Si para cualquier día definimos a la variable aleatoria D como la demanda de ese día, a la variable aleatoria V como el número de unidades que se venderán ese día, a u como la utilidad neta por unidad del producto vendido, y a c como el costo de retención por unidad del producto por día, entonces la utilidad diaria de un nivel de inventario $I \in \{0, 1, \dots, I_{max}\}$ se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Utilidad}(I) = u \mathbb{E}[V] - cI; \quad V = \min\{D, I\}$$

Con esto en mente, es evidente que podemos evaluar el desempeño de una política ponderando las utilidades de los niveles de inventario por la distribución en estado estable de la cadena de Markov correspondiente:


$$\text{Utilidad (Política)} = \sum_{I=0}^{I_{max}} \pi^*(I) \text{Utilidad}(I)$$

Finalmente, suponiendo que el Producto A tiene una utilidad neta por unidad de $u = \$1.25$ y un costo de retención por unidad por día de $c = \$0.10$, calcule la utilidad de cada una de las dos políticas propuestas e indique cuál de las dos es mejor. Luego repita el ejercicio para el Producto B suponiendo que $u = \$0.60$ y que $c = \$0.08$.

Problema 1.5. Considere un conjunto de instalaciones industriales vigiladas por robots como se muestra en la figura de abajo. En cada instalación, el robot empieza en un área aleatoria y hace transiciones a otras áreas adyacentes (o a la misma área) con probabilidad uniforme.

Primera Actividad: (X Puntos)

Escriba una función en Python que tome como entrada (1) el número k de filas del arreglo que representa a la instalación, (2) el número ℓ de columnas del mismo arreglo y (3) una lista de 2-tuplas que especifica (en cualquier orden) los índices de los pares de áreas que definen las paredes internas de la instalación, y que produzca como única salida la matriz de transición de la cadena de Markov correspondiente como un arreglo `numpy` de tamaño (n, n) , donde $n = k\ell$.



Por favor defina el nombre de su función como `construye_mat_robot`. Por ejemplo, para la geometría de la Instalación A, yo usaría mi función así:

```

1 import numpy as np
2 from reyes_castro_tarea_01 import construye_mat_robots
3 # Entradas:
4 k = 4 # Numero de filas
5 l = 5 # Numero de columnas
6 paredes = [ (14,24), (15,25), (21,31), (22,32), (22,23), \
7 (31,32), (33,34), (32,42), (34,44) ] # Lista de paredes
8 # Salida: Matriz de probabilidad de la Cadena de Markov
9 P = construye_mat_robots( k, l, paredes)

```

Segunda Actividad: (X Puntos)

Para las dos instalaciones mostradas en la figura, compute la frecuencia de visitas a las áreas de la instalación y preséntelas como un mapa de calor. Adicionalmente, indique cuáles son las áreas más seguras y las áreas más vulnerables.

Tercera Actividad: (X Puntos)

Empezando con la política aleatoria uniforme, modifique las probabilidades de transición del robot del tal manera que su distribución en estado estable sea ‘tan cerca’ de la distribución inicial como le sea posible. Justifique su proceso e indique cuáles probabilidades de transición fueron incrementadas o disminuidas.