

PhenologyPro

Manual de usuario *User Manual*

AGROCLIMATOLOGÍA Y FENOLOGÍA DE CULTIVOS · AGROCLIMATOLOGY AND CROP PHENOLOGY




maíz
Zea mays



trigo
Triticum aestivum



frijol
Phaseolus vulgaris




jitomate
Solanum lycopersicum




manzano
Malus domestica



café
Coffea arabica




grados-día de un día



los dos términos de la ETo



agua en la zona radical



ventana de siembra

Luis Ángel Barrera-Guzmán

PRIMERA EDICIÓN · 2026 · VERSIÓN 1.0

PhenologyPro

Manual de usuario · Agroclimatología y fenología de cultivos

AUTOR	Luis Ángel Barrera-Guzmán ORCID 0000-0001-8057-2583
PROGRAMA	PhenologyPro, versión 1.0.1 (septiembre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Español o inglés, con el botón ES · EN de la barra superior. En este manual los nombres de botones, campos y menús se escriben como aparecen en pantalla en español, por ejemplo Armar la serie y revisarla → .

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PhenologyPro: plataforma en el navegador para la agroclimatología y la fenología de cultivos* (versión 1.0) [Programa de cómputo]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23004710>

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PhenologyPro. Manual de usuario* (1.^a ed.). Distribuido con PhenologyPro, versión 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23004710>

El DOI de concepto 10.5281/zenodo.23004710 resuelve siempre a la versión más reciente archivada en Zenodo; cada versión tiene además el suyo (la 1.0.1: 10.5281/zenodo.23004711). La cita del programa aparece también en la sección **Cómo citar** de la portada de la app y al final de cada informe del Bloque 10.

I PRIVACIDAD

PhenologyPro funciona por completo dentro de tu navegador. La serie de la estación que abres se lee en tu computadora y **nunca se envía a ningún servidor**. Puedes trabajar con los datos de una estación privada, de un ensayo en curso o de una tesis sin que nada de eso salga de tu equipo. El programa tampoco necesita internet: una vez copiado, funciona con la máquina desconectada.

Las ilustraciones, los diagramas y las capturas de pantalla de este manual son originales: se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. Las seis series climáticas de ejemplo que trae el programa —y con las que se ilustra este manual— son **sintéticas y ficticias**: reproducen el orden de magnitud y la estacionalidad de seis climas de México, pero no son observaciones de ninguna estación real, y así lo dice la app cada vez que se cargan. Los coeficientes de cultivo, las fracciones de agotamiento y los factores de respuesta al agua provienen de las tablas públicas de la FAO (Documentos de Riego y Drenaje 24, 33 y 56); los requerimientos térmicos del catálogo son **orientativos** y el programa insiste en calibrarlos con fechas observadas.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P	Cómo leer este manual	v
In	Introducción a PhenologyPro	1
1.1	¿Qué es PhenologyPro?	2
1.2	Preguntas que responde	2
1.3	Cinco ideas que sostienen el manual	3
1.4	Datos que acepta y qué entrega	4
1.5	Qué necesitas y cómo abrirlo	5
1.6	Recorrido por la interfaz	6
1.7	Los seis climas de práctica	7
1.8	Cómo se recorre un estudio	8
1.9	Lo que el programa no hace	9
1	Inicio: el motor, los laboratorios y la teoría	10
1.1	Lo que se ve al abrir la app	11
1.2	Cómo funciona: los diez pasos	11
1.3	El laboratorio de tiempo térmico	12
1.4	El laboratorio de agua	14
1.5	Qué incluye y para qué sistema de producción	15
1.6	Los veinte métodos y los cinco de ETo, lado a lado	16
1.7	La teoría, en lenguaje claro	18
1.8	Cómo citar y las referencias	19
2	Datos climáticos del sitio	21
2.1	De la estación a la serie	21
2.2	El sitio	22
2.3	La serie diaria: cuatro formas de traerla	23
2.4	Qué columna es cada cosa	24
2.5	El control de calidad	26
2.6	Lo que estos datos permiten	28
2.7	La serie limpia y el proyecto	29
2.8	Los avisos de este bloque	30
3	El clima del sitio	32
3.1	Qué es una normal y de qué años sale	33
3.2	Con qué años y con qué criterios	33
3.3	El clima en una página: el climograma	34
3.4	Las normales mensuales	36
3.5	El régimen de lluvias	37
3.6	Las heladas	38
3.7	Índices, balance climático y clasificación	41
3.8	Los avisos de este bloque	42

4	Grados-día y tiempo térmico	43
4.1	La planta no cuenta días	44
4.3	Desde esa fecha, cada año	45
4.5	Lo que ofrece cada fecha de siembra	48
4.7	Los avisos de este bloque	51
4.2	Cultivo, método y fecha	45
4.4	El calendario térmico del sitio	48
4.6	Cuánto importa el método	49
5	Evapotranspiración de referencia	52
5.1	La demanda de la atmósfera	53
5.3	La ETo del sitio, por cinco métodos	55
5.5	Hargreaves calibrado contra Penman–Monteith	57
5.7	Los avisos de este bloque	59
5.2	Cómo se estima lo que falta	53
5.4	De dónde sale la ETo	57
5.6	Qué ETo usarán los bloques siguientes	59
6	Balance hídrico del cultivo	61
6.1	El suelo como cubeta	62
6.3	El balance en temporal, año por año	64
6.5	El agua según la fecha de siembra	67
6.7	Los avisos de este bloque	69
6.2	Cultivo, suelo y siembra	63
6.4	Por etapa del cultivo	66
6.6	Necesidad climática de riego, por mes	68
7	Calendarización del riego	70
7.1	Cuándo y cuánto	70
7.3	El calendario, año por año	72
7.5	Por mes, diseño y ahorro	76
7.2	Sistema y regla de riego	71
7.4	Cuatro estrategias, lado a lado	74
7.6	Los avisos de este bloque	77
8	Predicción de etapas fenológicas	78
8.1	Fechar la fenología	79
8.3	El calendario fenológico del sitio	80
8.5	El frío invernal	83
8.7	Los avisos de este bloque	86
8.2	Cultivo, requerimientos y siembra	79
8.4	Calibrar con fechas observadas	82
8.6	El fotoperiodo	85
9	Riesgos y escenarios	87
9.1	Qué puede salir mal y cuándo	87
9.3	Helada y golpe de calor por etapa	89
9.5	Escenarios: si el sitio se calienta	92
9.2	Cultivo, umbrales y criterios	88
9.4	La ventana de siembra	91
9.6	Los avisos de este bloque	94
10	Figuras, informe y paquete	95
10.1	Lo que sale de la app	95
10.3	El catálogo de figuras y el estudio de figuras	97
10.5	El paquete reproducible	100
10.2	El estado del estudio	96
10.4	El informe	98
10.6	Antes de entregar	101

A	Los archivos que la app lee y escribe	102	B	Las reglas de decisión, reunidas	104
C	Glosario	105	D	Cuando algo no sale	107
E	Referencias	107	F	La herramienta: licencia y cómo citarla	111

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: diez bloques numerados que se recorren de izquierda a derecha en la barra de arriba. Cada capítulo explica un bloque y lleva su mismo número —el capítulo 5 es el Bloque 5, y sus secciones, figuras y tablas se numeran 5.1, 5.2...—. Cada uno empieza con la idea agroclimática que el bloque necesita, sigue con lo que la pantalla calcula y cómo se lee, y termina con los avisos que el bloque puede mostrar y qué hacer con ellos. Esta introducción no lleva número: sus secciones van como I.1, I.2...

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en el número de cada sección, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice, y es el mismo de la franja de la portada. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Inicio	Portada, el motor agroclimático completo, dos laboratorios que calculan de verdad, veinte métodos, la teoría en lenguaje claro y las referencias
2	Datos climáticos	El sitio, la serie diaria de la estación (pegada, desde archivo o de ejemplo), el papel de cada columna, el control de calidad y el proyecto
3	Clima del sitio	Normales, climograma de Walter–Lieth, régimen de lluvias, heladas con sus fechas al 50, 20 y 10 % de riesgo, índices de aridez, balance climático y Köppen–Geiger
4	Grados-día	Tiempo térmico desde la siembra con seis métodos y cuatro cortes, año por año, el calendario térmico y el mapa por fecha de siembra
5	Evapotranspiración	Penman–Monteith FAO-56 con lo que haya (estimando lo que falta y anotándolo), Hargreaves, Priestley–Taylor, Turc y Thornthwaite, comparados y calibrados
6	Balance hídrico	El balance diario de la zona radical de FAO-56 con la curva de Kc, en temporal, año por año, por etapa y por fecha de siembra; el rendimiento relativo de FAO-33
7	Riego	Cuándo y cuánto regar con la regla que elijas; láminas netas y brutas, cuatro estrategias comparadas, riego por mes, capacidad de diseño y ahorro
8	Fenología	Las etapas BBCH fechadas por tiempo térmico, la calibración con fechas observadas, el frío invernal de los frutales y el fotoperiodo
9	Riesgos y escenarios	Helada y golpe de calor por etapa, la ventana de siembra que junta calor, agua y heladas, y los escenarios de +1, +2 y +3 °C
10	Informe	El catálogo de figuras hasta 900 ppp, el informe que se abre en cualquier navegador y el paquete .zip que reproduce el estudio

Tipos de recuadros

! NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

! IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

⊖ TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un cálculo, sin fórmulas innecesarias.

▶ EJEMPLO

Un caso con los datos incluidos en el programa, paso a paso.

✓ REGLA DE DECISIÓN

Si el resultado cae en este caso... **entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: lo que sabes del cultivo, del cultivar y de la parcela siempre manda.

0.16

DATO CLAVE

Una cifra o un hecho que conviene recordar; por ejemplo, el coeficiente kRs con que FAO-56 estima la radiación a partir de la amplitud térmica en un sitio interior.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Armar la serie y revisarla →	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla en español.
Bloque 5 › Qué ETo usarán los bloques siguientes	Una ruta: abre lo primero y dentro busca lo segundo.
tmax, .csv	Un nombre de columna, de archivo o un valor que se escribe tal cual.
ETo, ETc, Kc, ADT, AFA · ETo, ETc, Kc, TAW, RAW	Siglas en español; entre paréntesis, cuando ayuda, la sigla inglesa de la literatura (la app en inglés usa las segundas).
1,450 °C·d · 3.74 mm/día · 20 may	Grados-día con el punto de multiplicación, láminas en milímetros, fechas con el día y el mes abreviado, como en la app.
P20 · P80 · mediana	Los percentiles 20 y 80 entre los años del registro y el valor central: la app resume así casi todo lo que calcula año por año.
● ◐ —	Disponible · disponible en parte o con condiciones · no aplica.

! LAS CIFRAS DE ESTE MANUAL

Todos los resultados que aparecen en el texto se obtuvieron corriendo la app con la serie de ejemplo «**Bajío semiárido (1 800 m)**», **20 años, sin errores sembrados**, y se copiaron de la pantalla. Si repites los pasos con esa misma serie, debes ver los mismos números: los ejemplos se generan con una semilla fija y todos los cálculos son deterministas. Cuando un capítulo usa otra serie —el «Valle templado» para las heladas y el frío invernal, o el ejemplo con errores sembrados para el control de calidad— lo dice antes de dar la cifra.

In

INTRODUCCIÓN · ANTES DE LOS BLOQUES

Introducción a PhenologyPro

Qué es el programa, qué preguntas de la agroclimatología y la fenología responde, qué datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las cinco ideas que sostienen todo lo demás —la planta cuenta calor, la atmósfera pide agua, el suelo es una cubeta, el registro es la probabilidad y lo que no se mide se estima y se declara— y una lista honesta de lo que el programa no hace.

I.1 ¿Qué es PhenologyPro?

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

I.7 Los seis climas de práctica

I.9 Lo que el programa no hace

I.2 Preguntas que responde

I.4 Datos que acepta y qué entrega

I.6 Recorrido por la interfaz

I.8 Cómo se recorre un estudio

1.1 ¿Qué es PhenologyPro?

PhenologyPro es una plataforma para hacer el estudio agroclimático de un sitio y el calendario de un cultivo **de la serie de la estación al informe**: limpia los datos diarios, describe el clima, acumula el calor que la planta necesita, calcula cuánta agua pide la atmósfera y cuánta queda en el suelo, arma el calendario de riego, fecha las etapas fenológicas, cuenta el frío del invierno, mide el riesgo de helada y de calor, encuentra la ventana de siembra, prueba qué pasaría con un clima más cálido y entrega un informe con figuras, métodos redactados y un paquete que lo reproduce.

Todo ocurre dentro del navegador. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Está escrito para agrónomos, tesistas y técnicos de campo: sabe que una estación casi nunca mide radiación ni humedad y que aun así hay que calcular la evapotranspiración; que la respuesta a «¿cuándo siembro?» no es una fecha sino una probabilidad; que un requerimiento térmico sacado de un manual extranjero hay que calibrarlo con las fechas de la propia parcela; y que el resultado de un estudio se defiende con el número, con la figura y con el método escrito, no con la pantalla.




Figura 1.1. El camino de un estudio agroclimático a través de los bloques. La serie de la estación alimenta todo; de la temperatura salen el calor y la fenología, de la temperatura con la humedad, el viento y la radiación sale el agua; los riesgos cruzan las tres cosas y el informe recoge lo que se calculó. El lazo de arriba es la parte más usada del programa: cambiar un dato o un parámetro y ver cómo se rehace lo que depende de él.

1.2 Preguntas que responde

Cada bloque de la app contesta una pregunta que un productor, un asesor o un tesista se hace de verdad. Estas son, en el orden en que se recorren:

Bloque	La pregunta	Con qué la contesta
2	¿Sirven mis datos? ¿Qué me permiten calcular?	Lectura de la serie, control de calidad, cobertura por variable y la lista de lo que esos datos permiten
3	¿Cómo es el clima de este sitio? ¿Cuándo llueve, cuándo hiela?	Normales, climograma, inicio y fin de las lluvias, fechas de helada al 50, 20 y 10 % de riesgo, índices y clasificación
4	¿Cuánto calor junta el cultivo desde esta fecha? ¿Le alcanza para madurar?	Grados-día año por año, días a la meta con su dispersión, mapa por fecha de siembra
5	¿Cuánta agua pide la atmósfera aquí? ¿Me frío de la ETo sin radiación ni humedad?	Penman—Monteith con lo que haya, cuatro métodos simples, calibración local y la frase que dice qué se estimó
6	En temporal, ¿cuánta agua le falta al cultivo y cuánto rendimiento pierde?	Balance diario de la zona radical, días con estrés, rendimiento relativo de FAO-33 por año y por etapa
7	¿Cuándo y cuánto regar? ¿Qué capacidad necesita el sistema?	Calendario con la regla que elijas, láminas netas y brutas, cuatro estrategias, ETo máxima de diseño y ahorro contra la costumbre
8	¿Cuándo florece y cuándo madura? ¿Junta el invierno el frío que el frutal necesita?	Etapas BBCH fechadas por tiempo térmico con su dispersión, calibración con fechas observadas, porciones de frío, unidades Utah y horas frío
9	¿Cuándo conviene sembrar para que todo salga bien a la vez? ¿Y si el clima se calienta?	Helada y calor por etapa, la ventana de siembra con una sola probabilidad de éxito, escenarios de +1, +2 y +3 °C
10	¿Cómo entrego esto en una tesis, un artículo o un dictamen?	Figuras en el formato y la resolución que pidan, informe con métodos redactados y referencias, paquete reproducible

1.3 Cinco ideas que sostienen el manual

No hace falta saber agroclimatología para usar la app, pero hay cinco ideas que vuelven una y otra vez. Entenderlas hace que los resultados dejen de ser números y se vuelvan argumentos.

1. La planta no cuenta días: cuenta calor

El desarrollo de un cultivo —emerger, echar hojas, florecer, madurar— avanza con la temperatura, no con el calendario. Un maíz sembrado en abril en un valle fresco y otro sembrado en mayo en el Bajío no maduran a los mismos días, pero sí tras acumular más o menos los mismos **grados-día**: la suma, día tras día, de lo que la temperatura media excede de una **temperatura base** por debajo de la cual la planta no crece. Por eso la app fecha las etapas por tiempo térmico, por eso la misma fecha de siembra da calendarios distintos en años distintos, y por eso el requerimiento de una etapa se puede medir en la propia parcela con dos o tres años de fechas observadas.

2. La atmósfera pide agua; el cultivo modula cuánta

La **evapotranspiración de referencia** (ET_o) es cuánta agua evaporaría y transpiraría un pasto bien regado bajo el clima del sitio: depende de la radiación, la temperatura, la humedad y el viento, y no del cultivo. Penman–Monteith FAO-56 es la forma de calcularla que acepta todo el mundo. El cultivo entra después, con un **coeficiente K_c** que sube de la siembra al dosel completo y baja hacia la madurez: la demanda real es ET_c = K_c × ET_o. Separar las dos cosas es lo que permite usar la misma ET_o para cualquier cultivo y comparar sitios entre sí.

3. El suelo es una cubeta

Entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, el suelo guarda una lámina de agua —el **agua disponible total**— de la que el cultivo puede tomar sin esfuerzo solo una fracción, el **agua fácilmente aprovechable**. La lluvia y el riego llenan la cubeta; la ET_c la vacía; lo que sobra cuando está llena se percola. Cuando el agotamiento pasa del agua fácilmente aprovechable, la planta transpira menos de lo que la atmósfera pide, y esa diferencia es el estrés que cuesta rendimiento. Todo el balance hídrico y todo el calendario de riego de la app son esa cubeta llevada día a día.

4. El registro de años es la probabilidad

La app no pronostica el año que viene: recorre cada año del registro como si el cultivo se hubiera sembrado en él, y resume lo que pasó con la **mediana** y los percentiles **20 y 80**. «Madura en 127 días (P20 123, P80 133)» quiere decir que en el 60 % central de los años tardó entre 123 y 133 días. «Ventana con 80 % de éxito» quiere decir que en cuatro de cada cinco años del registro todo salió bien a la vez. Por eso importa tanto cuántos años completos tiene la serie, y por eso la app lo dice al principio y lo repite en el informe.

5. Lo que no se mide se estima, y se declara

Casi ninguna estación agrícola mide radiación; muchas no miden humedad ni viento. FAO-56 dice exactamente cómo estimar cada una de esas variables a partir de la temperatura, y la app lo hace sin pedir permiso, pero **cuenta los días** en que lo hizo y redacta una frase que dice qué se estimó, con qué coeficiente y en qué porcentaje de los días. Esa frase pasa tal cual al informe. Un resultado con variables estimadas no es peor: es un resultado honesto sobre lo que se sabe y lo que se supuso.

1.4 Datos que acepta y qué entrega

LO QUE ENTRA

- **Una serie diaria** con fecha, temperatura máxima y mínima y, si las hay, lluvia, temperatura media, humedad relativa (media, o máxima y mínima), punto de rocío, viento, horas de sol y radiación. Se pega desde una hoja de cálculo, se abre desde un archivo **.csv** o **.txt** (incluido el formato con «Nulo» del Servicio Meteorológico Nacional), o se toma de uno de los seis ejemplos. Con temperatura máxima y mínima ya se puede hacer casi todo.

- **El sitio:** latitud, altitud, si es costero o interior y si el clima es húmedo o árido. De la latitud sale la radiación extraterrestre y la duración del día; de la altitud, la presión y la constante psicrométrica; de lo demás, cómo se estima lo que la estación no mide.
- **El cultivo y el suelo,** elegidos de los catálogos de la app (19 cultivos con sus Kc, etapas, raíz, fracción p y Ky de la FAO; 7 texturas de suelo) o escritos a mano, y las **fechas observadas** de las etapas de tu cultivar, si las tienes, para calibrar.
- **Un proyecto** guardado antes en `.json`: la serie limpia con el sitio, tal como salió del Bloque 2.

LO QUE SALE

- **Cuadros en pantalla** con escalas de lectura: casi todo número lleva al lado una etiqueta —«moderada», «pérdida moderada», «calibrar»— con la escala que la justifica a un clic de distancia.
- **Figuras** en cada bloque, exportables una a una desde el botón ↓ de su esquina, o todas juntas desde el Bloque 10, en PNG, JPG o SVG hasta 900 ppp, con la paleta, la fuente y el fondo del estudio de figuras.
- **Archivos .csv** de cada cuadro importante: normales, grados-día por año, ETo diaria con todos sus términos, balance por año y diario, calendario de riego, fechas fenológicas, frío por invierno, ventana de siembra.
- **El informe:** un solo archivo `.html` que se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF, con el resumen, una sección por bloque calculado, los métodos redactados a partir de lo que realmente se corrió, las referencias y el registro de cálculo.
- **El paquete:** un `.zip` con el informe, el proyecto, los parámetros, los cuadros y las figuras. Quien lo reciba puede rehacer el estudio completo.

1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

Una computadora con un navegador reciente —Edge, Chrome, Firefox o Safari de los últimos dos o tres años— y la carpeta del programa. No hay instalación: se copia la carpeta y se abre `index.html` con doble clic. También funciona desde una memoria USB y en una computadora sin internet.

- 1 Copia la carpeta `PhenologyPro` completa a tu computadora (o descárgala y descomprímela). Dentro debe haber `index.html`, las carpetas `js` y `css`, y la carpeta `tests`.
- 2 Abre `index.html` con doble clic (o con `Open PhenologyPro.bat` en Windows). La primera pantalla es el Bloque 1, la portada.
- 3 Elige el idioma con `ES` · `EN` y el tema claro u oscuro con el botón del sol. Ambos se recuerdan para la próxima vez.
- 4 Si quieres comprobar que el motor calcula bien en tu navegador, abre `tests/index.html`: son las pruebas del programa contra los ejemplos resueltos de FAO-56 y las fórmulas de cada método; todas deben salir en verde.

I LA APP RECUERDA LA SERIE

La serie limpia y el sitio se guardan en el navegador de esa computadora (en el *almacenamiento local*), de modo que al volver a abrir la app aparece el mismo estudio. Es solo una comodidad: el respaldo de verdad es el proyecto **.json** que se descarga desde el Bloque 2, que se abre en cualquier otra máquina. El botón **Olvidar esta serie** borra lo guardado.

1.6 Recorrido por la interfaz



Figura I.2. La pantalla inicial. Arriba, la barra fija con la marca, el botón de la paleta (el estudio de figuras), el selector de idioma y el del tema; debajo, la barra de los diez pasos, que es la columna vertebral de la app; y la portada del Bloque 1 con la pregunta que el programa contesta.

Elemento	Para qué sirve
La barra de pasos	Diez botones numerados, siempre visibles. El paso activo va en azul. Se puede saltar a cualquiera en cualquier momento; el bloque que necesita algo que todavía no existe lo dice y ofrece el botón para ir a resolverlo.
Las tarjetas	Cada bloque se divide en tarjetas numeradas —«1 · El sitio», «2 · La serie diaria»...— que se leen de arriba abajo. Las primeras son los parámetros; las siguientes, los resultados.
Los recuadros de resultados	Una fila de cifras grandes con su etiqueta y una línea de contexto debajo. Es el resumen de la tarjeta: lo que se diría en una frase.

Elemento	Para qué sirve
El signo	Junto a un título, una cifra o una columna, abre una ficha de ayuda: qué mide, cómo se lee, la escala que dice si el valor es bajo o alto y el error más común. Hay 49 fichas; cada bloque termina con su guía de interpretación, que las reúne.
Las etiquetas de escala	Al lado de muchos números aparece una palabra en color — <i>moderada, aceptable, calibrar, pérdida severa</i> —. Sale de la escala de la ficha correspondiente. El color va del verde al rojo.
El botón ↓ de cada figura	Aparece al pasar el cursor por la esquina de una figura. Abre el menú de exportación: PNG, JPG o SVG; 150 a 900 ppp; claro u oscuro; con título y nota.
El estudio de figuras	El botón de la paleta en la barra superior. Cambia la paleta (nueve, entre ellas la de Okabe–Itō para daltónicos y una en grises para imprimir), la fuente, las escalas y el fondo de todas las figuras a la vez, en pantalla y en lo que se exporta.
Recalcular	Cada bloque recalcula solo al cambiar un parámetro; el botón fuerza el cálculo cuando se ha escrito algo a mano.
Continuar al Bloque N →	Al pie de cada bloque. Lleva al siguiente cuando ya hay lo que necesita.
Los mensajes	Bandas de color bajo una tarjeta: azul para información, ámbar para un aviso, rojo para un error que impide seguir. Cada capítulo termina con la lista de los de su bloque.

1.7 Los seis climas de práctica

El Bloque 2 trae seis series diarias de ejemplo, de 1 a 20 años, generadas por el propio programa con una semilla fija. Son **sintéticas y ficticias**: imitan la estacionalidad, la amplitud térmica, el régimen de lluvias y la frecuencia de heladas de seis climas de México, con el ruido de un año a otro que tiene una serie real, pero no son observaciones de ninguna estación y no deben citarse como tales. Sirven para aprender la app, para probar un cultivo en un clima que no es el tuyo y para reproducir este manual.

Ejemplo	Latitud, altitud	Cómo es	Para qué sirve en el manual
Valle templado (2 250 m)	19.5°, 2 250 m	Cwb; 15.5 °C de media, 609 mm en verano; hiela en 16 de 20 inviernos	Heladas (cap. 3), frío invernal (cap. 8)
Costa cálida seca (50 m)	costera, cálida	Lluvia escasa de verano, ETo alta, sin heladas	—
Trópico húmedo (10 m)	baja, húmeda	Lluvia abundante casi todo el año, amplitud térmica pequeña	—
Altiplano frío (2 650 m)	alta, fría	Heladas frecuentes, ciclo térmico corto	—
Bajío semiárido (1 800 m)	20.6°, 1 800 m	BSh; 18.5 °C, 546 mm concentrados de junio a octubre; casi sin heladas	El ejemplo principal de todos los capítulos
Norte seco extremo (1 400 m)	norte, continental	Veranos muy calientes, inviernos con helada, lluvia escasa	—

Cada ejemplo puede cargarse **con errores sembrados**: valores imposibles, máximas por debajo de mínimas, picos, tramos planos y huecos. Es la mejor forma de ver qué hace el control de calidad del Bloque 2 antes de confiarle una serie real.

1.8 Cómo se recorre un estudio

El orden de los bloques es el orden en que se hace un estudio agroclimático. No es obligatorio hacerlo completo: un estudio de heladas termina en el Bloque 3; uno de calendario de riego necesita los Bloques 2, 5, 6 y 7; uno de fenología, los Bloques 2, 4 y 8. Lo que un bloque necesita de otro lo calcula solo al abrirlo, y si lo que necesita todavía no existe lo dice y ofrece el botón para ir por ello.

- 1 Bloque 2.** Escribe el sitio, trae la serie, confirma qué columna es cada cosa y revisa el control de calidad. Lee la tarjeta «Lo que estos datos permiten»: te dice qué bloques van a funcionar completos y cuáles con estimaciones. Guarda el proyecto.
- 2 Bloque 3.** Lee el clima en una página. Anota el periodo libre de heladas y las fechas al 20 % de riesgo, el inicio y el fin de las lluvias, y el umbral de helada que vas a usar: los bloques siguientes lo heredan.
- 3 Bloques 4 y 8.** Elige el cultivo y la fecha de siembra, mira cuántos años alcanza la meta térmica y a qué fechas caen las etapas. Si tienes fechas observadas, calibra. Si es un frutal caducifolio, revisa el frío del invierno.
- 4 Bloque 5.** Comprueba la frase que dice qué se estimó, compara los métodos y decide cuál ETo usarán los bloques del agua (casi siempre Penman–Monteith).
- 5 Bloques 6 y 7.** Elige el suelo y la fecha de siembra, lee el balance en temporal y su rendimiento relativo, y arma el calendario de riego con la regla y el sistema que tengas. Anota la capacidad de diseño y la lámina de planeación.
- 6 Bloque 9.** Cruza todo: helada y calor por etapa, la ventana de siembra y los escenarios. Aquí es donde suele cambiarse la fecha o el cultivar y volver a los bloques de arriba.
- 7 Bloque 10.** Recorre el estado del estudio, exporta las figuras, revisa el informe en la vista previa y descarga el paquete. Léelo antes de entregarlo.

! LO DE ARRIBA MANDA SOBRE LO DE ABAJO

Si cambias la serie en el Bloque 2, todo se recalcula. Si cambias la ETo elegida en el Bloque 5, el balance y el riego se rehacen al abrirlos. Si cambias el cultivo en el Bloque 6, el Bloque 7 lo hereda; si cambias las etapas en el Bloque 8, el Bloque 9 las toma. El informe del Bloque 10 se redacta con lo que exista en ese momento: por eso conviene generarlo al final y volver a generarlo si se tocó algo.

1.9 Lo que el programa no hace

- **No pronostica el tiempo ni descarga datos.** Trabaja con la serie que le das; no consulta ningún servicio ni rellena con reanálisis. Cuando la serie es corta, lo dice y baja el crédito de las probabilidades.
- **No es un modelo de cultivo.** No simula fotosíntesis, biomasa ni rendimiento absoluto. El rendimiento que da es *relativo* —la fracción del potencial que el agua permite, según FAO-33— y las etapas se fechan por tiempo térmico, no por un modelo de desarrollo completo con fotoperiodo y vernalización.
- **No interpola entre estaciones ni hace mapas.** Un sitio, una serie. Para un mapa regional hay que correr varias estaciones y llevar los resultados a un sistema de información geográfica.
- **No conoce tu cultivar.** Los requerimientos térmicos del catálogo son orientativos y así lo dice en cada pantalla; los Kc, las etapas en días y las fracciones p son los de las tablas de la FAO, que son promedios. Todo es editable y el Bloque 8 calibra con tus fechas.
- **No lee libros de cálculo.** Un `.xlsx` no se abre a propósito: se guarda como `.csv` o se copia y pega el bloque de celdas. La app no carga una sola línea de código que no sea propia, y eso es lo que le permite abrirse con doble clic y funcionar sin internet.
- **No decide por ti.** Las reglas de decisión y las escalas son guías para leer un número, no veredictos. La app no bloquea nada por un aviso: lo señala, explica qué significa y deja la decisión a quien conoce la parcela.

1

BLOQUE 1 · INICIO

Inicio: el motor, los laboratorios y la teoría

La primera pantalla no es una portada decorativa: trae el motor completo del programa en dos laboratorios que calculan de verdad, el catálogo de los veinte métodos con su fuente, la comparación de los cinco métodos de evapotranspiración, la teoría indispensable en ocho lecturas cortas y las cuarenta referencias detrás de los cálculos. Se puede aprender agroclimatología aquí antes de cargar un solo dato.

1.1 Lo que se ve al abrir la app

1.3 El laboratorio de tiempo térmico

1.5 Qué incluye y para qué sistema de producción

1.7 La teoría, en lenguaje claro

1.2 Cómo funciona: los diez pasos

1.4 El laboratorio de agua

1.6 Los veinte métodos y los cinco de ETo, lado a lado

1.8 Cómo citar y las referencias

1.1 Lo que se ve al abrir la app

Al abrir [index.html](#) aparece el Bloque 1 con una pregunta —¿Cuánto calor, cuánta agua y para cuándo?— que resume lo que el programa contesta, y una ilustración con las tres cosas que la planta cuenta: la temperatura diaria oscilando sobre la temperatura base, la curva de grados-día acumulados con sus etapas y la cubeta del agua del suelo entre la capacidad de campo, el agua fácilmente aprovechable y el punto de marchitez. Debajo, dos botones: [Empezar con mi estación →](#), que lleva al Bloque 2, y [Probar los laboratorios](#), que baja a la sección siguiente.

Cinco sellos bajo los botones resumen las promesas del programa: funciona completo en el navegador, los datos no salen de la computadora, español e inglés, ecuaciones de FAO-56 verificadas con sus ejemplos resueltos y figuras editables hasta 900 ppp. Cada una se explica en algún capítulo de este manual; la de las ecuaciones se comprueba abriendo [tests/index.html](#).

1 EL BLOQUE 1 NO NECESITA DATOS

Es el único bloque que funciona sin serie. Los laboratorios generan el año de clima de uno de los seis sitios de práctica y calculan sobre él con las mismas funciones que después usarán con tu estación. Por eso es el lugar para entender un método antes de aplicarlo: se mueve un control y se ve qué cambia.

1.2 Cómo funciona: los diez pasos

Cómo funciona

Una ruta guiada en el orden en que se hace un estudio agroclimático. Cada bloque explica la idea, revisa si tus datos alcanzan y recomienda qué hacer después.

PASO 1 Cargar la serie diaria de la estación	PASO 2 Describir el clima climograma, heladas, aridez	PASO 3 Contar el calor grados-día por fecha de siembra	PASO 4 Medir la demanda ETo, Kc y Etc	PASO 5 Balancear el agua suelo, lluvia efectiva, riego	PASO 6 Fechar las etapas BBCH, frío, fotoperiodo	PASO 7 Decidir y publicar riesgos, ventana, informe
---	--	---	--	---	---	--

Figura 1.1. La ruta de un estudio en siete pasos: cargar, describir el clima, contar el calor, medir la demanda, balancear el agua, fechar las etapas y decidir y publicar. Son los diez bloques agrupados por lo que resuelven.

Debajo de la franja, nueve tarjetas —una por bloque, del 2 al 10— dicen qué hace cada uno y llevan a él con un clic. Cada tarjeta tiene su etiqueta (*datos, clima, calor, agua, suelo, riego, fenología, riesgo, informe*) y una ilustración propia. La misma lista, con la pregunta que cada bloque contesta, está en la sección 1.2 de la introducción.

1.3 El laboratorio de tiempo térmico

El primer laboratorio responde la pregunta central del programa con un año sintético: **sembrando tal cultivo en tal fecha, ¿le alcanza el calor para madurar antes de la primera helada?** Se elige un sitio de práctica, un cultivo del catálogo, el método de cálculo y el corte del umbral superior; tres deslizadores fijan la fecha de siembra, la temperatura base y el umbral superior. Al cambiar cualquiera de ellos la app vuelve a generar el año, acumula los grados-día día por día y fecha cada etapa.




Figura 1.2. El laboratorio de tiempo térmico con el maíz en el Valle templado, sembrado el 15 de abril con base 10 °C y umbral 30 °C. Los seis recuadros, el veredicto, las cinco etapas y las tres figuras se rehacen al mover cualquier control.

Recuadro	Qué dice	En el ejemplo
°C·d requeridos	La suma térmica hasta la última etapa del catálogo (la madurez fisiológica), en grados-día.	1,450 °C·d
Días a madurez	Cuántos días tarda el año sintético en juntar esa suma desde la siembra, y en qué fecha cae.	221 días · 22 nov
°C·d por día	El promedio de la temporada: la velocidad a la que ese sitio «paga» el calor.	6.6

Recuadro	Qué dice	En el ejemplo
°C·d disponibles	Los que se acumulan desde la siembra hasta la primera helada del otoño: el techo del sitio para esa fecha.	1,333
Margen térmico	Disponibles menos requeridos. Negativo quiere decir que el frío llega antes de la madurez.	-117 (faltan)
Días con helada	Los días con $T_{min} \leq 0\text{ °C}$ dentro del ciclo.	2

► EJEMPLO · EL VEREDICTO DEL LABORATORIO

«Madura en 221 días (22 de noviembre de 2025), pero el ciclo atraviesa 2 días con helada: el calor alcanza, el frío no perdona. Mueve la siembra hasta que la etapa sensible quede fuera de la helada.»

A 2 250 m el maíz de 1,450 °C·d es marginal: junta el calor, pero tarde. Las etapas lo dicen: emergencia el 23 de abril, seis hojas el 22 de mayo, floración el 26 de julio, grano lechoso el 20 de agosto y madurez el 22 de noviembre, ya con heladas encima. Mover el deslizador de la fecha hacia marzo, o bajar la meta con un cultivar precoz, cambia el veredicto en el acto. Ese es el uso del laboratorio: ver la sensibilidad antes de tomar la decisión con la serie real en los Bloques 4, 8 y 9.

Las tres figuras

- **Temperatura diaria y °C·d de cada día.** Las máximas y mínimas del año, la línea de la base y la del umbral superior, y las barras ámbar con los grados-día que aporta cada día. Se ve cómo las barras se apagan cuando la mínima cae y cómo el umbral superior recorta los días de más calor.
- **Grados-día acumulados y etapas.** La curva de la suma desde la siembra; cada línea punteada es una etapa del catálogo y el punto, el día en que la curva la alcanza. La línea vertical marca la primera helada.
- **Climograma del sitio.** El diagrama de Walter–Lieth del sitio elegido (10 °C = 20 mm): azul donde llueve más de 2T (húmedo), rojo donde llueve menos (seco) y una franja celeste bajo el eje en los meses con helada. Es el mismo climograma que el Bloque 3 dibuja con la serie real.

⊕ TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ HAY SEIS MÉTODOS

Todos calculan lo mismo —el área del día por encima de la base— pero suponen una forma distinta de la temperatura a lo largo de las 24 horas. El **promedio** usa $(T_{max} + T_{min})/2$ – base; el **promedio acotado** del maíz acota primero T_{max} a 30 y T_{min} a 10; el **triángulo** y el **seno** integran una onda triangular o senoidal entre la mínima y la máxima, y sus versiones **dobles** usan la mínima del día siguiente para la segunda mitad. El corte del umbral superior —horizontal, vertical, intermedio o ninguno— decide qué pasa con las horas más calientes que el umbral. El Bloque 4 tiene una tarjeta entera para ver cuánto cambia el resultado de un método a otro.

1.4 El laboratorio de agua

La pestaña **Agua** del mismo bloque hace, sobre el mismo año sintético, el balance hídrico completo del Bloque 6 y el calendario de riego del Bloque 7. Se eligen el sitio, el cultivo, el suelo, el método de ETo (Hargreaves o Penman–Monteith) y si hay riego (**Temporal (sin riego)** o **Automático al agotar el AFA**); los deslizadores mueven la fecha de siembra, el umbral de riego, la eficiencia y el agotamiento inicial del suelo.




Figura 1.3. El laboratorio de agua con el maíz en temporal, en suelo franco, con ETo de Hargreaves. Arriba, ETo, ETc, lluvia efectiva, riego, percolación, días con estrés y déficit; abajo, la demanda día por día y el agua en la zona radical entre el agua fácilmente aprovechable y el agua disponible total.

▶ EJEMPLO · UN AÑO EN TEMPORAL EN EL VALLE TEMPLADO

ETo de 631 mm en los 140 días del ciclo; ETc de 513 mm con un Kc medio de 1.17 ya corregido al clima; lluvia efectiva de 534 mm de los 536 caídos; 21 mm de percolación; 17 días con estrés con Ks medio de 0.98 (*estrés leve*) y un déficit de 7 mm, el 1 % de la demanda. El veredicto: «*En temporal el suelo alcanza: la lluvia efectiva cubre la ETc casi todo el ciclo y el estrés es despreciable.*» Cambiar el sitio a la Costa cálida seca, o el suelo a arena, muestra al instante el otro extremo.

! LOS LABORATORIOS USAN UN AÑO, NO UN REGISTRO

El año sintético del laboratorio es uno solo, generado con semilla fija. Sirve para entender la mecánica, no para decidir: un año no tiene probabilidad. La decisión se toma en los bloques 4 a 9, donde la serie real se recorre año por año y cada resultado lleva su mediana y sus percentiles.

1.5 Qué incluye y para qué sistema de producción

La franja **Para el sistema de producción que manejas** traduce los bloques a seis situaciones reales. Cada tarjeta plantea la pregunta típica de ese sistema y dice qué bloques la contestan:

Sistema	La pregunta típica	Bloques
Agricultura de temporal	¿Cabe el ciclo entre la primera lluvia y la primera helada?	3, 4, 6, 9
Cultivos de riego	¿Cuándo y cuánto regar con la demanda real del cultivo?	5, 6, 7
Hortalizas y agricultura protegida	Fechar cosechas y programar trasplantes escalonados	4, 8
Frutales caducifolios	¿Acumula el invierno el frío que el cultivar necesita?	8, 9
Perennes tropicales	Café, aguacate, cítricos: balance hídrico y estrés	5, 6, 7
Forrajes y pastizales	Cortes por tiempo térmico y demanda de agua entre cortes	4, 6

Qué incluye

Nueve bloques de trabajo después de esta portada. Haz clic en cualquiera para abrirlo.

2 DATOS

Datos climáticos del sitio

Carga la serie diaria de tu estación (pegada o desde .csv), con temperatura máxima y mínima, lluvia y, si la hay, humedad, viento e insolación. La app revisa huecos, valores imposibles y saltos, rellena lo que se puede justificar y guarda la latitud, la longitud y la altitud que todo lo demás necesita.

3 CLIMA

El clima del sitio

Normales mensuales, climograma de Walter-Lieth, régimen de lluvias, periodo libre de heladas con sus fechas al 10, 20 y 50 % de probabilidad, índices de aridez y de humedad, y la clasificación climática del lugar. Lo que un estudio agroclimático pone en su primera página.

4 CALOR

Grados-día y tiempo térmico

Acumulación de calor desde cualquier fecha con seis métodos (promedio, acotado, triángulo, seno simple y doble) y tres cortes del umbral superior: unidades calor de Ontario, comparación entre años; y el mapa de °C·d disponibles por fecha de siembra que dice cuánto ciclo cabe en la estación.

5 AGUA

Evapotranspiración de referencia

Penman-Monteith FAO-56 con todos los datos o con los que haya (la app estima los que faltan como manda FAO-56 y lo anota), Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor, Thornthwaite y Turc, comparados entre sí; la radiación extraterrestre y la duración del día; y la calibración local de Hargreaves contra Penman-Monteith.

6 SUELO

Balance hídrico

El balance mensual de Thornthwaite-Mather con almacenamiento, déficit y excedente, y el balance diario de la zona radical de FAO-56 con la curva de Kc del cultivo, la lluvia efectiva, el escurrimiento, la percolación y el coeficiente de estrés. Para temporal y para riego.

7 RIEGO

Calendarización del riego

Cuándo y cuánto regar: el calendario que agota el agua fácilmente aprovechable y rellena a capacidad de campo, o el de intervalo fijo, o el de lámina fija; láminas netas y brutas según la eficiencia del sistema, el ahorro frente a regar por costumbre, y el calendario listo para el productor.

8 FENOLOGÍA

Predicción de etapas fenológicas

Las etapas BBCH del cultivo fechadas por su tiempo térmico, con el catálogo de requerimientos estable y calibrable con tus observaciones; el frío invernal de los frutales por horas frío, unidades Utah y porciones de frío; el fotoperiodo del sitio; y las horas de calor tras el reposo hasta la floración.

9 RIESGO

Riesgos y escenarios

Probabilidad de helada y de golpe de calor por fecha y por etapa, sequía en la etapa sensible, la ventana de siembra que maximiza el ciclo y minimiza el riego, y escenarios de +1, +2 y +3 °C para ver qué le pasa al calendario del cultivo con un clima más cálido.

10 INFORME

Figuras, informe y paquete

Todas las figuras del estudio en PNG, JPG o SVG hasta 900 ppp con el estilo que elijas; un informe que se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF, con métodos redactados a partir de lo que realmente calculaste; y un zip con el informe, las figuras, los cuadros y los datos que lo reproducen.

Para el sistema de producción que manejas

La app conoce la diferencia entre un maíz de temporal que corre contra la helada, una huerta de durazno que necesita frío y un cafetal que necesita que no falte el agua en floración.

Agricultura de temporal

¿cabe el ciclo entre la primera lluvia y la primera helada?

VENTANA DE SIEMBRA

Cultivos de riego

cuándo y cuánto regar con la demanda real del cultivo

CALENDARIO DE RIEGO

Hortalizas y agricultura protegida

fechar cosechas y programar trasplantes escalonados

GRADOS-DÍA

Frutales caducifolios

¿acumula el invierno el frío que el cultivar necesita?

PORCIONES DE FRÍO

Perennes tropicales

café, aguacate, cítricos: balance hídrico y estrés

BALANCE HÍDRICO

Forrajes y pastizales

cortes por tiempo térmico y demanda de agua entre cortes

TIEMPO TÉRMICO

Figura 1.4. Las nueve tarjetas de los bloques 2 a 10, cada una con su ilustración y su etiqueta, y debajo la franja de los seis sistemas de producción a los que el programa está dirigido.

1.6 Los veinte métodos y los cinco de ETo, lado a lado

La galería **Métodos que cubre** es el inventario del motor: veinte tarjetas, cada una con una ilustración, una línea que dice qué hace y la fuente, y el bloque donde se usa. El filtro de arriba las agrupa en cinco familias.



Figura 1.5. La galería filtrada a **Tiempo térmico**: el promedio, el seno simple y doble, el triángulo simple y doble, los tres cortes del umbral superior y las unidades calor de Ontario, todos del Bloque 4.

Familia	Métodos	Bloques
Tiempo térmico	Grados-día por promedio; seno simple y doble; triángulo simple y doble; cortes horizontal, vertical e intermedio; unidades calor de Ontario (CHU)	4, 8
Evapotranspiración	Penman–Monteith FAO-56; Hargreaves–Samani; Priestley–Taylor; Thornthwaite mensual (y Turc, en el Bloque 5)	3, 5
Balance y riego	Coefficiente de cultivo Kc en cuatro etapas corregido al clima; balance de Thornthwaite–Mather; balance diario de la zona radical (FAO-56, cap. 8); calendarización del riego	3, 6, 7
Fenología y frío	Fotoperiodo con crepúsculo civil; horas frío y unidades Utah; modelo dinámico (porciones de frío)	8, 9
Clima y riesgo	Climograma de Walter–Lieth; índices de aridez (PNUMA, De Martonne, Lang, Thornthwaite); probabilidad de helada; ventana de siembra	3, 9

Los métodos de ETo, lado a lado

Los métodos de ETo, lado a lado					
Ningún método sustituye a los datos. Esta es la lectura honesta de cada uno.					
	Penman–Monteith FAO-56	Hargreaves–Samani	Priestley–Taylor	Thornthwaite	Turc
Datos que necesita	Tmax, Tmin, HR, viento, radiación o insolación	Tmax, Tmin, latitud	T, radiación neta	T media mensual, latitud	T, radiación, HR
Escala de tiempo	horaria, diaria, mensual	diaria a mensual (mejor ≥ 5 días)	diaria	mensual	diaria a decenal
Base física	balance de energía + transferencia aerodinámica	empírica, calibrada contra lisímetros	balance de energía en equilibrio	empírica, índice de calor anual	empírica, radiación y temperatura
Dónde falla	solo si los datos son malos	sobreestima en húmedo y costa; subestima en árido ventoso	subestima con advección (aire seco y viento)	subestima en clima árido y en verano	climas muy secos (< 50 % HR)
Cuándo usarlo	siempre que se pueda; es el estándar	solo hay temperatura; calibrar contra PM	climas húmedos sin viento; validar	balances climáticos y clasificación	zonas húmedas templadas
En la app	✓ Bloque 5	✓ Bloque 5	✓ Bloque 5	✓ Bloques 3, 5 y 6	✓ Bloque 5

Figura 1.6. Los cinco métodos de ETo en seis renglones: qué datos piden, a qué escala de tiempo valen, en qué se basan, dónde fallan, cuándo usarlos y en qué bloque de la app están.

La tabla es la respuesta corta a la pregunta más frecuente del Bloque 5. Penman–Monteith necesita temperatura, humedad, viento y radiación o insolación, vale a escala horaria, diaria y mensual y solo falla si los datos son malos: es el estándar y se usa siempre que se pueda. Hargreaves–Samani pide solo temperatura y latitud, es empírico y calibrado contra lisímetros, sobreestima en sitios húmedos y costeros y subestima en los áridos con viento: se usa cuando solo hay temperatura, calibrándolo contra Penman–Monteith. Priestley–Taylor ignora el viento y la humedad y sirve en climas húmedos sin advección; Thornthwaite es mensual y de la temperatura media, útil para el balance climático del Bloque 3; Turc vale de la escala diaria a la decenal.

1.7 La teoría, en lenguaje claro

Ocho lecturas plegables, de tres o cuatro párrafos cada una, con una figura propia. Son la base conceptual de los capítulos que siguen; cada capítulo repite lo indispensable, pero quien lea las ocho de corrido tendrá el mapa completo.

La teoría, en lenguaje claro

Lo que hay que entender antes de acumular el primer grado-día.

La planta no cuenta días: cuenta calor

El desarrollo de una planta —de la emergencia a la floración, de la floración a la madurez— avanza a una velocidad que depende casi linealmente de la temperatura entre dos límites: por debajo de la **temperatura base** no avanza, y por encima de un **umbral superior** deja de acelerarse. Por eso el tiempo que tarda una etapa se mide mejor en **grados-día** (°C·d) que en días: cada día aporta lo que su temperatura media excede la base, y la etapa llega cuando la suma alcanza el requerimiento del cultivar.

$$^{\circ}\text{C}\cdot\text{d del día} = \max(0, \bar{T} - T_{\text{base}}) \quad \bar{T} = (T_{\text{max}} + T_{\text{min}}) / 2 \quad \text{acumulado} = \sum ^{\circ}\text{C}\cdot\text{d desde la siembra}$$

La fórmula simple esconde tres decisiones. **Qué base:** 10 °C para maíz, frijol o jitomate, 0 °C para trigo, 15.6 °C para algodón; la que usó quien publicó el requerimiento. **Qué hacer con el calor de más:** acotar la máxima al umbral (corte horizontal), no contar las horas por encima (vertical) o restarlas (intermedio). Y **qué forma tuvo el día:** con solo máxima y mínima, la senoide y el triángulo cuentan las horas cálidas de un día fresco que el promedio deja en cero.

Convención de la app: °C·d con base y umbral declarados en cada figura y en el informe. Un valor publicado en °F·d se divide entre 1.8 para compararlo.




Figura 1.7. La primera lectura abierta. Cada una se pliega y despliega con un clic; la etiqueta de la derecha dice a qué bloque corresponde.

Lectura	De qué trata	Bloque
La planta no cuenta días: cuenta calor	El desarrollo avanza casi linealmente con la temperatura entre una base y un óptimo; las tres decisiones que esconde la fórmula simple (la base, el umbral y la forma del día)	4
ETo: la demanda de la atmósfera, y por qué Penman–Monteith	Evaporar un milímetro cuesta 2.45 MJ/m²; de dónde sale esa energía; qué hacer cuando falta una variable	5
Del pasto al cultivo: Kc y ETc	El cultivo no es pasto; el Kc en cuatro etapas y su corrección al clima con la ecuación 62 de FAO-56	6
El suelo como cubeta: balance hídrico y calendario de riego	Capacidad de campo, punto de marchitez, ADT y AFA; el balance diario del agotamiento; la regla de riego	6, 7

Lectura	De qué trata	Bloque
Fechar la fenología: BBCH, tiempo térmico y calibración	La escala BBCH; las dos partes de un modelo de tiempo térmico; por qué calibrar con fechas propias	8
El frío que los frutales necesitan	Horas frío, unidades Utah y porciones de frío; la reconstrucción horaria de Linvill cuando solo hay máxima y mínima	8
Leer un climograma y decidir la ventana de siembra	Las convenciones de Walter—Lieth; cómo se cruzan calor, agua y helada en una sola probabilidad	3, 9
Qué pregunta responde cada bloque	El resumen de la ruta, bloque por bloque	todos

Al final de la sección está la **guía de interpretación del Bloque 1**: las dieciséis fichas de ayuda que reúnen las ideas de todo el programa —grados-día, temperatura base, métodos y cortes, ETo y sus métodos, Kc, ADT y AFA, Ks, agotamiento, lluvia efectiva, frío, fotoperiodo, climograma, aridez, helada y estación de crecimiento— con sus escalas. Las mismas fichas aparecen luego, una a una, junto a cada número de los bloques.

1.8 Cómo citar y las referencias

Cómo citar

Si PhenologyPro te ayudó en una tesis o un estudio, cita el programa y las obras originales de los métodos que implementa; el informe del Bloque 10 los nombra por autor y año.

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). PhenologyPro: plataforma en el navegador para la agroclimatología y la fenología de cultivos (versión 1.0.0) [software].

Copiar la cita El DOI se añadirá al archivar la versión 1.0.

Referencias detrás de los cálculos

Cada fórmula de la app viene de una obra publicada, y se vuelve a nombrar en el lugar donde se usa.

Todas Evapotranspiración Tiempo térmico Frío y fenología Balance y riego Clima y riesgo

Figura 1.8. La cita del programa, lista para copiar, y el filtro de las cuarenta referencias por familia: evapotranspiración, tiempo térmico, frío y fenología, balance y riego, clima y riesgo.

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). PhenologyPro: plataforma en el navegador para la agroclimatología y la fenología de cultivos (versión 1.0.1) [software]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23004710>

El botón **Copiar** la lleva al portapapeles. La misma cita cierra el informe del Bloque 10, y el archivo [CITATION.cff](#) de la carpeta del programa la trae en el formato que leen los repositorios. El identificador de objeto digital de concepto, 10.5281/zenodo.23004710, resuelve siempre a la versión más reciente archivada en Zenodo.

Las **referencias detrás de los cálculos** son cuarenta: los documentos de la FAO (24, 25, 33, 46 y 56), los artículos originales de cada método de grados-día y de frío, la monografía BBCH, las fuentes de los índices climáticos y de la clasificación de Köppen—Geiger. El apéndice E de este manual las reproduce completas, por familia; el informe del Bloque 10 cita solo las de los métodos que el estudio usó.

 REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 1

Si es la primera vez que abres el programa	entonces pasa diez minutos en los dos laboratorios moviendo un control a la vez: la fecha de siembra, la base, el suelo, la ETo.
Si no sabes qué método de grados-día usar	entonces lee la primera lectura de teoría y compara en el laboratorio el promedio, el acotado y el seno para tu cultivo; el Bloque 4 lo cuantifica con la serie real.
Si tu estación solo tiene temperatura	entonces mira la tabla de los métodos de ETo: Hargreaves calibrado contra Penman—Monteith es el camino, y el Bloque 5 lo hace solo.
Si ya tienes la serie	entonces Empezar con mi estación → y sigue el capítulo 2.
Nada de lo que se haga en el Bloque 1 afecta al estudio: los laboratorios no guardan estado ni entran en el informe.	

2

BLOQUE 2 · DATOS CLIMÁTICOS

Datos climáticos del sitio

Todo lo que la app calcula sale de una sola cosa: la serie diaria de una estación. Este bloque la trae —pegada, desde un archivo o de ejemplo—, reconoce qué columna es cada variable, la revisa con reglas físicas, rellena lo que se puede rellenar y dice sin rodeos qué bloques van a funcionar con lo que hay. Al final la guarda como proyecto, para que el estudio se pueda reproducir.

[2.1 De la estación a la serie](#)

[2.2 El sitio](#)

[2.3 La serie diaria: cuatro formas de traerla](#)

[2.4 Qué columna es cada cosa](#)

[2.5 El control de calidad](#)

[2.6 Lo que estos datos permiten](#)

[2.7 La serie limpia y el proyecto](#)

[2.8 Los avisos de este bloque](#)

2.1 De la estación a la serie

Una estación agroclimática entrega, en el mejor de los casos, una fila por día con la temperatura máxima y mínima, la lluvia y quizá la humedad, el viento, las horas de sol o la radiación. En el peor, entrega solo las temperaturas, con huecos, con algún valor imposible y con un formato de fecha distinto en cada archivo. El Bloque 2 está hecho para el segundo caso y saca provecho del primero.

El bloque se recorre en cinco tarjetas: el sitio, la serie, los papeles de las columnas, el control de calidad y la serie limpia. Solo las dos primeras piden algo; las demás se llenan solas y se leen. Lo que sale de aquí —la serie limpia con sus marcas y el sitio— es lo único que los demás bloques usan: ninguno vuelve a tocar el archivo original.

! CON TMAX Y TMIN YA SE PUEDE HACER CASI TODO

Grados-día, fenología, heladas, climograma, Hargreaves, Penman–Monteith con estimaciones, balance hídrico, riego y frío invernal funcionan con solo la temperatura máxima y mínima diarias (y la lluvia, para todo lo que tenga que ver con el agua). Humedad, viento y radiación mejoran la ETo y quitan estimaciones del informe, pero no son requisito. No hay que esperar a tener «la serie completa» para empezar.

2.2 El sitio

La primera tarjeta pide lo que la serie no trae: dónde está la estación y en qué clase de clima. De la **latitud** salen la radiación extraterrestre y la duración del día (FAO-56, ecuaciones 21 y 34); de la **altitud**, la presión atmosférica y con ella la constante psicrométrica (ecuaciones 7 y 8). Sin esas dos no hay ETo, y por eso son las únicas obligatorias. La longitud solo se cita en el informe.

1 · El sitio

La latitud fija la radiación extraterrestre y la duración del día; la altitud, la presión atmosférica y con ella la constante psicrométrica. Sin ellas no hay ETo. La longitud solo se cita en el informe.

NOMBRE DE LA ESTACIÓN O DEL SITIO

Bajío semiárido (1 800 m)

LATITUD (GRADOS DECIMALES, SUR NEGATIVO)

20.6

LONGITUD (OESTE NEGATIVO)

-100.4

ALTITUD (M)

1800

SITUACIÓN

Interior (kRs = 0.16)

Para estimar la radiación de la amplitud térmica cuando no hay medición.

HUMEDAD DEL CLIMA

Árido o semiárido (Tdew ≈ Tmin - 2)

Para estimar la humedad cuando la estación no la mide (FAO-56, ec. 48).

ALTURA DEL ANEMÓMETRO (M)

2

2 en estaciones agrometeorológicas, 10 en las sinópticas. El viento se lleva a 2 m.

NOTAS (FUENTE DE LOS DATOS, INSTRUMENTO, OBSERVACIONES)

Datos del Servicio Meteorológico Nacional, estación 15170, 1991–2020

Ra (21 jun) 39.6 MJ m⁻² d⁻¹

N (21 jun) 13.3 h

P 81.8 kPa

γ 0.0544 kPa/°C

kRs 0.16

Figura 2.1. El sitio del ejemplo: el Bajío semiárido a 20.6° de latitud y 1 800 m. Abajo, lo que la app deriva de esas cifras: la radiación extraterrestre y la duración del día del 21 de junio, la presión, la constante psicrométrica y el coeficiente kRs.

Campo	Para qué sirve y qué poner
Nombre de la estación o del sitio	Encabeza el informe y da nombre a los archivos que la app exporta.
Latitud	En grados decimales, negativa al sur del ecuador. Decide la radiación extraterrestre, la duración del día, el fotoperiodo, qué mitad del año es la cálida y en qué mes se parte la temporada de heladas.

Campo	Para qué sirve y qué poner
Longitud	Negativa al oeste. No entra en ningún cálculo; si se escribe positiva con una latitud de México la app lo advierte.
Altitud (m)	Presión atmosférica y constante psicrométrica. Un valor muy alto dispara un aviso por si se escribió en pies.
Situación	Interior (kRs = 0.16) o Costera, a menos de ~20 km del mar (kRs = 0.19) . Es el coeficiente con que FAO-56 estima la radiación a partir de la amplitud térmica cuando la estación no la mide (ecuación 50).
Humedad del clima	Húmedo o subhúmedo ($T_{dew} \approx T_{min}$) o Árido o semiárido ($T_{dew} \approx T_{min} - 2^{\circ}\text{C}$) . Es cómo se estima el punto de rocío, y con él la presión de vapor, cuando no hay humedad medida (ecuación 48 y su nota para climas áridos).
Altura del anemómetro (m)	2 m en las estaciones agrometeorológicas, 10 m en las sinópticas. La app lleva el viento a 2 m con el perfil logarítmico (ecuación 47).
Notas	La fuente de los datos, el instrumento, lo que un lector del informe debe saber. Se copian tal cual al informe.

I LOS EJEMPLOS ESCRIBEN EL SITIO POR TI

Al cargar una serie de ejemplo la tarjeta se llena con su latitud, altitud y situación. Con una serie propia hay que escribirlos: la app no los adivina del archivo. Si el estudio se guarda como proyecto, el sitio viaja dentro.

2.3 La serie diaria: cuatro formas de traerla

- 1 Pegar.** Se copia el bloque de celdas de una hoja de cálculo —con la fila de encabezados— y se pega en el cuadro de texto; [Leer la tabla pegada](#) lo interpreta. Es la forma más rápida y la que funciona con cualquier formato, porque el separador (tabulador, coma, punto y coma o espacios) se detecta solo.
- 2 La plantilla.** [↓ Plantilla .csv](#) descarga un archivo con las columnas que la app entiende ([fecha](#), [tmax](#), [tmin](#), [prec](#), [hrmax](#), [hrmin](#), [viento](#), [insolacion](#)) y dos filas de muestra. Se llena en la hoja de cálculo, se guarda como .csv y se abre aquí.
- 3 Un archivo.** Se suelta sobre la zona punteada o se elige con el botón. Se aceptan [.csv](#), [.txt](#) y [.tsv](#), y también un proyecto [.json](#) guardado antes por la app. Los archivos del Servicio Meteorológico Nacional, con su encabezado de varias líneas y la palabra «Nulo» en los faltantes, se leen tal cual.
- 4 Un ejemplo.** Seis climas sintéticos, de 1 a 20 años, con la casilla [con errores sembrados](#) para practicar el control de calidad. Al cargarlos, la app avisa que son ficticios y no se citan.

2 · La serie diaria ?

Una fila por día con la fecha y las variables que haya: Tmax y Tmin son indispensables; la lluvia hace posible el balance hídrico; humedad, viento e insolación o radiación permiten Penman–Monteith sin estimaciones. Pega la tabla desde Excel, arrastra un archivo .csv o .txt (también el formato de texto del Servicio Meteorológico Nacional), o carga un ejemplo para practicar.

PEGAR DESDE UNA HOJA DE CÁLCULO

fecha	tmax	tmin	prec
2020-01-01	22.5	4.1	0
2020-01-02	23.0	3.6	0

Leer la tabla pegada

↓ Plantilla .csv

O UN ARCHIVO

Arrastra aquí un .csv, .txt o un proyecto .json

o haz clic para elegirlo. Separadores: coma, punto y coma, tabulador o espacios. Valores faltantes: vacío, NA, Nulo, -99, -999.

O UN EJEMPLO PARA PRACTICAR

Años ☐ con huecos y errores sembrados

Valle templado (2 250 m)
templado subhúmedo,
lluvias de verano - 19.5°, 2250 m

Costa cálida seca (50 m)
cálido seco, lluvias de julio a septiembre - 24.8°, 50 m

Trópico húmedo (10 m)
cálido húmedo, más de 1 700 mm - 19.2°, 10 m

Altiplano frío (2 650 m)
frío subhúmedo, heladas de noviembre a marzo - 19.3°, 2650 m

Bajío semiárido (1 800 m)
semiárido templado, 520 mm - 20.6°, 1800 m

Norte seco extremoso (1 400 m)
seco, inviernos fríos y veranos ardientes - 28.6°, 1400 m

Se recuperó la serie de la sesión anterior desde el navegador. Carga otra si no es la que quieres.

Figura 2.2. Las cuatro entradas: pegar una tabla, descargar la plantilla para llenarla, soltar o elegir un archivo, o cargar uno de los seis ejemplos con el número de años y, si se quiere, con errores sembrados.

! UN LIBRO DE EXCEL NO SE LEE, Y ES A PROPÓSITO

Si se elige un `.xlsx`, la app lo dice: «Los libros de Excel no se leen directamente: guarda la hoja como CSV (texto delimitado por comas) o copia las celdas y pégalas en el cuadro de texto». Leer un libro de cálculo exigiría incorporar una biblioteca ajena de cientos de miles de líneas para un problema que se resuelve con copiar y pegar. Se prefirió que la app no cargue una sola línea que no sea propia.

2.4 Qué columna es cada cosa

Leída la tabla, la tarjeta 3 muestra las primeras filas con un selector encima de cada columna: el **papel** que la app le asignó. Lo adivina por el nombre del encabezado (en español o en inglés, con o sin acentos, con las abreviaturas usuales) y, si el nombre no ayuda, por el contenido. Casi siempre acierta; cuando no, se corrige en el selector.

3 · Qué columna es cada cosa

La app propone un papel para cada columna por su nombre y su contenido; corrige lo que haga falta. La fecha puede venir en una columna o como año, mes y día (o año y día del año).

Fecha	Temperatura máxima (°C)	Temperatura mínima (°C)	Precipitación (mm)	Humedad relativa medi.	Viento (m/s a 2 m)
fecha	tmax	tmin	prec	hr	viento
2006-01-01	22.6	5.9	0	50	2.4
2006-01-02	20.7	3.4	0	46	1.4
2006-01-03	21.9	6.4	0	57	2.2
2006-01-04	23.3	7.6	0	54	1.8
2006-01-05	23.2	8.8	0	51	2

Orden de la fecha: Automático detectado: año-mes-día Temperatura en: °C Viento en: m/s

Variables reconocidas: tmax, tmin, prec, rhmean, wind.

Armar la serie y revisarla →

Figura 2.3. Los papeles del ejemplo: fecha, temperatura máxima y mínima, precipitación, humedad relativa media y viento, reconocidos por su nombre. Debajo, el formato de fecha detectado y las unidades.

Papel	Qué acepta
Fecha, o Año + Mes + Día, o Año + Día del año	Una columna de fecha completa en cualquier orden (año-mes-día, día/mes/año o mes/día/año, detectado o elegido a mano), o la fecha repartida en columnas. Sin fecha no hay serie.
Temperatura máxima, mínima, media	En °C o °F (se elige). La media se deriva de las extremas cuando no viene, y queda marcada como <i>derivada</i> .
Precipitación	En mm. Nunca se interpola.
Humedad relativa máxima, mínima o media, punto de rocío	Cualquiera de ellas sirve para la presión de vapor; FAO-56 prefiere, en ese orden, el rocío, las dos extremas, la máxima sola y la media.
Viento	En m/s, km/h, km/día o nudos, a la altura escrita en el sitio.
Insolación (horas de sol) o radiación solar	La radiación en MJ m ⁻² d ⁻¹ , W m ⁻² (media diaria), cal cm ⁻² d ⁻¹ o kJ m ⁻² d ⁻¹ ; se convierte al abrir.
Evaporación de tanque	Se guarda y se exporta, pero no entra en la ETo de FAO-56.
Ignorar	Cualquier columna que no interese.

El botón [Armar la serie y revisarla →](#) construye la serie continua: si el archivo saltó fechas, los días que faltan aparecen como huecos; si repitió alguna, la segunda se descarta y se cuenta. La banda de abajo lo resume: «Serie de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2025: 7,305 días de calendario, 7,305 con registro. Fechas leídas como año-mes-día».

2.5 El control de calidad

Una serie de estación siempre tiene algo: un 99.9 tecleado, una máxima menor que la mínima, un sensor que se quedó pegado en el mismo valor una semana, un hueco de doce días. El control de calidad aplica cinco reglas, en este orden, y deja cada cambio marcado en la fila para que nada se pierda sin rastro.




Figura 2.4. El control de calidad del ejemplo con errores sembrados. Las opciones arriba; los cinco recuadros del resumen; y la tabla por variable con los datos, los faltantes, los rellenados, los huecos y los marcados.

Regla	Qué hace	Opción
Rango físico	Un valor imposible para la variable (una temperatura de 99.9, una humedad de 130 %) se elimina y queda como faltante.	siempre
Tmax < Tmin	Se intercambian, que es el error de captura más común, o se eliminan las dos si se prefiere.	intercambiar Tmax < Tmin
Pico aislado	Un día que se aparta más de N grados de sus dos vecinos se marca, pero se conserva: puede ser un frente real.	Pico > 15 °C
Tramo plano	N días o más con exactamente el mismo valor —un sensor pegado— se marcan y se conservan.	Plano ≥ 7 días

Regla	Qué hace	Opción
Huecos cortos	En las variables continuas (temperatura, humedad, viento, radiación) los huecos de hasta N días se rellenan por interpolación lineal y quedan marcados como <i>interpolados</i> ; los más largos se dejan vacíos. La lluvia nunca se interpola.	Interpolación huecos de hasta 3 días
Lluvia faltante = 0	Solo si se pide: en muchos registros el observador deja en blanco los días sin lluvia. Se aplica únicamente a días que sí tienen temperaturas.	Lluvia faltante = 0...

▶ EJEMPLO · EL MISMO BAJÍO, CON ERRORES SEMBRADOS

La serie limpia tenía 100 % de cobertura y 0 incidencias. La versión con errores queda en **99.4 %** de Tmax y Tmin con 307 valores interpolados, un hueco más largo de 12 días y **18 incidencias**: 4 valores y 14 huecos largos, además de 303 huecos cortos interpolados. La tabla de incidencias las enumera con fecha: un 99.9 en la máxima del 1 de enero de 2014, *fuera de rango físico, eliminado*; un 7 de agosto de 2012 con $11.6 < 28.6$, *intercambiados*; un -13.2 en la mínima del 1 de enero de 2015, *pico aislado, conservado y marcado*; un 24 repetido desde el 1 de enero de 2020, *sensor pegado, marcado*; y huecos de 12 días en enero de 2010, 2016 y 2022, *sin rellenar*. Los 20 años siguen siendo útiles para las normales: cada uno conserva más del 90 % de sus días.

Los cinco recuadros y la tabla por variable


Periodo y días; **años completos**, los que tienen al menos 90 % de Tmax, Tmin y lluvia; la cobertura de **Tmax** y **Tmin** con los valores interpolados; la de la **lluvia** con su hueco más largo; y las **incidencias**. La tabla dice, para cada variable, cuántos días tienen dato, qué porcentaje es, cuántos faltan, cuántos se rellenaron, cuántos huecos hay y cuántos son largos, el hueco más largo y cuántos valores quedaron marcados.

La serie completa y el calendario de disponibilidad

✓ REGLA DE DECISIÓN · CUÁNTOS AÑOS HACEN FALTA

Si hay menos de 3 años completos	entonces es una anécdota: sirve para practicar, no para normales ni probabilidades de helada.
Si hay de 3 a 10	entonces es una estimación; la app lo advierte y conviene decirlo en el informe.
Si hay de 10 a 30	entonces es lo usual en estaciones agrícolas y suficiente para decidir.
Si hay 30 o más	entonces es una normal climática en el sentido de la OMM.
Si un hueco pasa de 6 días	entonces no lo interpolas: se pierden los frentes; mejor una estación vecina o dejarlo vacío.

Las fichas ☐ de *Años completos* y *Rellenados* traen estas escalas. Con 5 años, las probabilidades solo pueden valer 0, 20, 40, 60, 80 o 100 %.



Calendario de disponibilidad ?

PORCENTAJE DE DÍAS CON TEMPERATURA, POR AÑO Y MES

% de días del mes con Tmax y Tmin; rojo = sin dato; punteado = fuera del periodo

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
2006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2007	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2008	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2009	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2010	61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2011	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2013	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2014	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2015	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2016	61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97
2017	87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2018	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2019	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2021	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2022	61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2024	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2025	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Figura 2.5. Arriba, todo el registro de un vistazo: máximas, mínimas y lluvia, con las marcas del control de calidad. Abajo, el calendario de disponibilidad: el porcentaje de días con temperatura de cada mes de cada año, que enseña dónde están los huecos largos.

2.6 Lo que estos datos permiten

Al final de la tarjeta 4, seis sellos dicen qué análisis van a funcionar con las variables que la serie trae, y cómo. Es la respuesta a «¿sirven mis datos?» antes de entrar a cualquier bloque.

Lo que estos datos permiten ?

✓ Grados-día y fenología

✓ ETo Hargreaves

~ ETo Penman-Monteith con estimaciones (radiación)

✓ Balance hídrico y riego

✓ Frío invernal (horas estimadas de Tmax/Tmin)

X Priestley-Taylor y Turc

Penman-Monteith se calculará igual: FAO-56 indica cómo estimar la humedad a partir de la mínima, la radiación a partir de la amplitud térmica y el viento con 2 m/s, y el informe dirá qué se estimó. Hargreaves queda como comparación.

Figura 2.6. Con temperatura, lluvia, humedad y viento: grados-día, Hargreaves, balance y frío funcionan completos; Penman-Monteith se calcula estimando la radiación; Priestley-Taylor y Turc, que necesitan radiación medida, quedan como comparación.

Sello	Qué necesita
Grados-día y fenología	Tmax y Tmin.
ETo Hargreaves	Tmax y Tmin, y la latitud del sitio.
ETo Penman-Monteith	Completa con humedad, viento y radiación o insolación; <i>con estimaciones</i> cuando falta alguna. El sello dice cuál falta.
Balance hídrico y riego	Lluvia y alguna ETo.
Frío invernal	Tmax y Tmin; las horas se reconstruyen con el método de Linvill.
Priestley-Taylor y Turc	Radiación medida o insolación; sin ellas se calculan igual con la radiación estimada, pero se marcan como comparación.

El mensaje azul lo dice con todas sus letras: «*Penman-Monteith se calculará igual: FAO-56 indica cómo estimar la humedad a partir de la mínima, la radiación a partir de la amplitud térmica y el viento con 2 m/s, y el informe dirá qué se estimó. Hargreaves queda como comparación*». El Bloque 5 cuenta los días en que se estimó cada variable y redacta la frase que va al informe.

2.7 La serie limpia y el proyecto

Botón	Qué hace
Ver todas las filas / solo las primeras	Alterna entre la vista previa de 40 filas y la serie entera.
↓ Serie limpia (.csv)	Descarga la serie tal como la usarán los bloques, con una columna flags que dice qué se hizo en cada fila. Es lo que se entrega como anexo de datos.
↓ Guardar proyecto (.json)	El sitio y la serie limpia en un archivo compacto que la app vuelve a abrir en esta o en cualquier otra computadora. Las marcas del control de calidad viajan dentro: un valor interpolado hoy sigue siendo un valor interpolado mañana.
Cargar proyecto	Abre ese archivo (también se puede soltar en la zona de archivos de la tarjeta 2).
Olvidar esta serie	Borra la serie del navegador. No toca ningún archivo.
Continuar al Bloque 3 →	Lleva al clima del sitio.

5 · La serie limpia

Primeras 40 filas de 7,305. Color: interpolado, intercambiado, pico, plano, derivado.

Fecha	tmax	tmin	tmean	prec	rhmean	wind
2006-01-01	22.6	5.9	14.25	0	50	2.4
2006-01-02	20.7	3.4	12.05	0	46	1.4
2006-01-03	21.9	6.4	14.15	0	57	2.2
2006-01-04	23.3	7.6	15.45	0	54	1.8
2006-01-05	23.2	8.8	16	0	51	2
2006-01-06	25.4	9.1	17.25	0	51	2.3
2006-01-07	22.8	10	16.4	0	53	1.5
2006-01-08	25.2	11.1	18.15	0	41	2
2006-01-09	23.7	10.7	17.2	0	44	2.5
2006-01-10	23	11.8	17.4	6.2	80	2
2006-01-11	23.5	6.3	14.9	0	54	2.4

Ver todas las filas / solo las primeras

↓ Serie limpia (.csv)

↓ Guardar proyecto (.json)

Abrir proyecto...

Olvidar esta serie

La serie y el sitio se guardan también en este navegador, así que al volver a abrir la app estarán aquí. El archivo .json es la copia que viaja con la tesis y reproduce el estudio.

Continuar al Bloque 3: el clima del sitio →

Figura 2.7. La serie limpia: las primeras 40 filas con el color de cada marca (interpolado, intercambiado, pico, plano, derivado) y las salidas: el .csv limpio, el proyecto .json y el botón para olvidar la serie.

LO QUE EL NAVEGADOR RECUERDA

Al armar la serie, la app la guarda también en el almacenamiento local del navegador. Al volver a abrir [index.html](#) aparece el aviso «Se recuperó la serie de la sesión anterior desde el navegador. Carga otra si no es la que quieres». Si la serie es muy larga para caber ahí, el proyecto .json es el único respaldo.

2.8 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
La latitud y la altitud son obligatorias...	Sin ellas no se puede armar la serie. Escríbelas en la tarjeta 1.
Latitud polar... / Altitud muy alta...	Revisa el signo y las unidades; los métodos de radiación de FAO-56 valen para latitudes menores y la altitud va en metros.
Una longitud positiva entre 86 y 118 con esa latitud parece México escrito sin el signo negativo	No afecta los cálculos, pero el informe la citará así: corrígela.
No se encontraron filas con números	La tabla pegada o el archivo no tienen una fila de encabezados seguida de filas numéricas; revisa el separador y que la fecha esté en una columna.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>Falta la fecha: marca una columna como Fecha, o Año + Mes + Día, o Año + Día del año</i>	La app no encontró la fecha por el nombre; elígela en el selector de la columna.
<i>Sin Tmax y Tmin casi nada se puede calcular</i>	Asigna los papeles de las temperaturas; sin ellas la serie no sirve para grados-día, ETo ni balance.
<i>Con N años completos las normales y las probabilidades de helada serán una estimación gruesa</i>	Aparece con menos de 10 años completos. La OMM pide 30 y en la práctica se aceptan 10; dilo en el informe.
<i>Los libros de Excel no se leen directamente</i>	Guarda como .csv o copia y pega las celdas.
<i>El archivo no es un proyecto de PhenologyPro</i>	Se intentó cargar un .json que no escribió la app.
<i>Los datos del ejemplo son sintéticos y ficticios</i>	Recordatorio al cargar un ejemplo: sirve para practicar, no para citarse.

3

BLOQUE 3 · CLIMA DEL SITIO

El clima del sitio

Antes de sembrar nada hay que saber dónde se está. Este bloque convierte los años de la serie en la descripción climática del sitio: las normales mensuales, el climograma de Walter–Lieth, cuándo empiezan y terminan las lluvias, cuándo hiela y con qué probabilidad, los índices de aridez y de humedad, el balance climático de Thornthwaite–Mather y la clasificación de Köppen–Geiger. Todo se calcula con los criterios que elijas y se escribe en un párrafo que va tal cual al informe.

3.1 Qué es una normal y de qué años sale

3.3 El clima en una página: el climograma

3.5 El régimen de lluvias

3.7 Índices, balance climático y clasificación

3.2 Con qué años y con qué criterios

3.4 Las normales mensuales

3.6 Las heladas

3.8 Los avisos de este bloque

3.1 Qué es una normal y de qué años sale

Una **normal climática** es el promedio de una variable, mes por mes, sobre un periodo largo: la temperatura media de julio, la lluvia de septiembre. La Organización Meteorológica Mundial pide treinta años; en la práctica agrícola se aceptan diez, y con menos se trabaja sabiendo que es una estimación. Todo lo que este bloque calcula —el climograma, los índices, la clasificación— sale de esas doce parejas de temperatura y lluvia, y por eso la primera decisión es de qué años se sacan.

La app aplica una regla por mes: un mes de un año entra en la normal solo si tiene al menos el **80 % de sus días** con dato. Así, un año con un hueco de tres semanas en marzo aporta once meses y no contamina el duodécimo. Las heladas y la temporada de lluvias, que son cuentas por año y no por mes, usan cada temporada completa del registro.

3.2 Con qué años y con qué criterios

1 · Con qué años y con qué criterios ?

Años

Solo los años completos (≥ 90 %)

Umbral de helada ?

0 °C (meteorológica)

Suelo del balance (mm)

100

Inicio de lluvias: mm en 3 días

20

racha seca que lo anula

10

días

Recalcular

Figura 3.1. Los criterios del bloque: los años que entran, el umbral de helada, los milímetros que abren la temporada de lluvias, la racha seca que la desmiente y la capacidad de almacenamiento del balance climático.

Control	Opciones y para qué
Años	Solo los años completos (≥ 90 %) , el valor por omisión; Los últimos 30 años completos , para acercarse a la normal de la OMM cuando la serie es larga; o Todos, mes por mes , que aprovecha cada mes con 80 % de días aunque el año esté incompleto.
Umbral de helada	0 °C (meteorológica) ; 2 °C para el daño en superficie en cultivos sensibles (las hojas se enfrían por debajo del aire en noche despejada); -2 °C para cultivos tolerantes; -4 °C para helada severa. Los Bloques 4 y 9 heredan este umbral.
Inicio de la temporada	Los milímetros (20 por omisión) que deben caer en tres días para declarar el inicio de las lluvias, y la racha seca (10 días) que, si aparece en el mes siguiente, desmiente ese inicio. Es la definición agronómica de Stern, Dennett y Garbutt (1981).
Almacenamiento	La capacidad de la cubeta del balance climático de Thornthwaite–Mather, en mm (100 por omisión; 150 en suelos profundos, 50 en delgados).
	Recalcular Rehace el bloque con los criterios escritos.

3.3 El clima en una página: el climograma

La tarjeta 2 empieza con un párrafo que la app redacta con los resultados. Es el mismo que abre la sección de clima del informe, y conviene leerlo antes que nada porque resume el bloque:

EJEMPLO · EL PÁRRAFO DEL BAJÍO

«*Bajío semiárido (1 800 m), a 1800 m de altitud, tiene un clima BSh (estepario cálido, semiárido) según Köppen–Geiger: temperatura media anual de 18.5 °C con oscilación de 9.0 °C entre el mes más frío (noviembre) y el más cálido (mayo), y 546 mm de lluvia anual concentrada en julio. Según el índice de aridez del PNUMA (0.64) es un clima subhúmedo seco; el índice de humedad de Thornthwaite (–36) lo clasifica como semiárido. Las lluvias empiezan en la mediana el 6 jun (entre el 16 may y el 26 jun en el 60 % central de los años) y terminan hacia el 19 oct; el 84 % del año cae en el semestre cálido. Hiela en 2 de 20 temporadas, con 0.1 días de helada al año en promedio y una mínima absoluta de –1.6 °C.*»

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

18.5 °C
de 13.9 °C (nov) a 23.0 °C (may)

PRECIPITACIÓN ANUAL

546 mm
CV entre años 10% · P20 495 mm · P80 593 mm

ÍNDICE DE ARIDEZ P/ETP

0.64 *subhúmedo seco*
ETP Thornthwaite 854 mm/año

KÖPPEN–GEIGER

BSh
estepario cálido (semiárido)

PERIODO LIBRE DE HELADAS

358 días
mín. 288 · el 20 % de los años < 365

TEMPORADA DE LLUVIAS

6 jun – 19 oct
mediana 137 días · concentración estacional

MESES HÚMEDOS / SECOS

5 / 7
P > 2T contra P < 2T (Gaussen)

PERIODO DE CRECIMIENTO (FAO)

5 meses
meses con P > 0.5 ETP; 12 con T > 10 °C

Bajío semiárido (1 800 m), a 1800 m de altitud, tiene un clima **BSh (estepario cálido (semiárido))** según Köppen–Geiger: temperatura media anual de 18.5 °C con oscilación de 9.0 °C entre el mes más frío (noviembre) y el más cálido (mayo), y 546 mm de lluvia anual concentrada en julio. Según el índice de aridez del PNUMA (0.64) es un clima **subhúmedo seco**; el índice de humedad de Thornthwaite (–36) lo clasifica como semiárido.

Las lluvias empiezan en la mediana el 6 jun (entre el 16 may y el 26 jun en el 60 % central de los años) y terminan hacia el 19 oct; el 84% del año cae en el semestre cálido. Hiela en 2 de 20 temporadas, con 0.1 días de helada al año en promedio y una mínima absoluta de –1.6 °C; la última helada de primavera cae en promedio el 31 dic y la primera de otoño el 23 oct.

Figura 3.2. El párrafo y los ocho recuadros que lo sostienen. Cada cifra lleva su etiqueta de escala: *subhúmedo seco* para el índice de aridez, *concentración estacional* para las lluvias.

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
Temperatura media anual	La media de las doce medias mensuales, con el mes más frío y el más cálido.	18.5 °C, de 13.9 (nov) a 23.0 (may)
Precipitación anual	La suma de las normales mensuales, con el coeficiente de variación entre años y los percentiles 20 y 80 del total anual.	546 mm · CV 10 % · P20 495 · P80 593
Índice de aridez P/ETP	Lluvia entre evapotranspiración potencial de Thornthwaite, con la clase del PNUMA.	0.64, <i>subhúmedo seco</i> · ETP 854 mm
Köppen–Geiger	La clase y su nombre.	BSh, estepario cálido

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
Periodo libre de heladas	Días entre la última helada de primavera y la primera de otoño, en promedio, con el mínimo y el P20.	358 días · mín. 288
Temporada de lluvias	Inicio y fin medianos y duración.	6 jun – 19 oct · 137 días
Meses húmedos / secos	Los meses con $P > 2T$ contra los de $P < 2T$, el criterio de Gausсен que dibuja el climograma.	5 / 7
Periodo de crecimiento (FAO)	Meses con $P > 0.5$ ETP, el criterio de las zonas agroecológicas, y cuántos tienen $T > 10$ °C.	5 meses; 12 con $T > 10$ °C




Figura 3.3. El climograma de Walter–Lieth del Bajío. Con la escala 10 °C = 20 mm, donde la curva azul de la lluvia va por encima de la roja de la temperatura el mes es húmedo; donde va por debajo, seco. Los meses con helada llevan una franja bajo el eje.

TEORÍA EN BREVE · LAS CONVENCIONES DE WALTER Y LIETH

El climograma pone la temperatura media mensual y la lluvia mensual en el mismo eje con la relación **10 °C = 20 mm**. Esa relación no es arbitraria: con ella, el mes en que la lluvia queda por debajo de la temperatura es un mes en que la evaporación potencial supera a la lluvia ($P < 2T$), es decir, un mes **seco**; el contrario es **húmedo**. Por encima de 100 mm la escala se comprime a 1:10 y el área se pinta de azul sólido: es el periodo **perhúmedo**. Debajo del eje se marcan los meses con mínima absoluta bajo cero. Con un vistazo se ve la duración de la temporada de lluvias, la sequía intraestival si la hay y los meses de riesgo de helada. La app lo dibuja con las normales calculadas y lo exporta como cualquier figura.

3.4 Las normales mensuales



Figura 3.4. Las normales del Bajío: la figura con la banda entre la máxima y la mínima, la media y las barras de lluvia con su P20–P80, y la tabla con las trece columnas, que se descarga con [↓ Normales \(.csv\)](#).

La tabla trae, para cada mes, la **Tmax**, la **Tmedia** y la **Tmin** promedio, la **máxima y la mínima absolutas** del registro, la **lluvia** media con sus **P20 y P80** entre años, los **días con lluvia** (≥ 1 mm), los **días con helada**, la **humedad relativa** y el **viento** a 2 m cuando la serie los trae, y cuántos años aportaron a la temperatura y a la lluvia. La última fila es el año: medias para las temperaturas, sumas para la lluvia y los días.

EJEMPLO · LEER LA TABLA DEL BAJÍO

Mayo es el mes más cálido (23.0 °C de media, 29.9 de máxima) y también el más seco antes de las lluvias: 43 mm, pero con un P20 de 18 y un P80 de 65, la mayor incertidumbre relativa del año. Julio es el más lluvioso (111 mm, entre 93 y 137 en el 60 % central de los años). De noviembre a marzo llueve menos de 20 mm al mes y la humedad relativa baja a 37 % en marzo: es el invierno seco del clima BS. La mínima absoluta del registro, -1.6 °C, cayó en octubre.

3.5 El régimen de lluvias




Figura 3.5. El régimen de lluvias del Bajío y el calendario de sus veinte años: la barra azul es la temporada de lluvias de cada año, la línea punteada el mes más cálido, y el verde los días sin helada.

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
Índice de concentración (PCI)	El índice de Oliver (1980): $100 \Sigma p^2 / (\Sigma p)^2$. Menos de 10 es uniforme; de 10 a 15, moderadamente estacional; de 15 a 20, estacional; más de 20, fuertemente estacional.	15.3, <i>estacional</i>
Lluvia del semestre cálido	La fracción de la lluvia anual que cae de abril a septiembre en el hemisferio norte (de octubre a marzo en el sur).	84 %
Días con lluvia ≥ 1 mm	Al año, y la lámina media de cada día lluvioso.	75 · 7.3 mm
Inicio de la temporada	La mediana entre años del primer día, contado desde el mes más seco, en que caen 20 mm en tres días sin que le siga una racha seca de 10 días en el mes siguiente; con su P20 y su P80.	6 jun (16 may – 26 jun)

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
Fin de la temporada	El primer día, al menos 60 días después del inicio, a partir del cual caen menos de 10 mm en 30 días.	19 oct (1 oct – 11 nov)
Duración	Días entre inicio y fin, mediana y 60 % central.	137 días (115–166)

! EL INICIO DE LAS LLUVIAS ES UNA PROBABILIDAD, NO UNA FECHA

En el Bajío la temporada empieza el 6 de junio en la mediana, pero el 20 % de los años empieza antes del 16 de mayo y otro 20 % después del 26 de junio: cuarenta días de diferencia entre un año temprano y uno tardío. Quien siembra en seco esperando la lluvia del 6 de junio se equivoca uno de cada cinco años por más de tres semanas. El calendario de la figura 3.5 muestra esa dispersión año por año, y el Bloque 9 la convierte en la probabilidad de que el agua alcance para cada fecha de siembra.

3.6 Las heladas

En el Bajío casi no hiela: 2 de 20 temporadas, 0.1 días al año, -1.6°C de mínima absoluta. Para enseñar la tarjeta de heladas conviene otro sitio de práctica, el **Valle templado (2 250 m)**, donde hiela en 16 de 20 inviernos. Las cifras de esta sección son de ese ejemplo.

Recuadro	Qué dice	En el Valle templado
Temporadas con helada	Cuántas de las temporadas del registro tuvieron al menos un día con $T_{\min} \leq \text{umbral}$.	16 / 20
Días de helada por año	El promedio, con la mínima absoluta del registro y su clase.	2.9 · -2.4°C , <i>helada moderada</i>
Última helada de primavera	La fecha promedio de la última helada antes del mes más cálido, y la más tardía del registro.	30 ene · la más tardía 5 feb
Primera helada de otoño	La fecha promedio de la primera helada después del mes más cálido, y la más temprana.	21 oct · la más temprana 18 ago
Periodo libre de heladas	Los días entre ambas, en promedio, con el más corto y el P20.	304 días · el más corto 229 · P20 259

La probabilidad y las fechas según el riesgo

Cada temporada se parte en el mes más cálido: lo que hiela antes es helada de primavera, lo que hiela después es de otoño. Con las últimas heladas de primavera de cada año se construye la curva de la probabilidad de que *todavía* hiele después de una fecha; con las primeras de otoño, la de que *ya* haya helado antes de una fecha. La tabla lee esas curvas al 50, 20 y 10 % de riesgo:




Figura 3.6. Las heladas del Valle templado: temporadas con helada, días por año, última de primavera, primera de otoño y periodo libre; la probabilidad de helada a lo largo del año, partida en el mes más cálido; y las fechas de siembra y cosecha según el riesgo que se acepte.

Riesgo aceptado	Sembrar después del	Cosechar antes del	Días entre ambas
50 %	1 ene	26 oct	298
20 %	1 ene	4 oct	276
10 %	1 ene	11 sep	253

B3

En el Valle templado las heladas son de invierno —diciembre concentra 1.3 días y el 50 % de los años, octubre y noviembre 0.6 días—, así que la primavera queda libre desde enero y lo que manda es el otoño: quien acepte fallar uno de cada cinco años cosecha antes del 4 de octubre; quien solo acepte uno de cada diez, antes del 11 de septiembre. Esas fechas son **frecuencias empíricas**: con 20 años, el 10 % es dos años, y la app lo recuerda en la ficha de ayuda.



REGLA DE DECISIÓN · LEER LA TABLA DE HELADAS

Si hiela en menos de una de cada cinco temporadas	entonces las fechas al 20 y 10 % coinciden con los extremos del año y no dicen nada: el informe omite la tabla y habla de heladas ocasionales.
Si el cultivo es sensible (hortalizas, frijol, maíz en floración)	entonces usa el umbral de 2 °C y el riesgo del 10 %.
Si el cultivo tolera (trigo, cebada, avena en macollo)	entonces el umbral de -2 °C y el 20 % bastan.
Si la serie tiene menos de 10 temporadas	entonces los porcentajes son gruesos; reporta el periodo libre más corto del registro en lugar del P20.

El Bloque 9 lleva estas curvas a cada etapa del cultivo: no importa que hiele, importa que hiele en la floración.

B3

3.7 Índices, balance climático y clasificación




Figura 3.7. Los índices del Bajío, con su valor, su clase y cómo se obtuvo cada uno, y el balance climático de Thornthwaite–Mather: la ETP, la lluvia, la evapotranspiración real y el déficit mes por mes.

Índice	Cómo se obtiene	En el Bajío
Köppen–Geiger (Peel et al. 2007)	Con las normales de temperatura y lluvia y el hemisferio: el umbral de aridez de los climas B sale de la temperatura media y de en qué mitad del año llueve; los grupos A, C y D, de la temperatura del mes más frío; la letra de la lluvia, del mes más seco.	BSH: umbral de aridez 650 mm contra 546 mm; mes más seco 3 mm
Cociente P/T (García)	Lluvia anual entre temperatura media anual. En los grupos A y C da el subtipo de humedad (w0, w1, w2); en los B separa BS0, BS1 y BW.	29.5 → BS1
Índice de aridez del PNUMA	P/ETP con la ETP de Thornthwaite. Clases en 0.05, 0.20, 0.50 y 0.65.	0.64, <i>subhúmedo seco</i>
De Martonne	P/(T + 10). Clases en 5, 10, 20, 30 y 60.	19.2, <i>mediterráneo / semihúmedo</i>
Factor de lluvia de Lang	P/T. Clases en 20, 40, 60, 100 y 160.	29.5, <i>árido</i>
Índice de humedad de Thornthwaite (1955)	100 (P – ETP)/ETP. Clases en 100, 80, 60, 40, 20, 0, –33.3 y –66.7.	–36.0, <i>semiárido</i>

Índice	Cómo se obtiene	En el Bajío
Balance de Thornthwaite–Mather	Mes a mes, la lluvia llena una cubeta de la capacidad elegida y la ETP la vacía; lo que la ETP no consigue es déficit y lo que rebosa es excedente.	déficit 308 mm, excedente 0; ETR 546 de 854 mm de ETP
Periodo de crecimiento (FAO)	Meses con $P > 0.5$ ETP; de ellos, los húmedos tienen $P > \text{ETP}$; la temperatura lo corta si baja de 6.5°C .	5 meses, 5 húmedos

1 CUATRO ÍNDICES, CUATRO RESPUESTAS

El mismo sitio es *subhúmedo seco* para el PNUMA, *semihúmedo* para De Martonne, *árido* para Lang y *semiárido* para Thornthwaite. No es una contradicción: cada índice divide el continuo en clases distintas y con umbrales pensados para regiones distintas. El que se cita en la literatura agroclimática actual es el del PNUMA, porque compara la lluvia con una demanda de evaporación y no solo con la temperatura; los otros se dan para que el estudio se pueda comparar con trabajos antiguos.

Las dos últimas figuras del bloque son el **balance hídrico climático** —ETP, lluvia, evapotranspiración real, déficit y excedente por mes— y el **agua almacenada en el suelo** a lo largo del año según ese balance. Son el antecedente mensual del balance diario del Bloque 6: dicen, a grandes rasgos, en qué meses el clima deja agua en el suelo y en cuáles la agota.

3.8 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
No hay suficientes meses completos para las normales: cada mes necesita al menos un año con 80 % de sus días	Error: con los años elegidos algún mes se quedó sin dato. Revisa el calendario de disponibilidad del Bloque 2 o cambia a Todos, mes por mes .
Normales calculadas con N años: una estimación, no una normal climática	Aviso con menos de 10 años. Se puede seguir, diciéndolo en el informe.
Primero hace falta una serie	El bloque no tiene qué calcular: vuelve al Bloque 2.

4

BLOQUE 4 · GRADOS-DÍA

B4

Grados-día y tiempo térmico

El reloj del cultivo no marca días sino calor. Este bloque acumula los grados-día desde la fecha de siembra que elijas, en cada uno de los años del registro, con el método y los umbrales con que se publicó el requerimiento del cultivo; dice cuántos días tarda la meta y en qué fracción de los años se alcanza; dibuja el calendario térmico del sitio; prueba todas las fechas de siembra del año; y mide cuánto cambia el resultado de un método a otro, para que nunca se mezclen.

4.1 La planta no cuenta días

4.3 Desde esa fecha, cada año

4.5 Lo que ofrece cada fecha de siembra

4.7 Los avisos de este bloque

4.2 Cultivo, método y fecha

4.4 El calendario térmico del sitio

4.6 Cuánto importa el método

4.1 La planta no cuenta días

Entre una temperatura **base** por debajo de la cual no crece y un **umbral superior** por encima del cual deja de acelerar, el desarrollo de una planta avanza casi en proporción a la temperatura. Sumar, día tras día, lo que la temperatura excede de la base da los **grados-día** (°C·d): una moneda con la que cada etapa tiene un precio fijo —tantos °C·d para emerger, tantos para florecer— que el sitio paga más rápido en mayo que en noviembre.

°C·d del día = $\max(0, T - \text{base})$, con T acotada al umbral superior según el corte elegido; acumulados = $\sum$ °C·d desde la siembra

La fórmula simple esconde tres decisiones, y las tres cambian el número: **qué base** (10 °C para el maíz, 0 o 4.5 para el trigo, 12–13 para el algodón), **qué hacer arriba del umbral** (nada, acotar, recortar) y **qué forma darle al día** (el promedio de los extremos, un triángulo, una senoide). Un requerimiento térmico publicado vale con el método con que se midió. Por eso el catálogo de la app guarda, junto al requerimiento de cada cultivo, el método y los umbrales con que se publicó, y por eso la última tarjeta de este bloque muestra cuánto se separan los métodos entre sí.

TEORÍA EN BREVE · LOS SEIS MÉTODOS Y LOS CUATRO CORTES

Promedio: $(T_{\max} + T_{\min})/2 - \text{base}$, el más usado (McMaster y Wilhelm 1997). **Promedio acotado:** antes de promediar, $T_{\max}$ se acota a 30 °C y $T_{\min}$ a 10 °C; es el método con que se publican los requerimientos del maíz en Estados Unidos. **Triángulo simple** y **seno simple:** integran una onda triangular o senoidal entre la mínima y la máxima del día (Lindsey y Newman 1956; Baskerville y Emin 1969; Allen 1976). **Triángulo doble** y **seno doble:** la primera mitad del día sube de la mínima a la máxima y la segunda baja hacia la mínima del día siguiente. Los **cortes** deciden qué pasa con la parte del día por encima del umbral superior: *horizontal* la cuenta como si estuviera en el umbral; *intermedio* la descuenta; *vertical* no cuenta nada de ese tiempo; *sin corte* la deja pasar. Las **unidades calor de Ontario** (CHU) son otra escala: día y noche por separado, con una parábola de día, usadas para el maíz en Canadá (Brown 1975).

4.2 Cultivo, método y fecha

1 · Cultivo, método y fecha

Elegir un cultivo carga su base, su umbral, el método con que se publicó su requerimiento y los °C·d hasta la madurez (orientativos); después puedes cambiar cada número. La fecha de siembra se aplica a todos los años del registro.

CULTIVO

Maíz (grano)

MÉTODO

Promedio acotado (maíz)

CORTE SUPERIOR

Horizontal

TEMPERATURA BASE (°C)

10

UMBRAL SUPERIOR (°C)

30

FECHA DE SIEMBRA

15

abril

META TÉRMICA (°C·D A MADUREZ)

1450

TEMPORADA (DÍAS)

140

☐ Detener la acumulación en la primera helada (umbral del Bloque 3)

Recalcular

Vacía para solo medir lo que ofrece la temporada.

Figura 4.1. Los parámetros del maíz de grano en el Bajío: promedio acotado con corte horizontal, base 10 °C, umbral 30 °C, siembra el 15 de abril, meta de 1,450 °C·d y temporada de 140 días. Elegir un cultivo carga sus valores; después cada número se puede cambiar.

Control	Qué hace
Cultivo	Uno de los 19 del catálogo. Carga la base, el umbral, el método con que se publicó el requerimiento y los °C·d hasta la madurez, que son orientativos y se calibran en el Bloque 8.
Método y Corte superior	Los seis métodos y las CHU; los cuatro cortes. Con las CHU no hay base ni corte que elegir.
Temperatura base y Umbral superior	En °C. El umbral se puede dejar vacío para no acotar.
Fecha de siembra	Día y mes. Se aplica a todos los años del registro.
Meta térmica	Los °C·d a madurez que se persiguen; la app cuenta los días hasta alcanzarlos.
Temporada (días)	La ventana en la que se suman los °C·d disponibles (140 por omisión para el maíz). Es también el horizonte del mapa de fechas de siembra.
Detener la acumulación en la primera helada (umbral del Bloque 3)	Si se marca, la acumulación de cada año se corta al primer día con Tmin bajo el umbral de helada elegido en el Bloque 3; los años cortados no llegan a la meta por frío, no por falta de calor.

4.3 Desde esa fecha, cada año

La tarjeta 2 siembra el cultivo el 15 de abril de cada uno de los veinte años, acumula y resume. Los recuadros dan el resultado y el párrafo de abajo lo lee:

B4




Figura 4.2. Los veinte años del Bajío sembrados el 15 de abril: cada línea fina es un año, la gruesa la mediana y la banda el 60 % central. La línea horizontal es la meta de 1,450 °C·d; donde la mediana la cruza está el día 127.

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
°C·d por año	El total de un año calendario con esa base y ese método: el tamaño del «presupuesto térmico» del sitio.	3,244
Mes más cálido	El mes que más °C·d aporta por día.	mayo · 12.5 °C·d/día
Días a la meta	La mediana entre años, el P20 y el P80, y cuántos años entran en la cuenta.	127 · P20 123 · P80 133 · 20 años
Años que la alcanzan	La fracción de años en que la meta se alcanzó dentro de la ventana revisada (la temporada más sesenta días).	100 %
°C·d en la temporada	Los que se juntan en los días de temporada declarados, con el coeficiente de variación entre años.	1,553 en 140 días · CV 3 %

EJEMPLO · EL PÁRRAFO DE LA TARJETA

«Sembrando el 15 de abril, Maíz (grano) junta sus 1,450 °C·d en 127 días en el año mediano, pero entre 123 y 133 en el 60 % central de los años: una variación manejable. Todos los años la alcanzaron.»

El cuadro por año, plegado bajo la figura, da el detalle: los °C·d a los 30, 60, 90 y 120 días, el total de la temporada, los días a la meta, la fecha en que se alcanzó y los días sin dato. En 2013, el año más cálido, la meta cayó el 12 de agosto a los 119 días; en 2017, el más fresco, el 31 de agosto a los 138. Diecinueve días de diferencia entre el año más rápido y el más lento: eso es lo que el calendario de siembra debe absorber.

▼ Cuadro por año

Año	30 d	60 d	90 d	120 d	Total (140 d)	Días a la meta ?	Fecha de la meta	Días sin dato
2006	327	689	963	1,300	1,486	135	28 ago	0
2007	368	763	1,113	1,416	1,592	123	16 ago	0
2008	361	694	1,026	1,370	1,508	132	24 ago	0
2009	365	750	1,117	1,381	1,538	130	22 ago	0
2010	398	788	1,144	1,435	1,588	123	15 ago	0
2011	376	737	1,080	1,395	1,557	126	18 ago	0
2012	354	733	1,046	1,333	1,496	134	27 ago	0
2013	386	800	1,180	1,460	1,598	119	12 ago	0
2014	370	748	1,150	1,433	1,587	122	15 ago	0
2015	353	722	1,038	1,351	1,511	133	26 ago	0
2016	381	796	1,142	1,430	1,611	122	15 ago	0

↓ Por año (.csv)

Figura 4.3. El cuadro por año, que se descarga con [↓ Por año \(.csv\)](#).

✓ REGLA DE DECISIÓN · LA VARIABILIDAD DEL TIEMPO TÉRMICO	
Si el CV de los °C·d de la temporada es menor de 5 %	entonces el sitio es muy estable (trópico de altura, costa): planea con la mediana.
Si está entre 5 y 10 %	entonces es estable; la mediana sirve y el P20 es el margen.
Si está entre 10 y 20 %	entonces es variable: planea con el P20, no con la media.
Si pasa de 20 %	entonces es muy variable (clima continental o serie corta); revisa la serie antes de decidir.
La ficha ? de °C·d en la temporada trae esta escala. En el Bajío el CV es de 3 %.	

4.4 El calendario térmico del sitio




Figura 4.4. El calendario térmico del Bajío. A la izquierda, cuántos °C·d aporta un día de cada mes, con la barra de error del 60 % central y el total del mes encima; a la derecha, los °C·d de cada año del registro contra la media.

El calendario térmico es la velocidad del reloj del cultivo en cada época del año: en el Bajío, un día de mayo vale 12.5 °C·d y uno de noviembre 5.6, así que la misma etapa tarda más del doble en invierno que en primavera. El cuadro plegado bajo la figura da el valor por día de cada mes con su P20 y P80 y el total del mes: mayo 386, junio 359, abril 360, noviembre 169. La figura de la derecha dice si el registro tiene tendencia o rachas: los años por encima de la media van en un color y los de abajo en otro. Cuando se ve una racha reciente, conviene preguntarse si el clima está cambiando; el Bloque 9 lo prueba con escenarios.

4.5 Lo que ofrece cada fecha de siembra

La tarjeta 4 «siembra» el cultivo cada cinco días del año, en todos los años del registro, y responde tres preguntas para cada fecha: cuántos °C·d junta en la temporada, cuántos días tarda en llegar a la meta y en qué fracción de los años lo logra.




Figura 4.5. El mapa del maíz en el Bajío. A la izquierda, los °C·d disponibles en 140 días según la fecha de siembra (mediana y P20–P80) contra el requerimiento de 1,450; los puntos verdes marcan las fechas que lo alcanzan en al menos cuatro de cada cinco años. A la derecha, los días a la meta y, en el eje derecho, el porcentaje de años que la alcanzan; la línea punteada es la mejor fecha.

► EJEMPLO · LA MEJOR FECHA TÉRMICA

«La fecha que madura más rápido con al menos 80 % de los años alcanzando la meta es el 22 mar (122 días en la mediana, 100 % de los años). El Bloque 9 cruzará este mapa con las heladas y el agua para dar la ventana de siembra completa.»

El cuadro cada diez días lo detalla: sembrando el 1 de enero solo el 15 % de los años junta 1,450 °C·d en la temporada; el 31 de enero, el 95 %; del 10 de febrero al 11 de abril, el 100 %, con la meta entre 122 y 129 días; el 1 de mayo baja al 60 % y desde ahí la temporada de 140 días ya no alcanza. Es la lectura **solo térmica**: dice que el Bajío puede madurar maíz sembrado en marzo, no que haya agua para hacerlo. Esa es la razón del Bloque 9.

▼ Cuadro por fecha de siembra (cada diez días)

Siembra	°C·d en 140 d (mediana) ?	P20	P80	Días a la meta ?	P20-P80	Años que la alcanzan ?	Años
1 ene	1,397	1,324	1,423	139	138-139	15% X	20
11 ene	1,445	1,391	1,474	138	135-139	45% X	20
21 ene	1,498	1,448	1,533	135	133-137	75% ~	20
31 ene	1,538	1,495	1,590	132	129-135	95% ✓	20
10 feb	1,572	1,540	1,642	129	125-132	100% ✓	20
20 feb	1,602	1,562	1,672	127	122-130	100% ✓	20
2 mar	1,615	1,583	1,695	125	119-128	100% ✓	20
12 mar	1,621	1,587	1,681	125	118-127	100% ✓	20
22 mar	1,613	1,575	1,684	122	116-127	100% ✓	20
1 abr	1,594	1,565	1,646	123	119-127	100% ✓	20
11 abr	1,567	1,519	1,607	127	120-131	100% ✓	20

↓ Mapa completo (.csv)

Figura 4.6. El cuadro por fecha de siembra, cada diez días; el completo, cada cinco, se descarga con [↓ Mapa completo \(.csv\)](#). La marca de la última columna dice si la fecha alcanza la meta en al menos 80 % de los años (✓), entre 60 y 80 (~) o menos (X).

4.6 Cuánto importa el método

Método	Sin corte	Horizontal	Intermedio	Vertical
Promedio	1,654	1,654	1,654	1,654
Promedio acotado (maíz)	—	1,611	—	—
Triángulo simple	1,654	1,645	1,636	1,525
Seno simple	1,655	1,638	1,620	1,439
Triángulo doble	1,653	1,644	1,635	1,524
Seno doble	1,653	1,636	1,619	1,438



Figura 4.7. La misma temporada de 140 días del año 2016 con seis métodos y cuatro cortes. Las diferencias son la razón de no mezclar nunca un requerimiento publicado con un método distinto del suyo.

La app lo resume: «Entre el método más bajo y el más alto hay 216 °C·d (15 %): esa es la razón de usar siempre el método con que se publicó el requerimiento. Las unidades calor de Ontario de la misma temporada: 3,613 CHU. Tu elección actual da 1,611.» En el Bajío el promedio no siente el corte porque la media diaria casi nunca pasa de 30 °C, pero el seno y el triángulo sí, porque integran las horas de la tarde que sí lo pasan: con corte vertical pierden más de 200 °C·d. Un requerimiento de 1,450 medido con seno y corte vertical no es el mismo número que 1,450 medidos con promedio acotado.

! EL REQUERIMIENTO MANDA SOBRE EL MÉTODO, NO AL REVÉS

Elige el método por la fuente del requerimiento, no por gusto. Si el número viene de un boletín de Iowa o de Ontario, es promedio acotado o CHU; si viene de un artículo de entomología o de horticultura, casi siempre es seno simple con corte horizontal; si viene de tu propia parcela (Bloque 8), es el que hayas usado para calibrar. La app guarda el método en el registro de cálculo y lo escribe en los métodos del informe.

4.7 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>En N % de los años la meta no se alcanzó en la ventana revisada</i>	La temporada más sesenta días no bastó en esos años. Alarga la temporada, baja la meta con un cultivar precoz o mueve la fecha.
<i>Ninguna fecha alcanza la meta en al menos 80 % de los años dentro de la temporada elegida</i>	El mapa no encontró una fecha segura. Alarga la temporada, revisa la meta o considera un cultivar más precoz.
<i>Temporada de N días del año A... Entre el método más bajo y el más alto hay X °C·d</i>	No es un aviso sino la lectura de la tarjeta 5: si la diferencia pasa del 10 %, el método con que se publicó el requerimiento importa de verdad.
<i>Primero hace falta una serie</i>	Vuelve al Bloque 2.

5

BLOQUE 5 · EVAPOTRANSPIRACIÓN

Evapotranspiración de referencia

Cuánta agua pide la atmósfera del sitio, día por día, medida como la evapotranspiración de un pasto bien regado. Penman–Monteith FAO-56 con lo que la estación mida —estimando lo que falte exactamente como manda FAO-56 y contando los días en que lo hizo—, cuatro métodos simples para comparar, la calibración local de Hargreaves y la decisión de qué ETo alimentará el balance hídrico y el riego.

5.1 La demanda de la atmósfera

5.3 La ETo del sitio, por cinco métodos

5.5 Hargreaves calibrado contra Penman–Monteith

5.7 Los avisos de este bloque

5.2 Cómo se estima lo que falta

5.4 De dónde sale la ETo

5.6 Qué ETo usarán los bloques siguientes

5.1 La demanda de la atmósfera

Evaporar un milímetro de agua sobre un metro cuadrado cuesta 2.45 megajulios. Esa energía la pone el sol, y el aire seco y el viento se la llevan en forma de vapor. La **evapotranspiración de referencia** (ET_o) es cuánta agua perdería por día una superficie de pasto de 12 cm, bien regada, con albedo 0.23 y resistencia de superficie fija, bajo el clima del sitio: no depende del cultivo ni del suelo, solo del clima, y por eso sirve como vara para todos los cultivos.

La ecuación de **Penman–Monteith** en la forma de FAO-56 (ecuación 6) la calcula sumando dos términos: uno de **radiación**, que depende de la radiación neta y de la pendiente de la curva de presión de vapor, y uno **aerodinámico**, que depende del viento y del déficit de presión de vapor. Es el método que la FAO fijó como estándar en 1998 después de comparar todos los demás contra lisímetros, y el que la app usa por omisión.

$$ET_o = [0.408 \Delta (R_n - G) + \gamma \cdot 900 / (T + 273) \cdot u_2 (e_s - e_a)] / [\Delta + \gamma (1 + 0.34 u_2)]$$

(FAO-56, ec. 6)

TEORÍA EN BREVE · LOS CUATRO MÉTODOS SIMPLES

Hargreaves–Samani (1985): $ET_o = 0.0023 \cdot R_a \cdot (T + 17.8) \cdot \sqrt{(T_{max} - T_{min})}$; solo temperatura y radiación extraterrestre, que sale de la latitud y la fecha. La amplitud térmica hace de sustituto de la nubosidad y de la humedad. **Priestley–Taylor (1972)**: solo el término de radiación de Penman–Monteith multiplicado por $\alpha = 1.26$; vale en climas húmedos sin advección. **Turc (1961)**: de la temperatura media y la radiación solar, con corrección por humedad baja. **Thornthwaite (1948)**: mensual, de la temperatura media y la latitud; es la ETP con que se hacen el balance climático y los índices del Bloque 3. Ninguno sustituye a Penman–Monteith cuando se puede calcular; todos sirven para comparar y para el sitio destino que solo tenga temperatura.

5.2 Cómo se estima lo que falta

Casi ninguna estación agrícola mide radiación; muchas no miden humedad ni viento. FAO-56 no dice «entonces usa otro método»: dice cómo estimar cada variable faltante (capítulo 3, «Missing climatic data») y recomienda seguir con Penman–Monteith. La tarjeta 1 trae los coeficientes de esas estimaciones, precargados con los valores del sitio y de FAO-56.

1 · Cómo se estima lo que falta ?

Latitud 20.600°, altitud 1800 m → P = 81.8 kPa, γ = 0.0544 kPa/°C.

RADIACIÓN SIN MEDIR: kRs Interior, 0.16 Rs = kRs · √(Tmax - Tmin) · Ra (ec. 50) cuando no hay radiación ni insolación.	HUMEDAD SIN MEDIR: TDEW = TMIN - 2 °C (árido o semiárido) ea = e*(Tmin - Δ) (ec. 48) cuando no hay humedad ni punto de rocío.	VIENTO SIN MEDIR (M/S A 2 M) 2 2 m/s es el valor mundial de FAO-56; 1–1.5 en valles abrigados; 3–4 en costas y llanuras ventosas.	ÅNGSTRÖM AS / BS (CON HORAS DE SOL) 0.25 0.5
ALBEDO DE LA REFERENCIA 0.23	A DE PRIESTLEY-TAYLOR 1.26	HARGREAVES: COEFICIENTE Y EXPONENTE 0.0023 0.5 0.0023 y 0.5 son los originales de 1985.	

Valores de FAO-56

Figura 5.1. Los coeficientes con que se estima lo que la estación no mide, y los de los métodos simples. **Valores de FAO-56** los devuelve a los del documento; la línea de arriba recuerda la presión y la constante psicrométrica que salen de la altitud.

Control	Qué estima y cómo
Radiación sin medir: kRs	Rs = kRs · √(Tmax - Tmin) · Ra (ecuación 50). Interior, 0.16 o Costera, 0.19 ; viene del sitio del Bloque 2.
Humedad sin medir: Tdew = Tmin -	El punto de rocío se toma igual a la mínima (ecuación 48) o, en climas áridos, 2 o 3 °C por debajo, como sugiere la nota de FAO-56. De ahí sale la presión de vapor real ea.
Viento sin medir (m/s a 2 m)	El valor que se usa los días sin viento: 2 m/s es la media mundial que propone FAO-56.
Ångström as / bs	Cuando la estación da horas de sol y no radiación: Rs = (as + bs · n/N) · Ra (ecuación 35), con 0.25 y 0.50 por omisión.
Albedo de la referencia	0.23 para el pasto de referencia; no conviene tocarlo.
α de Priestley-Taylor	1.26 por omisión; sube en sitios advectivos.
Hargreaves: coeficiente y exponente	0.0023 y 0.5 en la fórmula original; algunos autores los ajustan por región. La calibración de la tarjeta 4 hace ese ajuste con datos.

! LA FRASE QUE VA AL INFORME

Bajo los recuadros de la tarjeta 2 la app escribe, para el estudio del Bajío: «*Penman-Monteith se calculó en 7,305 días (0 sin temperatura); la radiación se estimó de la amplitud térmica con kRs = 0.16 en 100 % de los días (ec. 50). El informe repetirá esta frase tal cual.*» Cuenta los días en que se estimó cada variable —humedad, radiación, viento— y con qué coeficiente. Es la honestidad mínima de un estudio de ETo: quien lo lea sabe qué se midió y qué se supuso.

5.3 La ETo del sitio, por cinco métodos




Figura 5.2. La ETo del Bajío: 1548 mm al año por Penman–Monteith, 4.24 mm/día en promedio con máximo en abril, el 37 % aerodinámico; y la figura con los cinco métodos mes a mes sobre la banda P20–P80 de Penman–Monteith.

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
ETo anual (Penman–Monteith)	La media de los totales de los años completos (≥ 90 % de días).	1548 mm · 20 años
ETo media diaria	El promedio de todos los días, con su clase, y el mes de máximo.	4.24 mm, <i>alta</i> · abril 5.74
Término aerodinámico	La fracción de la ETo que ponen el viento y el aire seco; el resto es radiación.	37 %
Datos estimados	El porcentaje de días en que se estimó la humedad, la radiación y el viento.	0 % · 100 % · 0 %
Hargreaves contra PM	El factor k = PM/HS, el RMSE diario y el R ² de la calibración de la tarjeta 4.	0.986, <i>acceptable</i> · 0.40 mm/día · 0.87

✓ REGLA DE DECISIÓN · LA ESCALA DE LA ETO DIARIA

Si la ETo diaria media es menor de 2 mm	entonces es baja: clima fresco o húmedo, invierno.
Si está entre 2 y 4	entonces es moderada: templado, primavera y otoño.
Si está entre 4 y 6	entonces es alta: verano templado, trópico húmedo, el Bajío.
Si está entre 6 y 8	entonces es muy alta: cálido y seco.
Si pasa de 8	entonces es extrema: desierto con viento.
Los máximos diarios de abril y mayo (7.2 y 7.4 mm) son los que un sistema de riego debe poder reponer; la tabla mensual los trae.	

La tabla mensual

Mes	PM (mm/d)	PM (mm/mes)	P20	P80	P90 diario	Máx. diario	Hargreaves	Priestley-Taylor	Turc	Thornthwaite	Años
enero	3.41	106	3.36	3.48	3.93	4.80	3.25	2.72	3.07	1.62	20
febrero	4.19	118	4.11	4.31	4.80	5.41	3.93	3.39	3.85	2.05	20
marzo	5.09	158	4.97	5.19	5.70	6.48	4.75	4.19	4.92	2.65	20
abril	5.74	172	5.62	5.86	6.44	7.24	5.44	4.88	5.61	3.37	20
mayo	5.68	176	5.53	5.86	6.45	7.40	5.57	5.21	5.28	3.68	20
junio	4.92	148	4.73	5.08	5.90	6.89	5.27	5.30	4.54	3.54	20
julio	4.51	140	4.29	4.73	5.41	6.30	5.06	5.22	4.39	3.10	20
agosto	4.10	127	4.02	4.19	4.94	5.49	4.59	4.76	4.04	2.34	20
septiembre	3.61	108	3.48	3.78	4.41	4.92	4.08	4.20	3.62	1.81	20
octubre	3.39	105	3.25	3.54	4.02	4.59	3.55	3.42	3.17	1.41	20
noviembre	3.12	94	3.04	3.22	3.58	4.26	3.08	2.71	2.80	1.19	20
diciembre	3.11	96	3.04	3.18	3.54	4.18	2.99	2.46	2.77	1.31	20
Año	4.24	1547	—	—	—	—	4.30	4.04	4.01	2.34	—

Figura 5.3. La tabla mensual, que se descarga con [↓ Mensual \(.csv\)](#). La diaria con todos los términos —Ra, Rs, Rn, es, ea, u₂ y la ETo de cada método— sale con [↓ Diaria con todos los términos \(.csv\)](#).

▶ EJEMPLO · LEER LA TABLA DEL BAJÍO

Abril y mayo son los meses de mayor demanda: 5.74 y 5.68 mm/día por Penman-Monteith (172 y 176 mm al mes), con un P90 diario de 6.4 y máximos de 7.2 y 7.4. Hargreaves los sigue de cerca (5.44 y 5.57) pero se pasa en el verano lluvioso: en julio da 5.06 contra 4.51, porque la amplitud térmica no baja tanto como la radiación cuando hay nubes. Priestley-Taylor subestima la primavera seca y ventosa (4.88 en abril) y Thornthwaite, que solo ve la temperatura, se queda en 2.34 mm/día de promedio anual: sirve para el balance climático, no para regar.

5.4 De dónde sale la ETo




Figura 5.4. A la izquierda, los dos términos de Penman–Monteith mes a mes: la radiación domina todo el año y el término aerodinámico crece en la primavera seca. A la derecha, el presupuesto de radiación: la extraterrestre, la que llega a la superficie, la de cielo despejado y la neta.

La tarjeta 3 abre la caja negra. **Los dos términos** dicen si la ETo del sitio la manda el sol o el aire: en el Bajío el 37 % es aerodinámico, un clima *equilibrado* según la escala de la ficha; en la Costa cálida seca pasa del 45 % (*advectivo*) y ahí Priestley–Taylor y Turc, que no ven el viento, subestiman. **El balance de radiación** muestra R_a , R_s , R_{so} y R_n a lo largo del año: cuando R_s está estimada de la amplitud térmica se ve suavizada respecto a una medida, y ese es el precio de no medir radiación.




Figura 5.5. Los veinte años de ETo diaria por Penman–Monteith y por Hargreaves. La estacionalidad se repite; las diferencias entre métodos se concentran en el verano lluvioso.

5.5 Hargreaves calibrado contra Penman–Monteith

La tarjeta 4 compara, día por día, cada método simple contra Penman–Monteith y ofrece dos correcciones: un **factor k** = PM/método que corrige el promedio con un solo número, y una **regresión** $ETo(PM) = a + b \cdot ETo(\text{método})$ que corrige también la pendiente. Para cada una da el RMSE que queda después de aplicarla.

Método ?	Factor k = PM/método ?	Sesgo (mm/d) ?	Sesgo (%) ?	RMSE (mm/d) ?	R ²	Ordenada a	Pendiente b	RMSE con k ?	RMSE con regresión ?
Hargreaves–Samani	0.986	0.06	1.4%	0.40 muy bueno	0.866	0.136	0.955	0.39	0.39
Priestley–Taylor	1.049	–0.20	–4.7%	0.72 aceptable	0.637	1.094	0.778	0.71	0.64
Turc	1.058	–0.23	–5.5%	0.38 muy bueno	0.922	0.351	0.971	0.31	0.30

FACTOR POR MES	
Mes	k mensual (PM/HS)
ene	1.05 aceptable
feb	1.07 aceptable
mar	1.07 aceptable
abr	1.06 aceptable
may	1.02 aceptable
jun	0.93 aceptable
jul	0.89 calibrar
ago	0.89 calibrar
sep	0.88 calibrar
oct	0.95 aceptable
nov	1.01 aceptable
dic	1.04 aceptable

Figura 5.6. La calibración en el Bajío y la nube de puntos de Hargreaves contra Penman–Monteith, con la recta 1:1, la del factor k y la de la regresión.

Método	k	Sesgo	RMSE	R ²	a	b	RMSE con k	con regresión
Hargreaves–Samani	0.986	0.06 (1.4 %)	0.40 <i>muy bueno</i>	0.866	0.136	0.955	0.39	0.39
Priestley–Taylor	1.049	–0.20 (–4.7 %)	0.72 <i>aceptable</i>	0.637	1.094	0.778	0.71	0.64
Turc	1.058	–0.23 (–5.5 %)	0.38 <i>muy bueno</i>	0.922	0.351	0.971	0.31	0.30

El cuadro de **k mensual** enseña la estacionalidad del sesgo: Hargreaves va por debajo de Penman–Monteith de noviembre a mayo (k de 1.02 a 1.07) y por encima en la temporada de lluvias (0.88 a 0.93 de julio a septiembre, marcados *calibrar*). Un solo factor anual lo esconde; por eso la app da los doce.

! UNA CALIBRACIÓN ENTRE DOS ESTIMACIONES

La app lo advierte en ámbar: «Atención: Penman–Monteith lleva variables estimadas (radiación), así que la calibración compara dos estimaciones; vale como orden de magnitud y para ver la estacionalidad del sesgo, no como calibración definitiva.» Cuando la radiación de Penman–Monteith se estimó de la amplitud térmica, las dos ETo comparten el mismo ingrediente, y el acuerdo es en parte circular. La calibración real exige una estación con radiación y humedad medidas; con ella, la misma tarjeta dice «esta calibración es la real del sitio».

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ TAN BUENO ES EL MÉTODO SIMPLE	
Si el RMSE diario es menor de 0.5 mm/día	entonces es muy bueno: sirve día a día.
Si está entre 0.5 y 1.0	entonces es aceptable: útil a escala semanal.
Si está entre 1.0 y 1.5	entonces es pobre: solo para totales mensuales.
Si pasa de 1.5	entonces es malo: no lo uses sin corregir.
Si el factor k se aparta más de 10 % de 1	entonces calibra; si más de 20 %, no uses el método sin corregir.
Las fichas <i>Calibración local</i> y <i>Penman–Monteith contra Hargreaves</i> traen estas escalas (Hargreaves y Allen 2003; FAO-56, anexo 6).	

5.6 Qué ETo usarán los bloques siguientes

5 · Qué ETo usarán los bloques siguientes

ETo diaria para el balance y el riego Penman–Monteith FAO-56

Los Bloques 6 y 7 usarán **Penman–Monteith FAO-56**: 4.24 mm/día en promedio, 1548 mm al año.

Penman–Monteith es el estándar aunque lleve variables estimadas: FAO-56 lo recomienda por encima de cambiar de método. Las alternativas están para comparar y para el caso en que la estación destino solo tenga temperatura.

Continuar al Bloque 6: balance hídrico →

Figura 5.7. La decisión: Penman–Monteith FAO-56, Hargreaves–Samani, Hargreaves × factor k, Hargreaves corregido por regresión, Priestley–Taylor o Turc. Los Bloques 6 y 7 leen la serie diaria del método elegido.

Con el Bajío la app dice: «Los Bloques 6 y 7 usarán *Penman–Monteith FAO-56*: 4.24 mm/día en promedio, 1548 mm al año.» Penman–Monteith es el estándar aunque lleve variables estimadas: FAO-56 lo recomienda por encima de cambiar de método. Las alternativas están para dos casos: comparar, y el estudio cuyo sitio destino solo tendrá temperatura, donde conviene calibrar Hargreaves aquí y llevarse el factor.

5.7 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>Penman–Monteith se calculó en N días...; la humedad / la radiación / el viento se estimó en X % de los días</i>	La frase de los datos estimados. No es un problema: es lo que el informe dirá. Si un porcentaje te sorprende, revisa los papeles de las columnas en el Bloque 2.
<i>Atención: Penman–Monteith lleva variables estimadas, así que la calibración compara dos estimaciones</i>	La calibración de Hargreaves es orientativa; no la reportes como calibración local definitiva.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>Penman—Monteith se calculó con todas las variables medidas, así que esta calibración es la real del sitio</i>	Lo contrario: la estación mide todo y el factor k y la regresión valen para la región.
<i>Los Bloques 6 y 7 usarán...</i>	Confirma el método elegido; al cambiarlo, el balance y el riego se rehacen al abrirlos.
<i>Primero hace falta una serie</i>	Vuelve al Bloque 2.

6

BLOQUE 6 · BALANCE HÍDRICO

Balance hídrico del cultivo

Cuánta agua pide el cultivo, cuánta le da la lluvia y cuánta queda en el suelo, día por día y año por año. El balance diario de la zona radical de FAO-56 con la curva de Kc del cultivo, la lluvia efectiva, el escurrimiento, la percolación y el coeficiente de estrés; el rendimiento relativo que el agua permite según FAO-33; el balance por etapa y por fecha de siembra; y la necesidad climática de riego de cada mes.

[6.1 El suelo como cubeta](#)

[6.3 El balance en temporal, año por año](#)

[6.5 El agua según la fecha de siembra](#)

[6.7 Los avisos de este bloque](#)

[6.2 Cultivo, suelo y siembra](#)

[6.4 Por etapa del cultivo](#)

[6.6 Necesidad climática de riego, por mes](#)

B6

6.1 El suelo como cubeta

Entre la **capacidad de campo** (lo que el suelo retiene después de drenar) y el **punto de marchitez permanente** (lo que la planta ya no puede extraer) hay una lámina de agua por cada metro de suelo: el **agua disponible total** (ADT; TAW en inglés). Multiplicada por la profundidad de raíces del día es la cubeta del cultivo. La planta toma sin esfuerzo solo una fracción **p** de ella, el **agua fácilmente aprovechable** (AFA; RAW); pasado ese punto cierra estomas y transpira menos de lo que la atmósfera pide.

$$Dr(hoy) = Dr(ayer) - (P - R0) - I + ETc \cdot Ks + DP \cdot Ks = (ADT - Dr) / ((1 - p) ADT) \text{ cuando } Dr > AFA, \text{ si no } Ks = 1 \text{ (FAO-56, ec. 84-85)}$$

El balance lleva la cuenta del **agotamiento** Dr , lo que le falta a la cubeta para estar llena: la lluvia que entra (menos el escurrimiento) y el riego lo reducen; la ETc real, que es $ETc \times Ks$, lo aumenta; lo que sobra cuando la cubeta ya está llena se va por **percolación profunda**. La ETc es $Kc \times ETo$, con el **Kc** del cultivo en cuatro tramos —inicial, desarrollo, media estación y final— corregido al viento y la humedad de cada temporada (ecuación 62). Y el rendimiento que el agua permite se estima con la función estacional de FAO-33:

$$1 - Ya/Ym = Ky \cdot (1 - ETa/ETm) \text{ (Doorenbos y Kassam 1979)}$$

TEORÍA EN BREVE · LLUVIA EFECTIVA Y ESCURRIMIENTO

No toda la lluvia entra al suelo. La app quita primero el **escurrimiento** con el método del número de curva del NRCS (más escurrimiento en arcillas, suelos compactados o desnudos; menos en arenas con cobertura) y después deja que la cubeta decida: lo que cabe se queda, lo que no, se percola. Esa es la **lluvia efectiva** del balance diario, y difiere de las fórmulas mensuales del USDA-SCS o de la FAO que usa la tarjeta 5 para la necesidad climática regional.

6.2 Cultivo, suelo y siembra

1 · Cultivo, suelo y siembra

Elegir el cultivo carga las longitudes de etapa, los Kc, la raíz, la fracción de agotamiento y el factor de respuesta Ky de las tablas de FAO-56 y FAO-33; elegir el suelo carga el agua disponible por metro y el número de curva. Todo es editable.

CULTIVO

Maíz (grano)

FECHA DE SIEMBRA

15 mayo

ETAPAS: INI / DES / MED / FIN (DÍAS)

25 40 45 30

KC INI / MID / END (TABLA)

0.3 1.2 0.6

RAÍZ INICIAL / MÁXIMA (M)

0.15 1.2

FRACCIÓN P (TABLA 22)

0.55

KY (FAO-33, ESTACIONAL)

1.25

SUELO

Franco

AGUA DISPONIBLE (MM/M)

140

☒ Escurrimiento por número de curva

78

AGOTAMIENTO INICIAL (% DEL ADT)

50

☒ Corregir Kc mid y end al viento y la humedad de la temporada (ec. 62)

50 % si se siembra al inicio de las lluvias; 0 tras un riego de presiembra.

Recalcular

Figura 6.1. El maíz del Bajío sembrado el 15 de mayo, con el arranque de las lluvias, en suelo franco. Elegir el cultivo carga las tablas de FAO-56 y FAO-33; elegir el suelo, el agua disponible y el número de curva. Todo es editable.

Control	Qué es	Maíz · franco
Cultivo y Fecha de siembra	Uno de los 19 del catálogo y el día en que arranca el balance en cada año.	Maíz (grano) · 15 may
Etapas: ini / des / med / fin (días)	Las longitudes de los cuatro tramos del Kc (FAO-56, tabla 11). Su suma es el ciclo del balance.	25 / 40 / 45 / 30 = 140 días
Kc ini / mid / end (tabla)	Los de la tabla 12 de FAO-56 para el clima de referencia.	0.30 / 1.20 / 0.60
Corregir Kc mid y end al clima	Aplica la ecuación 62 con el viento y la humedad mínima de cada temporada: en aire seco y con viento el Kc sube.	activado
Raíz inicial / máxima (m)	La profundidad de la cubeta crece linealmente de la inicial a la máxima hasta el fin del desarrollo.	0.15 / 1.2
Fracción p (Tabla 22)	La parte del ADT que se agota sin estrés, para una ETc de 5 mm/día; la app la ajusta cada día a la ETc real (nota de la tabla 22).	0.55
Ky (FAO-33, estacional)	El factor de respuesta del rendimiento al déficit de agua de toda la temporada.	1.25
Suelo y Agua disponible (mm/m)	Una de las siete texturas, o — Propio — para escribir el ADT medido.	Franco · 140 mm/m
Escurrimiento y número de curva	Activa el escurrimiento por número de curva (NRCS); el suelo trae el suyo.	CN 78
Agotamiento inicial (% del ADT)	Cuánto le falta a la cubeta el día de la siembra. 50 % es un suelo a medio llenar tras la seca; 0 es capacidad de campo.	50 %

✓ REGLA DE DECISIÓN · EL AGUA DISPONIBLE DEL SUELO

Si el ADT es menor de 90 mm/m	entonces es bajo (arenosos): la cubeta se vacía en pocos días y el riego debe ser frecuente y ligero.
Si está entre 90 y 140	entonces es medio (francos ligeros).
Si pasa de 140	entonces es alto (francos y arcillas): más margen entre lluvias y riegos más espaciados.
Si tienes el ADT medido en la parcela	entonces úsalo con — Propio — : las texturas del catálogo son promedios (FAO-56, tabla 19).

El número de curva también tiene su escala en la ficha *Escurrimiento*: menos de 60 escurre poco; más de 85, casi todo.

6.3 El balance en temporal, año por año

La tarjeta 2 corre el balance sin riego en cada uno de los veinte años y resume con medianas y percentiles. El párrafo de abajo lo lee y la figura muestra el año elegido en el selector (por omisión, el año mediano por rendimiento):

▶ EJEMPLO · EL VEREDICTO DEL TEMPORAL EN EL BAJÍO

«En temporal, Maíz (grano) sembrado el 15 de mayo en un suelo de 140 mm/m obtiene en el año mediano el 87 % de su rendimiento potencial (FAO-33, $K_y = 1.25$); en uno de cada cinco años, menos del 68 %, y en 0 % de los años cae por debajo del 50 %. La etapa que más sufre es la media estación (K_s mediano 0.88). El Bloque 7 calcula cuántos riegos cerrarían ese déficit.»

Recuadro	Qué dice	En el Bajío (medianas)
ETc de la temporada	La demanda del cultivo sin estrés en los 140 días.	497 mm
Lluvia efectiva	La que entró al suelo, de la que cayó; con su P20.	433 de 440 mm · P20 385
Déficit (no transpirado)	ETc menos ETc real: el agua que la planta pidió y no tuvo; con el P80 y los días con estrés.	52 mm · P80 129 · 54 días
Rendimiento relativo	Ya/Ym por FAO-33, con su clase, el P20, el K_y y la fracción de años ≥ 90 %.	87 %, <i>pérdida moderada</i> · P20 68 % · 30 % de los años ≥ 90 %
Percolación	El agua que pasó bajo las raíces, con el P80 y el escurrimiento.	24 mm · P80 59 · escurrimiento 4

La línea bajo el selector describe el año visto: «2019, siembra el 15 may: ETc 487 mm, real 438 mm; lluvia 446 mm de la que 442 mm entró al suelo y 0 mm percoló; 59 días con estrés (K_s medio 0.88); rendimiento relativo 88 % · K_c mid corregido a 1.17 (u_2 2.1 m/s, HR_{min} 54 %)». El K_c medio de la tabla era 1.20 y bajó a 1.17 porque la humedad mínima de la temporada es más alta que el 45 % de referencia. [↓ Balance diario del año visto \(.csv\)](#) descarga ese año día por día.






Figura 6.3. Los veinte años: a la izquierda, la ETC, el déficit y la lluvia efectiva de cada temporada; a la derecha, el rendimiento relativo de cada año con las bandas de la escala de FAO-33.

6.4 Por etapa del cultivo

3 · Por etapa del cultivo

Medianas entre años. La etapa media (floración y llenado) es la que decide el rendimiento: un Ks de 0.8 ahí cuesta más que un Ks de 0.6 al final.



Etapa	ETC (mm) ?	ETC real ?	Lluvia efectiva ?	Déficit ?	Ks mediano ?	ETC real/ETC ?	Días con estrés ?
Inicial	41	36	47	5	0.88 estrés leve	88%	9
Desarrollo	140	137	152	0	1.00 sin estrés	100%	0
Media estación	220	191	158	27	0.88 estrés leve	88%	23
Final	94	79	79	11	0.90 estrés leve	87%	17

Figura 6.4. El balance por etapa del maíz del Bajío, medianas entre años. La media estación —floración y llenado— es la que decide el rendimiento.

Etapa	ETc	ETc real	Lluvia efectiva	Déficit	Ks mediano	ETc real/ETc	Días con estrés
Inicial (25 d)	41	36	47	5	0.88 leve	88 %	9
Desarrollo (40 d)	140	137	152	0	1.00	100 %	0
Media estación (45 d)	220	191	158	27	0.88 leve	88 %	23
Final (30 d)	94	79	79	11	0.90 leve	87 %	17

La lectura agronómica está en la tercera fila: en la media estación el maíz pide 220 mm y la lluvia efectiva da 158, así que el suelo pone la diferencia hasta que se agota y aparecen 23 días con estrés. Como dice la app, «un Ks de 0.8 ahí cuesta más que un Ks de 0.6 al final». Es la etapa donde un riego de auxilio rinde más, y el Bloque 7 lo comprueba.

6.5 El agua según la fecha de siembra




Figura 6.5. El rendimiento relativo en temporal según la fecha de siembra, cada diez días, en todos los años del registro: la mediana y el P20. Es el mapa de fechas del Bloque 4, pero mirado desde el agua.

EJEMPLO · LA MEJOR FECHA PARA EL AGUA

«En temporal, la fecha con mejor rendimiento garantizado (P20 más alto) es el 31 may: 93 % en el año mediano y 83 % en cuatro de cada cinco años. Este mapa solo mira el agua; el Bloque 9 lo cruza con el calor y las heladas.»

El cuadro plegado muestra la forma completa de la curva: sembrar en marzo, que térmicamente era lo mejor, da 15–30 % de rendimiento en temporal porque el ciclo cae en la seca; el 1 de mayo ya da 75 % (P20 58 %); del 21 de mayo al 10 de junio está el máximo, 89–93 % con P20 de 78–83 %; y desde julio baja de nuevo porque el llenado de grano cae en octubre, cuando las lluvias terminan. El Bloque 4 decía «marzo», el Bloque 6 dice «fin de mayo»: el Bloque 9 es el que decide.

6.6 Necesidad climática de riego, por mes




Figura 6.6. La necesidad climática de riego del Bajío, mes a mes: la ETo del pasto de referencia menos la lluvia efectiva del USDA-SCS, en la mediana y en el año seco (P80).

La última tarjeta no depende del cultivo: es la ETo del mes menos la lluvia efectiva calculada con la fórmula mensual del USDA-SCS (y, para comparar, la de la FAO). Es el número que un plan de riego regional o el dimensionamiento de una bomba necesita antes de conocer el cultivo. En el Bajío la necesidad anual es de 1089 mm en la mediana: de 137 a 160 mm al mes de febrero a mayo, cuando no llueve y la ETo es máxima, y de 40 a 62 mm en pleno verano. Ni en julio, el mes más lluvioso, la lluvia efectiva (89 mm) alcanza a la ETo (140): el Bajío es de riego complementario todo el año.

6.7 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>Hacen falta la serie y la ETo</i>	El bloque necesita el Bloque 2 y el Bloque 5; los botones llevan a cada uno. El Bloque 5 se calcula solo al abrirlo.
<i>En temporal, ... obtiene en el año mediano el X % de su rendimiento potencial...</i>	El veredicto del temporal. Si el P20 es bajo, el riego de auxilio del Bloque 7 es el siguiente paso.
<i>... Kc mid corregido a X (u_2, HRmin)</i>	La corrección al clima de la ecuación 62 estuvo activa; el valor de la tabla se ajustó al viento y la humedad de esa temporada.
<i>Rellenos en el cuadro por año</i>	Días de la temporada sin ETo o sin lluvia que el balance rellenó con la mediana del día del año; si son muchos, revisa la serie.

7

BLOQUE 7 · RIEGO

Calendarización del riego

Cuándo y cuánto regar. Sobre el mismo balance del Bloque 6, este bloque aplica la regla de riego que elijas —al agotar el agua fácilmente aprovechable, con déficit controlado, a intervalo fijo o con lámina fija— en cada año del registro, y entrega el calendario del año, las láminas netas y brutas según la eficiencia del sistema, la comparación de cuatro estrategias, el riego por mes, la capacidad de diseño que el sistema necesita y el ahorro frente a regar por costumbre.

7.1 Cuándo y cuánto

7.3 El calendario, año por año

7.5 Por mes, diseño y ahorro

7.2 Sistema y regla de riego

7.4 Cuatro estrategias, lado a lado

7.6 Los avisos de este bloque

7.1 Cuándo y cuánto

Un calendario de riego contesta dos preguntas con el balance de la cubeta: **cuándo** —el día en que el agotamiento llega al límite que la regla fija— y **cuánto** —la lámina que devuelve el suelo a capacidad de campo, o una lámina fija—. La lámina **net**a es la que llega a la zona radical; la **bruta**, la que el sistema tiene que aplicar para que llegue esa, y depende de su eficiencia: 60 % en gravedad, 75 % en aspersión, 90 % en goteo.

$$\text{bruta} = \text{neta} / \text{eficiencia} \cdot 1 \text{ mm sobre } 1 \text{ ha} = 10 \text{ m}^3$$

TEORÍA EN BREVE · LAS CUATRO REGLAS

Al agotar el AFA (FAO-56, capítulo 8): se riega el día en que el agotamiento alcanza el agua fácilmente aprovechable, justo antes de que empiece el estrés, y se rellena a capacidad de campo. Es la regla de referencia: máximo rendimiento con el mínimo de agua que lo consigue. **Déficit controlado**: se deja pasar el AFA hasta un múltiplo (130 % por omisión) antes de regar; se acepta algo de estrés a cambio de menos riegos y menos percolación. **Intervalo fijo**: se riega cada N días, rellenando; es la regla de un módulo de riego con turnos. **Lámina fija**: se aplica siempre la misma lámina cuando el agotamiento la iguala; es la regla de un sistema que solo sabe dar una dosis. Todas se pueden restringir con días sin riego tras la siembra y antes de la cosecha y con el intervalo mínimo que el sistema permite.

7.2 Sistema y regla de riego

1 · Sistema y regla de riego

Cultivo **Maíz (grano)**, siembra el 15 de mayo, 140 días de ciclo, suelo de 140 mm/m con raíz hasta 1.2 m (ADT máxima 168 mm, AFA 92 mm con $p = 0.55$), ETo por Penman-Monteith. Todo eso se cambia en los Bloques 5 y 6.

SISTEMA

Aspersión · 75 %

EFICIENCIA DE APLICACIÓN

0.75

REGLA

Al agotar el AFA (FAO-56)

LÁMINA DE CADA RIEGO

Rellenar a capacidad de campo

DÍAS SIN RIEGO ANTES DE LA COSECHA

10

DÍAS SIN RIEGO TRAS LA SIEMBRA

0

INTERVALO MÍNIMO DEL SISTEMA (DÍAS)

1

CAPACIDAD DEL SISTEMA (MM/DÍA), OPCIONAL

8

Riego de presiembra (el suelo empieza lleno)

Recalcular

Figura 7.1. La regla del ejemplo: aspersión al 75 %, riego al agotar el AFA rellenando a capacidad de campo, diez días sin riego antes de la cosecha. La línea de arriba recuerda lo que se hereda del Bloque 6: maíz del 15 de mayo, 140 días, suelo de 140 mm/m con raíz a 1.2 m, ADT máxima de 168 mm y AFA de 92 mm.

Control	Qué hace
Sistema y Eficiencia de aplicación	Gravedad (60 %), aspersión (75 %), pivote central y microaspersión (85 %), goteo (90 %) o — Otra eficiencia — para escribirla. Solo afecta la lámina bruta.
Regla	Al agotar el AFA (FAO-56) , Déficit controlado (más allá del AFA) con su múltiplo, Intervalo fijo con sus días, o Lámina fija .
Lámina de cada riego	Rellenar a capacidad de campo o Lámina neta fija en mm.

Control	Qué hace
Días sin riego antes de la cosecha / tras la siembra	Para secar el grano al final, o porque la siembra se hizo en húmedo. 10 y 0 por omisión.
Intervalo mínimo del sistema (días)	El turno más corto que el sistema permite; un riego que la regla pida antes se pospone.
Capacidad del sistema (mm/día), opcional	Si se escribe, el calendario dice cuántas horas dura cada riego y si la capacidad alcanza para el pico.
Suelo a capacidad de campo al sembrar	Anula el agotamiento inicial del Bloque 6: un riego de presiembra.



REGLA DE DECISIÓN · LA EFICIENCIA QUE SE DECLARA

Si la eficiencia es menor de 60 %	entonces es gravedad mal nivelada: antes que calendarizar, nivelar.
Si está entre 60 y 75 %	entonces es gravedad bien manejada o aspersión con viento.
Si está entre 75 y 88 %	entonces aspersión, pivote o microaspersión.
Si pasa de 88 %	entonces goteo bien mantenido.

Escala de la ficha *Eficiencia de aplicación* (Brouwer et al. 1989). La eficiencia no cambia el rendimiento del balance: cambia cuánta agua hay que bombear.

7.3 El calendario, año por año

Recuadro	Qué dice	En el Bajío
Riegos por temporada	La mediana entre años y el rango.	1 · de 0 a 3
Lámina neta	La suma de las láminas netas de la temporada; con el P80, el año seco.	95 mm · P80 172
Lámina bruta	La neta entre la eficiencia, con el P80 en mm y en m ³ /ha.	127 mm · P80 229 = 2,292 m ³ /ha
Rendimiento relativo	El que deja la regla, con su clase, el P20 y los días con estrés.	100 % · P20 100 % · 0 días
Percolación	Lluvia sobre suelo lleno y riego de más.	73 mm
Capacidad de diseño	La ETc máxima de la media estación (P90 de los días entre años) entre la eficiencia.	7.9 mm/día = 79 m ³ /ha/día



Figura 7.2. El calendario del maíz del Bajío regado al agotar el AFA. Arriba, las medianas de veinte años y la capacidad de diseño; abajo, el año mediano (2015): la línea del agotamiento baja hacia la punteada del AFA, el riego bruto la devuelve a cero y la lluvia hace el resto.

► EJEMPLO · EL VEREDICTO DEL RIEGO EN EL BAJÍO

«Con Maíz (grano) sembrado el 15 de mayo y regando al agotar el agua fácilmente aprovechable, hacen falta 1 riegos y 127 mm brutos en el año mediano (229 mm en el seco), que dejan el rendimiento en 100 %. Se pierden 73 mm por percolación: parte es lluvia que cayó sobre un suelo recién regado, inevitable sin pronóstico.»

En el Bajío el maíz de temporal se queda en 87 %; un solo riego de auxilio de 114 mm brutos —en 2015, el 18 de julio, a los 65 días, en pleno desarrollo, con la cubeta a 86 mm de agotamiento y un AFA de 85— lo lleva al 100 %. En el año seco hacen falta dos riegos y 229 mm brutos. Es el argumento cuantitativo del riego complementario: poca agua en el momento exacto.

! LAS FECHAS SON LAS DE ESE AÑO

La app lo advierte bajo la tabla: «Las fechas son las de ese año; en la práctica el calendario se sigue con el balance al día, no con las fechas fijas.» El calendario histórico dice cuántos riegos y de cuánto esperar, y en qué etapa suelen caer; el día concreto del riego del año que viene lo decide el balance corrido con la lluvia y la ETo de ese año, que es exactamente lo que este bloque hace con cada año del registro.




Figura 7.3. El agua en la zona radical del año visto y su tabla de riegos: cada riego con su fecha, su día del ciclo, la etapa, el agotamiento al que se llegó, el AFA de ese día y las láminas neta y bruta en mm y en m³/ha. Se descarga con [Calendario del año \(.csv\)](#) ; todos los años, con [Todos los años \(.csv\)](#) .




Figura 7.4. Los veinte años: la lámina bruta que pidió cada uno y el rendimiento que dejó. Los años que en temporal perdían 30 o 40 % (2008, 2009, 2010) son los que piden dos o tres riegos.

7.4

Cuatro estrategias, lado a lado

La tarjeta 3 corre las mismas veinte temporadas con cada regla —y con el temporal como referencia— usando los valores de déficit, intervalo y lámina escritos arriba:



Figura 7.5. Las estrategias en el Bajío: riegos, láminas neta y bruta, la bruta del año seco, el rendimiento relativo con su P20, la percolación y el déficit. A la derecha, el agua aplicada contra el rendimiento: la esquina superior izquierda es donde se quiere estar.

Estrategia	Riegos	Neta	Bruta	Bruta año seco	Rend. relativo	P20	Percolación	Déficit
Temporal (sin riego)	0	0	0	0	87 %	77 %	46	52
Al agotar el AFA, rellenando	1	95	127	229	100 %	100 %	73	0
Déficit controlado (130 % del AFA)	1	117	156	161	97 %	96 %	51	11
Cada 7 días, rellenando	18	230	307	358	100 %	100 %	168	0
Lámina fija de 30 mm	6	180	240	320	100 %	100 %	122	0

La app lo lee: «Regar al agotar el AFA sube el rendimiento relativo de 87 % (temporal) a 100 % con 127 mm brutos: cada 100 mm brutos compran 10 % de rendimiento.» Y sobre el déficit controlado, que aquí no ahorra: al esperar hasta el 130 % del AFA riega más tarde y rellena una cubeta más vacía, así que aplica 29 mm más que la regla de referencia y pierde 3 % de rendimiento. El intervalo fijo de siete días riega dieciocho veces y percola 168 mm; la lámina fija de 30 mm, seis veces con 122 mm percolados. Lo que apliquen de más percola, lo que apliquen de menos se paga en estrés.



REGLA DE DECISIÓN · QUÉ ESTRATEGIA RECOMENDAR


Si el sistema puede regar cualquier día	entonces al agotar el AFA: es la que menos agua usa para el máximo rendimiento.
Si el agua es el recurso escaso y el cultivo lo tolera	entonces déficit controlado, solo si la tabla muestra que de verdad ahorra (con lluvias de verano, a veces no).
Si el riego es por turnos de un módulo	entonces intervalo fijo con el turno real, y acepta la percolación que la tabla muestra.
Si el sistema solo da una dosis	entonces lámina fija, con la lámina ajustada al AFA de la media estación.
Compara siempre la columna del año seco: es la que dimensiona la fuente de agua.	

7.5 Por mes, diseño y ahorro

4 · Por mes, diseño y ahorro ?

RIEGO BRUTO POR MES

■ año mediano ■ año seco (P80)



Mes	Bruta, año mediano (mm) ?	Año seco (P80)	Máximo	Años con riego
mayo	0	10	53	20%
junio	0	0	101	15%
julio	0	112	127	35%
agosto	118	126	130	60%
septiembre	0	25	140	20%

PARA DIMENSIONAR EL SISTEMA

- ETC máxima de la media estación: 5.95 mm/día (P90 de los días entre años; máximo absoluto 6.79). El sistema debe poder aplicar **7.9 mm/día brutos** = 79 m³/ha/día con 75% de eficiencia.
- Lámina bruta de la temporada para planear: 229 mm (P80, cuatro de cada cinco años bastan) = **2,292 m³/ha**; el año mediano pide 127 mm y el peor del registro 368 mm.
- Riego más grande del registro: 105 mm netos en una sola aplicación; 2 riegos en el año seco.

FRENTE A REGAR POR COSTUMBRE

La costumbre: cada días, mm brutos

Regando por costumbre cada 10 días con 40 mm brutos se aplican 520 mm en 13 riegos, para un rendimiento relativo de 100% y 335 mm percolados. El calendario por balance aplica 127 mm en 1 riegos, con rendimiento de 100%: **ahorra 393 mm (76%)** sin perder rendimiento.

[Continuar al Bloque 8: fenología →](#)

Figura 7.6. El riego por mes (mediana, año seco, máximo y años con riego), la capacidad y la lámina de diseño, y el ahorro frente a la costumbre de regar cada diez días con 40 mm.

Por mes

El riego del Bajío se concentra en agosto: 118 mm brutos en el año mediano, 126 en el seco, y riego en el 60 % de los años. Julio pide riego en el 35 % de los años (112 mm en el seco); mayo, junio y septiembre, en menos de uno de cada cinco. Es la canícula: la pausa de las lluvias de agosto coincide con la media estación del maíz.

Diseño

▶ EJEMPLO · LOS TRES NÚMEROS DEL DISEÑO

«ETc máxima de la media estación: 5.95 mm/día (P90 de los días entre años; máximo absoluto 6.79). El sistema debe poder aplicar 7.9 mm/día brutos = 79 m³/ha/día con 75 % de eficiencia. Lámina bruta de la temporada para planear: 229 mm (P80, cuatro de cada cinco años bastan) = 2,292 m³/ha; el año mediano pide 127 mm y el peor del registro 368 mm. Riego más grande del registro: 105 mm netos en una sola aplicación; 2 riegos en el año seco.»

La **capacidad** dimensiona la bomba y la red: debe reponer el día más exigente de la media estación, no el promedio. La **lámina de planeación** dimensiona la fuente —el pozo, la presa, la concesión— para que cuatro de cada cinco años alcance. Y el **riego más grande** dice si el sistema puede aplicar esa lámina de una vez o si hay que partirla.

Ahorro

La última tarjeta compara con la costumbre —cada 10 días con 40 mm brutos, editables— y en el Bajío dice: «Regando por costumbre cada 10 días con 40 mm brutos se aplican 520 mm en 13 riegos, para un rendimiento relativo de 100 % y 335 mm percolados. El calendario por balance aplica 127 mm en 1 riegos, con rendimiento de 100 %: ahorra 393 mm (76 %) sin perder rendimiento.» Es el número que convence a un productor: el mismo rendimiento con la cuarta parte del agua y de las horas de bombeo.

7.6 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>Hace falta el balance del Bloque 6</i>	El riego se calcula sobre el balance; abre el Bloque 6 (que se calcula solo) y vuelve.
<i>Cultivo ..., siembra el ..., suelo de ... mm/m con raíz hasta ... m (ADT máxima, AFA con p). Todo eso se cambia en los Bloques 5 y 6</i>	La línea que recuerda lo heredado. Si el AFA te parece pequeño o grande, el suelo y la p se editan en el Bloque 6.
<i>El déficit controlado no ahorra aquí: aplica X más...</i>	Con lluvias de verano, esperar más para regar puede obligar a rellenar una cubeta más vacía. La regla de referencia es la que conviene.
<i>Las fechas son las de ese año; en la práctica el calendario se sigue con el balance al día</i>	No entregues el calendario de un año como calendario fijo: entrega la regla, las láminas y las etapas en que caen.
<i>... la capacidad escrita no alcanza para el pico</i>	Con una capacidad del sistema menor que la de diseño, el riego del pico tarda más de 24 horas: hay que partir la parcela en secciones o aumentar el gasto.

8

BLOQUE 8 · FENOLOGÍA

Predicción de etapas fenológicas

Cuándo emerge, cuándo florece, cuándo madura. Las etapas del cultivo en la escala BBCH fechadas por su tiempo térmico en cada año del registro, con su fecha mediana y su dispersión; la calibración de los requerimientos con tus propias fechas observadas y la búsqueda de la temperatura base que menos varía; el frío del invierno para los frutales caducifolios en horas frío, unidades Utah y porciones de frío; y el fotoperiodo del sitio.

8.1 Fechar la fenología

8.3 El calendario fenológico del sitio

8.5 El frío invernal

8.7 Los avisos de este bloque

8.2 Cultivo, requerimientos y siembra

8.4 Calibrar con fechas observadas

8.6 El fotoperiodo

8.1 Fechar la fenología

Un modelo fenológico de tiempo térmico tiene dos partes: la **escala** que nombra las etapas y el **requerimiento** de cada una en grados-día. La escala es la BBCH (Meier 2018): un código de dos cifras, igual para todos los cultivos, donde 09 es la emergencia, 65 la plena floración y 89 la madurez fisiológica; los cereales conservan además su código propio (V6, VT/R1, R6 en el maíz). El requerimiento es el que el Bloque 4 acumula: la etapa cae el día en que la suma desde la siembra cruza su valor.

El catálogo trae, para cada cultivo anual, cinco o seis etapas con requerimientos tomados de la literatura de extensión, y los llama **orientativos** en cada pantalla. Un requerimiento publicado en Iowa para un híbrido de 110 días no es el de un criollo del Bajío. Por eso la tarjeta de calibración es el corazón del bloque: con dos o tres años de fechas observadas en la parcela, la app calcula los requerimientos de *tu* cultivar en *tu* sitio, dice qué tan estables son y busca la base que los hace más estables.

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ EL TIEMPO TÉRMICO Y NO EL CALENDARIO

Si la fenología dependiera del calendario, la floración caería siempre a los mismos días de la siembra. No lo hace: en el Bajío, el maíz sembrado el 15 de mayo floreció entre el 12 y el 26 de julio según el año. Si depende del calor, los °C·d hasta la floración deben variar menos entre años que los días. Ese es el criterio de Arnold (1959) para elegir la base: la temperatura base correcta es la que hace mínimo el coeficiente de variación del tiempo térmico entre años. La app lo aplica en la tarjeta 3 y compara el CV en °C·d con el CV en días.

8.2 Cultivo, requerimientos y siembra

BBCH	Etapas	°C·d
09	Emergencia	65
16	Seis hojas (V6)	300
65	Floración (VT/R1)	780
75	Grano lechoso (R3)	950
89	Madurez fisiológica (R6)	1,450

La tabla se edita: cada celda acepta un valor nuevo, la × quita una etapa, [Añadir etapa](#) agrega un renglón y [Valores del catálogo](#) restaura los originales. El método, la base y el umbral son los mismos del Bloque 4 y conviene que coincidan con la fuente del requerimiento. Los frutales caducifolios traen su escala propia (61 floración, 89 madurez) y la fecha es la del inicio de la brotación.

1 · Cultivo, requerimientos y siembra ?

Las etapas y sus °C·d vienen del catálogo y son orientativos: edítalos, añade o quita etapas, o calíbralos abajo con fechas observadas. El código es el de la escala BBCH (o el de la escala propia del cultivo).

CULTIVO

Maíz (grano)

MÉTODO

Promedio acotado (maíz)

CORTE SUPERIOR

Horizontal

BASE (°C)

10

UMBRAL SUPERIOR (°C)

30

FECHA DE SIEMBRA

15 mayo

ETAPAS Y TIEMPO TÉRMICO ACUMULADO DESDE LA SIEMBRA

BBCH	ETAPA	°C·D	
09	Emergencia	65	×
16	Seis hojas (V6)	300	×
65	Floración (VT/R1)	780	×
75	Grano lechoso (R3)	950	×
89	Madurez fisiológica (R6)	1450	×

+ Etapa

Las del catálogo

Recalcular

Tomar cultivo y fecha del Bloque 4

Figura 8.1. El maíz del Bajío: promedio acotado, base 10, umbral 30, siembra el 15 de mayo, y la tabla de etapas del catálogo, que se edita renglón por renglón. [Tomar cultivo y fecha del Bloque 4](#) hereda lo elegido allá.

8.3 El calendario fenológico del sitio




Figura 8.2. El calendario fenológico del maíz del Bajío sembrado el 15 de mayo: floración el 20 de julio (del 16 al 23 en el 60 % central de los años), madurez el 10 de octubre a los 148 días, con ± 8 días de desviación entre años.

BBCH	Etap	°C·d	Fecha mediana	Días	P20	P80	± días	Años que la alcanzan
09	Emergencia	65	20 may	5	20 may	21 may	1	100 %
16	Seis hojas (V6)	300	8 jun	24	6 jun	9 jun	2	100 %
65	Floración (VT/R1)	780	20 jul	66	16 jul	23 jul	4	100 %
75	Grano lechoso (R3)	950	6 ago	83	2 ago	10 ago	4	100 %
89	Madurez fisiológica (R6)	1,450	10 oct	148	6 oct	19 oct	8	100 %

La dispersión crece con la etapa: un día en la emergencia, cuatro en la floración, ocho en la madurez, porque el otoño paga el calor más despacio y una semana fresca retrasa mucho. La figura de las etapas de cada año, y su cuadro ([↓ Fechas por año \(.csv\)](#)), dan la fecha de cada etapa en cada uno de los veinte años: la madurez más temprana fue el 27 de septiembre de 2016 y la más tardía el 25 de octubre de 2025.



Figura 8.3. La tabla del calendario y las etapas de cada año, una fila por año: se ve de un vistazo qué años adelantaron y cuáles atrasaron.

DEL BLOQUE 4 AL BLOQUE 8 CAMBIA LA FECHA DE SIEMBRA

El Bloque 4 sembró el 15 de abril para explorar el calor; el Bloque 8 hereda del Bloque 6 la siembra del 15 de mayo, con las lluvias, que es la que el estudio sigue de aquí en adelante. Por eso la madurez pasa de 127 a 148 días: sembrar un mes más tarde mete el llenado de grano en octubre, cuando el calendario térmico va a 6 °C·d por día. El Bloque 9 cruza esa fecha con el agua y las heladas.

8.4 Calibrar con fechas observadas

La tarjeta 3 recibe las fechas que se hayan observado en campo, una línea por observación: **año; etapa; fecha** (por ejemplo **2019; 65; 25/07/2019**). Si la siembra de ese año no fue la de arriba, se escribe la fecha de siembra en lugar del año: **15/05/2019; 65; 25/07/2019**. Para cada observación la app calcula los °C·d que ese año acumuló desde la siembra hasta esa fecha; con ellos, la media y la variación de cada etapa entre años; y con tres o más años, la base de Arnold.




Figura 8.4. La calibración con las observaciones de ejemplo (diez años, floración y madurez): la tabla con el catálogo contra lo observado, los °C·d observados por año y la curva de la búsqueda de la base con su mínimo.

▶ EJEMPLO · LAS OBSERVACIONES DE EJEMPLO

Cargar observaciones de ejemplo escribe veinte fechas ficticias de floración y madurez de diez años alternos, y **Calcular con las observaciones** las lee: «20 observaciones de 20 leídas. Con la etapa 65 (10 años), el tiempo térmico varía menos entre años con base 13.5 °C (CV 3.5 %) frente a 3.6 % con la base actual de 10.0 °C; considera cambiarla.»

BBCH	Etapas	Años	Catálogo	Observado (media)	Mín.	Máx.	CV	Días (media)	CV en días
65	Floración	10	780	796	755	846	3.6 % <i>excelente</i>	66	8.1 %
89	Madurez	10	1,450	1,450	1,423	1,480	1.3 % <i>excelente</i>	149	6.4 %

Los °C·d observados varían 3.6 % entre años y los días 8.1 %: el tiempo térmico explica la floración mejor que el calendario, que es lo que un modelo de grados-día promete. La diferencia entre la base actual (CV 3.6 %) y la de Arnold (3.5 %) es despreciable aquí, así que no vale la pena cambiar la base; **Usar también la base de Arnold** la aplicaría. Las observaciones de ejemplo se generaron con el propio modelo y por eso calzan tan bien: con fechas reales los CV son mayores y ahí es donde la tabla informa de verdad.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ TAN CALIBRABLE ES LA ETAPA

Si el CV del tiempo térmico a la etapa es menor de 5 %	entonces excelente: usa la media observada como requerimiento.
Si está entre 5 y 10 %	entonces bueno: úsala y reporta el rango.
Si está entre 10 y 20 %	entonces utilizable: revisa la base (Arnold) y el fotoperiodo.
Si pasa de 20 %	entonces otra cosa manda: agua, fotoperiodo o cultivar; el tiempo térmico solo no basta.
Si el CV en °C·d no es menor que el CV en días	entonces el modelo térmico no gana nada al calendario para esa etapa.

Escala de la ficha *Calibrar los requerimientos térmicos*. Con dos años no hay CV que valga; con tres empieza a decir algo; con cinco se puede publicar.


8.5 El frío invernal

Manzano, durazno, peral, nogal: los caducifolios entran en reposo en otoño y necesitan una dosis de frío para salir de él y florecer parejo. Si el invierno no la da, la brotación se retrasa y se desordena, y la cosecha se pierde. La tarjeta 4 la cuenta con los tres modelos que se usan, sobre la ventana de invierno que se elija (de noviembre a febrero en el hemisferio norte por omisión).

Modelo	Cómo cuenta
Horas frío (Weinberger 1950)	Cada hora entre 0 y 7.2 °C vale una. Simple y todavía muy citada; no descuenta el calor.
Unidades Utah (Richardson, Seeley y Walker 1974)	Cada hora vale entre -1 y +1 según su temperatura: máximo entre 2.5 y 9.1 °C, cero cerca de 0 y de 13 °C, negativo por encima de 16 °C. En climas cálidos el total puede salir negativo, y entonces el modelo no sirve.
Porciones de frío , modelo dinámico (Fishman, Erez y Couvillon 1987)	El frío se acumula en un intermediario que el calor puede destruir hasta que se fija en una porción; una porción fijada ya no se pierde. Es el modelo más robusto en climas templados cálidos y el que se recomienda comparar entre sitios (Luedeling 2012).

Los tres necesitan temperaturas horarias. Cuando la estación solo da máxima y mínima, la app reconstruye las 24 horas de cada día con el método de **Linville (1990)**: una senoide de día y un enfriamiento logarítmico de noche, con la duración del día que salen de la latitud y la fecha. El sello del Bloque 2 lo anuncia: «*Frío invernal (horas estimadas de Tmax/Tmin)*».

El Bajío no es sitio de caducifolios (12.4 porciones en el invierno mediano, *muy poco frío*; las unidades Utah salen negativas y la app advierte que ahí no valen). Para enseñar la tarjeta se usa el **Valle templado (2 250 m)** con el manzano:



▶ EJEMPLO · EL MANZANO EN EL VALLE TEMPLADO

«Entre noviembre y febrero el sitio acumula 27.0 porciones de frío en el invierno mediano y 21.2 en uno de cada cinco inviernos cálidos (392 unidades Utah, 541 horas frío). Un cultivar de 58 porciones no cubre su frío casi ningún invierno (0 %): el sitio no es para él.»

El catálogo dice del manzano: 45–70 porciones (800–1200 unidades Utah, 800–1400 horas frío) según el cultivar; se toma el centro del rango, 58. El valle da menos de la mitad: entre 18.8 (2012–13) y 39.8 (2007–08) porciones según el invierno. Un manzano de alto requerimiento no prospera ahí; un durazno de bajo requerimiento (20–30 porciones) sí la mayoría de los inviernos, y el campo [Requerimiento](#) permite probarlo. Con un requerimiento que sí se cubre, la tabla dice en qué fecha se cubrió cada invierno y, si se escribe la meta de grados-hora de crecimiento (GDH), en qué fecha florecería.

✓ REGLA DE DECISIÓN · LAS PORCIONES DE FRÍO DEL INVIERNO


Si el invierno mediano da menos de 20 porciones	entonces muy poco frío: solo cultivares de bajo requerimiento, y con riesgo.
Si da de 20 a 45	entonces frío medio: durazno y ciruelo de requerimiento medio.
Si da de 45 a 70	entonces frío alto: manzano, peral, cerezo.
Si da más de 70	entonces frío muy alto: zonas de invierno largo.
Si las unidades Utah salen negativas	entonces el sitio es demasiado cálido para ese modelo: fíate de las porciones.

Decide con el P20 (uno de cada cinco inviernos cálidos), no con la mediana: un huerto vive treinta años.

8.6 El fotoperiodo

La duración del día depende solo de la latitud y la fecha (Forsythe et al. 1995). La app da dos: el **sol sobre el horizonte** y el día **con crepúsculo civil**, con el sol a -6° , que es el que las plantas sensibles perciben. Para el maíz del Bajío escribe: «En la floración prevista el día dura 14.0 h (13.9 h al sembrar, días alargándose). Este cultivo se considera poco sensible al fotoperiodo; el tiempo térmico basta para fecharlo.» En un cultivo sensible —soya, sorgo, frijol de día corto, cebolla— la misma línea advierte que el tiempo térmico solo no basta, y esa es la primera sospecha cuando la calibración da un CV alto.

5 · Fotoperiodo ?



A 20.60° de latitud el fotoperiodo civil va de 11.7 h (20 dic) a 14.2 h (21 jun): 2.5 h de diferencia. En la floración prevista el día dura 14.0 h (13.9 h al sembrar, días alargándose). Este cultivo se considera poco sensible al fotoperiodo; el tiempo térmico basta para fecharlo.

► Cuadro mensual

Continuar al Bloque 9: riesgos y escenarios →

Figura 8.6. El fotoperiodo del Bajío a 20.6° de latitud: de 11.7 h el 20 de diciembre a 14.2 h el 21 de junio con el crepúsculo civil, que es el que las plantas perciben.

8.7 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>Los requerimientos del catálogo son orientativos. Con dos o tres años de fechas observadas, la sección 3 los recalcula</i>	Recordatorio permanente hasta que se calibra. El informe llama a los requerimientos «orientativos» o «calibrados con fechas observadas» según el caso.
<i>N observaciones de M léidas</i>	Las que no se leyeron tienen una fecha o un código que la app no entendió; revisa el formato año; etapa; fecha .
<i>... el tiempo térmico varía menos entre años con base X °C (CV ...) frente a ... con la base actual; considera cambiarla</i>	La base de Arnold. Si la mejora es de décimas, no cambies nada; si es de puntos, aplícala y vuelve a fechar.
<i>Las unidades Utah salen negativas en algún invierno: el modelo Utah no sirve en climas tan cálidos; fíate de las porciones</i>	Reporta porciones de frío; las Utah y las horas frío solo como referencia.
<i>Un cultivar de N porciones no cubre su frío casi ningún invierno: el sitio no es para él</i>	Prueba un requerimiento menor en el campo Requerimiento antes de descartar la especie.
<i>Este cultivo se considera sensible al fotoperiodo...</i>	Las fechas por tiempo térmico pueden fallar en cultivares de día corto o largo; calibra y mira el CV en días.



BLOQUE 9 · RIESGOS Y ESCENARIOS

Riesgos y escenarios

Qué puede salir mal y cuándo. La helada y el golpe de calor en cada etapa del cultivo, año por año; la ventana de siembra que junta en una sola probabilidad de éxito la madurez, la helada, el calor y el agua de temporal; y qué le pasa al calendario, a la demanda de agua y al frío invernal si el sitio se calienta 1, 2 o 3 °C. Es el bloque donde se toma la decisión, y donde más veces se vuelve a los bloques anteriores.

9.1 Qué puede salir mal y cuándo

9.2 Cultivo, umbrales y criterios

9.3 Helada y golpe de calor por etapa

9.4 La ventana de siembra

9.5 Escenarios: si el sitio se calienta

9.6 Los avisos de este bloque

9.1 Qué puede salir mal y cuándo

No importa que hiele: importa que hiele en la floración. No importa que haga calor: importa que pase de 35 °C cuando el polen del maíz está en el aire. Los Bloques 3 a 8 dieron cada pieza por separado —las heladas del sitio, el calor disponible, el agua del temporal, las fechas de las etapas—; este bloque las pone en el mismo calendario y pregunta, para cada año del registro, si todo salió bien a la vez.

B9

Tres herramientas. El **riesgo por etapa** cuenta, dentro de la ventana de cada etapa de cada año, los días con Tmin bajo el umbral de helada y con Tmax sobre el umbral de calor. La **ventana de siembra** repite el ejercicio para cada fecha del año y añade el agua: una fecha tiene éxito en un año si el cultivo maduró, la etapa sensible no vio helada ni golpe de calor y el rendimiento en temporal alcanzó el mínimo exigido. Y los **escenarios** desplazan las temperaturas de toda la serie y rehacen la fenología, el riesgo, la ETo, el balance y el frío, como análisis de sensibilidad.

TEORÍA EN BREVE · EL GOLPE DE CALOR EN LA ETAPA SENSIBLE

Unas horas por encima de un umbral en floración bastan para perder cosecha: el polen del maíz muere y la seda se seca por encima de 35 °C; el trigo aborta flores por encima de 30–32 °C en antesis; el jitomate y el chile no amarran fruto con máximas de 32–33 °C; el frijol pierde flores sobre 32 °C (Hatfield y Prueger 2015; Porter y Gawith 1999). El catálogo trae un umbral por cultivo; es una convención de trabajo, editable, y el daño real depende de la duración y de la humedad del aire. Un día aislado no siempre daña; una racha de tres, casi siempre.

9.2 Cultivo, umbrales y criterios

1 · Cultivo, umbrales y criterios

Maíz (grano), siembra el 15 de mayo; etapas y requerimientos del Bloque 8 (calibrados o editados ahí); base 10.0 °C, capped. Helada: Tmin ≤ 0 °C; golpe de calor: Tmax ≥ 35 °C; etapa sensible: 65 · Floración (VT/R1).

CULTIVO

Maíz (grano)

FECHA DE SIEMBRA (PARA EL RIESGO POR ETAPA)

15 mayo

HELADA: TMIN ≤ (°C)

0

GOLPE DE CALOR: TMAX ≥ (°C)

35

ETAPA SENSIBLE

65 · Floración (VT/R1)

LA HELADA CUENTA EN

la etapa sensible

☒ Exigir agua suficiente en temporal (balance del Bloque 6)

RENDIMIENTO RELATIVO MÍNIMO (%)

75

ÉXITO OBJETIVO (% DE LOS AÑOS)

80

Recalcular

Figura 9.1. Los criterios del maíz del Bajío: siembra el 15 de mayo (heredada del Bloque 6), helada a 0 °C (del Bloque 3), golpe de calor a 35 °C (del catálogo), etapa sensible 65, la helada contada en la etapa sensible, rendimiento mínimo del 75 % y éxito objetivo del 80 %.

Control	Qué hace
Cultivo y Fecha de siembra	El cultivo y sus etapas se heredan del Bloque 8 si se calcularon ahí (calibradas o no); si no, del catálogo. La fecha se hereda del Bloque 6.
Helada: Tmin ≤ (°C)	El umbral del Bloque 3 por omisión; 2 °C para cultivos sensibles.
Golpe de calor: Tmax ≥ (°C)	El del catálogo para el cultivo (35 para el maíz, 32 para el frijol y el jitomate...).
Etapla sensible	La etapa en que la helada y el calor cuentan para el éxito: la floración en casi todos los cultivos.

Control	Qué hace
La helada cuenta en	la etapa sensible o todo el ciclo . Un cultivo que muere con una helada en cualquier momento (jitomate, frijol) usa la segunda.
Rendimiento relativo mínimo (%)	El rendimiento en temporal (Bloque 6) por debajo del cual el año cuenta como fallido por agua; 75 % por omisión.
Éxito objetivo (% de los años)	La fracción de años que una fecha debe cumplir para entrar en la ventana; 80 % por omisión.
Escenarios	Los incrementos de temperatura (1, 2, 3 °C), el cambio de lluvia en % y si se calcula también el frío invernal.

9.3 Helada y golpe de calor por etapa




Figura 9.2. El riesgo por etapa del maíz del Bajío sembrado el 15 de mayo: madura en el 100 % de los años, la helada entra en el ciclo en el 5 % (en la madurez), el golpe de calor en el 25 %, sobre todo en las seis hojas; la etapa sensible ve calor en el 5 % y helada en ninguno.

BBCH	Etapas	Días	Años con helada	Días de helada	Mín. absoluta	Años con calor	Días de calor	Máx. absoluta
09	Emergencia	6	0 %	0.0	8.2 °C	5 %	0.1	35.8 °C
16	Seis hojas (V6)	18	0 %	0.0	10.7 °C	20 %	0.3	35.7 °C
65	Floración (VT/R1) <i>sensible</i>	42	0 %	0.0	7.7 °C	5 %	0.1	36.9 °C

BBCH	Etapa	Días	Años con helada	Días de helada	Mín. absoluta	Años con calor	Días de calor	Máx. absoluta
75	Grano lechoso (R3)	17	0 %	0.0	5.0 °C	0 %	0.0	33.9 °C
89	Madurez fisiológica (R6)	68	5 %	0.1	0.0 °C	0 %	0.0	32.4 °C

La app lo resume: «La helada entra en el ciclo en 5 % de los años, sobre todo en la etapa 89 (madurez fisiológica, 5 %). El calor por encima de 35 °C aparece en 25 % de los años, con más frecuencia en 16 (20 %).» Sembrado el 15 de mayo, el maíz del Bajío florece en pleno julio, cuando las lluvias ya bajaron las máximas: el calor de mayo y junio lo alcanza en las seis hojas, donde no daña, y la única helada del ciclo cae en octubre, sobre el grano ya hecho. Es una fecha bien puesta respecto a la temperatura.



Figura 9.3. La probabilidad de helada y de calor de cada día del año, suavizada a ± 3 días, con las etapas de la siembra elegida encima. En el Bajío el calor asoma en mayo y junio y la helada en noviembre; la floración queda entre los dos.

B9

✓ REGLA DE DECISIÓN · AÑOS CON CALOR EN LA ETAPA SENSIBLE

Si menos del 10 % de los años ven un día de calor en la etapa sensible	entonces el riesgo es bajo.
Si entre 10 y 25 %	entonces moderado: uno de cada cuatro a diez años.
Si entre 25 y 50 %	entonces alto: cambia la fecha o el cultivar.
Si más del 50 %	entonces muy alto.
Para la helada vale la misma escala; la ficha <i>Golpe de calor en la etapa sensible</i> la trae.	

9.4 La ventana de siembra

La tarjeta 3 siembra el cultivo cada cinco días del año en cada año del registro y, para cada fecha y cada año, revisa cuatro condiciones: maduró; no hubo helada (en la etapa sensible o en el ciclo, según se eligió); no hubo golpe de calor en la etapa sensible; el rendimiento en temporal alcanzó el mínimo. El **éxito** de la fecha es la fracción de años en que las cuatro se cumplieron a la vez. No es el producto de las cuatro probabilidades: es la conjunción año por año, que es lo que le pasa a un productor.




Figura 9.4. La ventana de siembra del maíz del Bajío: la curva de cada criterio a lo largo del año y, en verde, el éxito conjunto; la banda es la ventana con al menos 80 % de éxito. Se ve qué criterio tumba el éxito en cada fecha: el agua antes de mayo y después de julio, la madurez en el otoño.

► EJEMPLO · LA VENTANA DEL MAÍZ EN EL BAJÍO

«Ventana con al menos 80 % de éxito en el registro: del 21 may al 25 jun (mejor el 10 jun: 95 %, 180 días). Éxito significa que en ese año el cultivo maduró, no hubo helada en la etapa sensible, no hubo golpe de calor en la etapa sensible y el rendimiento relativo en temporal fue de al menos 75 %.»

Los tres bloques decían cosas distintas: el Bloque 4, que térmicamente lo mejor es marzo; el Bloque 6, que para el agua lo mejor es el 31 de mayo; el Bloque 3, que las lluvias empiezan el 6 de junio en la mediana. La ventana los concilia: del 21 de mayo al 25 de junio, con el óptimo el 10 de junio, cuando cuatro de cada cinco años el maíz madura, florece sin calor ni helada y el temporal rinde al menos el 75 %. Fuera de la ventana el éxito cae por el agua (antes) o porque el llenado se mete en el otoño seco y frío (después). El cuadro completo, cada cinco días, se descarga con [↓ Ventana completa \(.csv\)](#).

✓ REGLA DE DECISIÓN · LA PROBABILIDAD DE ÉXITO DE UNA FECHA	
Si el éxito es de 80 % o más	entonces es ventana recomendable: falla uno de cada cinco años o menos.
Si está entre 60 y 80 %	entonces es aceptable con riesgo: conviene seguro o riego.
Si es menor de 60 %	entonces evitar.
Si el criterio que tumba el éxito es el agua	entonces el riego lo arregla: rehaz la ventana con el rendimiento mínimo bajo y planea el riego del Bloque 7.
Si es la helada al final	entonces sembrar antes o un cultivar más precoz.
Si es el calor en floración	entonces mover la siembra para que florezca fuera del pico.
Con menos de diez años el porcentaje es grueso (con cinco solo hay 0, 20, 40...); y el registro pasado no contiene el clima futuro: mira los escenarios.	

9.5 Escenarios: si el sitio se calienta

La tarjeta 4 desplaza todas las temperaturas de la serie (máxima, mínima y media) en +1, +2 y +3 °C —y, si se pide, escala la lluvia— y repite los cálculos: la fenología, el riesgo por etapa, la ETo por Penman–Monteith, el balance en temporal y el frío invernal. Es el **método delta**, la forma más simple de análisis de sensibilidad al clima; no es un pronóstico y la app lo dice.



Figura 9.5. Los escenarios del maíz del Bajío: la tabla con los indicadores de cada uno y la figura con cada indicador como fracción del clima actual.

Escenario	Días a madurez	Fecha	Madura	Días de helada	Días de calor	ETo anual	ETc temporada	Rend. temporal
Clima actual	148	10 oct	100 %	0.1	0.5	1548	497	87 %
+1 °C	132	24 sep	100 %	0.0	2.8	1589	510	85 %

Escenario	Días a madurez	Fecha	Madura	Días de helada	Días de calor	ETo anual	ETc temporada	Rend. temporal
+2 °C	120	12 sep	100 %	0.0	4.8	1629	524	83 %
+3 °C	111	3 sep	100 %	0.0	9.5	1670	537	80 %

▶ EJEMPLO · EL MAÍZ DEL BAJÍO CON +3 °C

«Con +3 °C, Maíz (grano) madura 37 días antes (148 → 111); la ETo anual pasa de 1548 a 1670 mm (8 %); el rendimiento en temporal, de 87 % a 80 %; los días de helada en el ciclo, de 0.1 a 0.0, y los de calor, de 0.5 a 9.5.»

La lectura tiene dos capas. La primera es lo que la tabla muestra: el ciclo se acorta cinco semanas, la demanda de agua sube y el temporal rinde menos, y los días de golpe de calor en el ciclo se multiplican por veinte. La segunda es lo que el modelo no ve, y la app lo advierte: un ciclo más corto rinde menos por sí solo, porque tiene menos días de llenado, aunque el tiempo térmico lo dé por maduro. Y el frío invernal —la columna de porciones, cuando el cultivo lo necesita— es lo primero que se pierde con el calentamiento en los sitios de caducifolios.

EL CALENDARIO DEL CULTIVO EN CADA ESCENARIO




Figura 9.6. El calendario del cultivo en cada escenario: la misma siembra, las etapas cada vez más temprano. La floración del clima actual cae el 20 de julio; con +3 °C, a principios de julio, más cerca del pico de calor.

! SENSIBILIDAD, NO PRONÓSTICO

Sumar 2 °C a cada día del registro no es el clima de 2050: el calentamiento real no es uniforme, cambia más las mínimas que las máximas, mueve las lluvias y cambia la variabilidad. Lo que el escenario dice es **en qué dirección y cuánto** responde cada indicador del estudio a un cambio de temperatura, y cuál de ellos es el frágil. Cítalo así en el informe: como análisis de sensibilidad (IPCC 2021; Hatfield et al. 2011).

9.6 Los avisos de este bloque

Mensaje	Qué significa y qué hacer
<i>La helada entra en el ciclo en X % de los años, sobre todo en la etapa ...; el calor aparece en Y %</i>	El resumen del riesgo por etapa. Mira en qué etapa cae cada uno antes de preocuparte por el total.
<i>Ventana con al menos X % de éxito: del ... al ... (mejor el ...)</i>	La recomendación. Si es muy estrecha, baja el rendimiento mínimo (con riego) o el objetivo, y di en el informe cuál elegiste.
<i>Ninguna fecha de siembra alcanza el X % de éxito con todas las condiciones a la vez; la mejor es ...</i>	El sitio no da esa seguridad para ese cultivo en temporal. Revisa qué criterio manda en la figura y decide: riego, otro cultivar, otro objetivo.
<i>Con +3 °C, ... madura N días antes...</i>	La lectura del escenario más caliente; es sensibilidad, no pronóstico.
<i>Las etapas vienen del catálogo / del Bloque 8 (calibradas)</i>	La línea de contexto dice de dónde salieron las etapas; si calibraste en el Bloque 8, aquí se usan las calibradas.
<i>Primero hace falta una serie</i>	Vuelve al Bloque 2.

10

BLOQUE 10 · INFORME

Figuras, informe y paquete

Todo lo que se calculó, listo para salir de la app: cada figura del estudio en PNG, JPG o SVG hasta 900 ppp con el estilo que se elija; un informe de un solo archivo que se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF, con los métodos redactados a partir de lo que realmente se corrió; y un .zip con el informe, las figuras, los cuadros, los parámetros y el proyecto que lo reproduce. Es lo que se entrega con la tesis, el artículo o el dictamen.

10.1 Lo que sale de la app

10.3 El catálogo de figuras y el estudio de figuras

10.5 El paquete reproducible

10.2 El estado del estudio

10.4 El informe

10.6 Antes de entregar

10.1 Lo que sale de la app

Un estudio agroclimático se defiende con tres cosas: las figuras, el texto de métodos y la posibilidad de que otro lo repita. El Bloque 10 produce las tres desde lo que los bloques anteriores dejaron en memoria; no calcula nada nuevo. Por eso su primera tarjeta es un inventario de lo que existe, y por eso todo lo que exporta lleva la versión del programa y los parámetros con que se obtuvo.

B10

1 TRES FORMAS DE SACAR UNA FIGURA

Desde su bloque, con el botón ↓ que aparece en la esquina de cada figura al pasar el cursor; desde el catálogo de este bloque, una a una o todas las seleccionadas; o dentro del paquete .zip. Las tres usan el mismo motor y el mismo estilo, y las tres resuelven los colores del tema antes de escribir el archivo: la figura exportada ya no depende de la app.

10.2 El estado del estudio




Figura 10.1. El estado del estudio del Bajío: 8 de 8 bloques calculados y 42 figuras dibujadas. Cada bloque dice si está calculado y ofrece el botón para ir a verlo o a calcularlo.

Un bloque se calcula al visitarlo. El que no se ha visitado desde la última carga de la serie aparece *sin calcular* y no entra en el informe: la app lo dice —«*Los bloques sin calcular no aparecen en el informe: visita cada uno (se calcula solo al abrirlo) y vuelve aquí*»— y con los ocho listos cambia a «*El estudio está completo: exporta las figuras, revisa el informe y descarga el paquete*». Si se cambió un parámetro aguas arriba, los bloques de abajo se recalculan al abrirlos: antes de exportar conviene recorrer del 3 al 9 y comprobar que cada uno muestra lo que se quiere.

10.3 El catálogo de figuras y el estudio de figuras



Figura 10.2. El catálogo: formato, resolución, tema y fondo arriba; los botones de exportar, marcar y desmarcar; y las miniaturas de las 42 figuras agrupadas por bloque, cada una con su casilla y su botón ↓.

Control	Qué hace
Formato	PNG , JPG o SVG .
Resolución	150 ppp · pantalla , 300 ppp · impresión , 600 ppp · revista , 900 ppp · cartel . No aplica al SVG, que no tiene resolución.
Tema y Fondo	Claro, oscuro o el de la pantalla; fondo según el estilo, blanco, tarjeta o transparente.
Con título dentro de la figura	Escribe el título de la figura dentro de la imagen exportada.
Estudio de figuras	Abre el panel del estilo (el mismo del botón de la paleta de la barra superior).
↓ Exportar las seleccionadas	Descarga las figuras marcadas, una por una hasta seis; con más, en un solo .zip, porque el navegador bloquea muchas descargas seguidas.
Todas las seleccionadas en un .zip	Siempre en un .zip, con el formato y la resolución elegidos.
Marcar todas / Ninguna / solo estas	La selección; <i>solo estas</i> , junto al nombre de cada bloque, deja marcadas solo las de ese bloque.

El estudio de figuras

El botón de la paleta abre un panel con nueve paletas —entre ellas la de **Okabe–Ito**, segura para daltónicos, y una en **grises** para imprimir en blanco y negro—, siete tipografías, las escalas de grosor y tamaño de letra y el fondo. Cambia **todas** las figuras de la app a la vez, en pantalla y en lo que se exporta, porque cada figura está dibujada con las variables de color del tema y el estilo es una sola regla que las redefine. El estilo activo se guarda en el registro de cálculo del informe.

✓ REGLA DE DECISIÓN · FORMATO Y RESOLUCIÓN


Si la figura se va a editar o es la versión final vectorial	entonces SVG: se abre en Inkscape, Illustrator o PowerPoint y no se pixela nunca.
Si va a una tesis o a una impresión de oficina	entonces PNG a 300 ppp.
Si va a una revista	entonces PNG a 600 ppp (o el TIFF que pidan, convertido sin pérdida desde el PNG).
Si va a un cartel de 90 cm	entonces 900 ppp, y cuenta con archivos de decenas de MB.
Si el destino exige JPG	entonces JPG, sabiendo que comprime con pérdida y no tiene transparencia.

Las fichas *PNG*, *JPG* o *SVG* y *Resolución* traen las escalas. Una figura de 700 × 320 unidades sale a 2917 × 1333 píxeles a 300 ppp y a 8750 × 4000 a 900.

10.4 El informe

El informe es un solo archivo `.html`, sin dependencias, que se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF con [Imprimir a PDF](#) o desde el propio navegador. Con el estudio del Bajío completo pesa 683 kB y trae doce secciones, veinte figuras y quince cuadros:

Sección	Qué contiene
Resumen	Una línea por bloque con el resultado: el clima, las heladas, la ETo, la madurez, el temporal, el riego, la ventana de siembra, el frío.
1 · Sitio y datos	El sitio, el periodo, los años completos, la cobertura de cada variable, la frase del control de calidad y el calendario de disponibilidad.
2 · El clima del sitio	El párrafo del clima, el climograma, las normales, las heladas (con la tabla de fechas solo si hiela en al menos una de cinco temporadas), los índices.
3 a 8	Una sección por bloque calculado —grados-día, ETo, balance, riego, fenología, riesgos— con sus cuadros y sus figuras incrustadas como SVG con los colores ya resueltos. Las secciones se numeran en el orden en que existen.
Métodos	Redactados a partir de lo que se corrió: el control de calidad, los criterios de las normales, el método y el corte de los grados-día, la frase de la ETo con los días estimados, el balance de FAO-56 y la función de FAO-33, la regla de riego, el frío con Linvill, el riesgo y los escenarios. Lo que no se usó no aparece.
Referencias	Solo las de los métodos que el estudio usó, y la cita del programa al final.
Cómo citar	La cita del programa con su versión.
Anexo. Registro de cálculo	Todos los parámetros de cada bloque, en texto plano, para que el estudio se pueda repetir.



10.5 El paquete reproducible

4 · Paquete reproducible ?

Un .zip escrito por la propia app: el informe, el proyecto que lo reproduce, el registro de cálculo, los cuadros en .csv y las figuras seleccionadas en el catálogo (en el formato y la resolución elegidos arriba). Es lo que se entrega con el artículo, la tesis o el dictamen.

- `LEEME.txt` — qué contiene y cómo reproducirlo
- `informe.html` — el informe con las secciones marcadas arriba
- `proyecto.json` — la serie limpia y el sitio (se abre en el Bloque 2)
- `parametros.json` — el registro de cálculo de todos los bloques
- `cuadros/ (12)` — los cuadros en .csv
- `figuras/ (42)` — las figuras seleccionadas en el catálogo

☒ Incluir las figuras seleccionadas ☒ y además en SVG (editable)

↓ Construir y descargar el paquete .zip

Figura 10.4. El paquete: lo que contiene, si lleva las figuras seleccionadas y si además las lleva en SVG, y el botón que lo construye. El estado de abajo dice cuántos archivos y cuántos megabytes salieron.

Archivo	Qué es
<code>LEEME.txt</code>	Qué contiene el paquete y cómo reproducir el estudio en tres pasos.
<code>informe.html</code>	El informe con las secciones marcadas arriba.
<code>proyecto.json</code>	La serie limpia y el sitio, tal como salieron del Bloque 2. Se abre en el Bloque 2 de cualquier copia de la app.
<code>parametros.json</code>	El registro de cálculo: los parámetros de cada bloque, la versión del programa y el estilo de figuras.
<code>cuadros/*.csv</code>	Los cuadros del estudio: la serie limpia, las normales, los grados-día por año y por fecha de siembra, la ETo mensual y diaria con todos sus términos, el balance por año, el riego por año y el calendario del año mediano, las fechas fenológicas por año, el frío por invierno y la ventana de siembra. Doce con el estudio completo.
<code>figuras/*</code>	Las figuras seleccionadas en el catálogo, en el formato y la resolución elegidos y, si se marcó, también en SVG.

▶ EJEMPLO · EL PAQUETE DEL BAJÍO

Con las 42 figuras en PNG a 150 ppp y en SVG: «*Paquete listo · 100 archivos · 3.1 MB.*» A 300 ppp las figuras pesan unas cuatro veces más; a 900, treinta y seis. El paquete lo escribe la propia app, byte a byte, según la especificación pública del formato .zip, comprimiendo con el motor del navegador: no hay ninguna biblioteca ajena dentro.

TEORÍA EN BREVE · QUÉ HACE REPRODUCIBLE UN ESTUDIO

Tres cosas: los **datos** tal como entraron al cálculo (la serie limpia, no la cruda), los **parámetros** de cada paso (base, umbrales, Kc, suelo, regla de riego, fechas) y la **versión** del programa. El paquete guarda las tres: `proyecto.json`, `parametros.json` y el número de versión en el informe. Con ellas la misma serie da los mismos cuadros en cualquier computadora, sin conexión, porque todos los cálculos son deterministas (Sandve et al. 2013; Wilkinson et al. 2016).

10.6 Antes de entregar

✓ REGLA DE DECISIÓN · LA REVISIÓN FINAL

Si el estado dice menos de 8 bloques calculados	entonces visita los que faltan o decide que no van, y dilo en el texto.
Si cambiaste algo en un bloque después de la vista previa	entonces genera el informe de nuevo antes de descargarlo.
Si la frase de la ETo dice que se estimó una variable	entonces déjala tal cual en el artículo: es lo que se hizo.
Si los requerimientos térmicos son del catálogo	entonces el informe los llama orientativos; no los presentes como del cultivar.
Si la tesis pide figuras a 300 ppp	entonces exporta en PNG a 300 y comprueba el tamaño impreso.
Si el anexo tiene que ser reproducible	entonces entrega el .zip completo, con el <code>proyecto.json</code> dentro.
Si vas a publicar	entonces copia la cita de la herramienta que el propio informe trae al final.

Con esto se cierran los diez bloques. Lo que sigue en el manual son los apéndices: los archivos que la app lee y escribe, las reglas de decisión reunidas, el glosario, qué hacer cuando algo no sale, las referencias y la licencia.



APÉNDICES

Apéndices

Lo que hace falta tener a la mano y no cabía en ningún capítulo: qué archivos lee y escribe la app, las reglas de decisión de los diez bloques reunidas en una sola lista, el vocabulario de la agroclimatología, qué hacer cuando algo no sale, las referencias detrás de cada cálculo y la licencia de la herramienta.

A Los archivos que la app lee y escribe

C Glosario

E Referencias

B Las reglas de decisión, reunidas

D Cuando algo no sale

F La herramienta: licencia y cómo citarla

A Los archivos que la app lee y escribe

PhenologyPro es un programa de escritorio que corre en el navegador y no envía nada a ningún servidor: todos los archivos entran y salen de la carpeta de la computadora. Este apéndice dice cuáles son.

A.1 · Lo que la app lee

Formato	Dónde y para qué
.csv, .txt, .tsv	Bloque 2, la serie diaria. Separador por coma, punto y coma, tabulador o espacios, detectado solo; encabezado de una o varias líneas; «Nulo», «NA», «-» o vacío como faltante; fechas en cualquier orden o repartidas en año, mes y día; grados Fahrenheit, viento en km/h o nudos y radiación en $W\ m^{-2}$ se convierten al leer.
pegado	Bloque 2, el cuadro de texto: un bloque de celdas copiado de una hoja de cálculo con su fila de encabezados. Es la forma más rápida.
.json de proyecto	Bloque 2, Cargar proyecto o la zona de archivos. El sitio y la serie limpia con sus marcas, escritos antes por la app.
fechas observadas	Bloque 8, pegadas: una línea por observación, año ; etapa ; fecha o siembra ; etapa ; fecha .

! UN LIBRO DE CÁLCULO NO SE LEE, Y ES A PROPÓSITO

Un [.xlsx](#), [.xls](#) u [.ods](#) no se abre; la app pide guardarlo como .csv o copiar y pegar las celdas. Leerlo exigiría incorporar una biblioteca ajena de cientos de miles de líneas para un problema que se resuelve en dos clics. Se prefirió que la app **no cargue una sola línea que no sea propia**: es lo que le permite abrirse con doble clic, sin instalar nada, y funcionar sin internet.

A.2 · Lo que la app escribe

Todos los archivos llevan por delante el nombre del sitio. Con el sitio «Bajío semiárido (1 800 m)», por ejemplo, la serie limpia sale como [Bajio_semiarido_1_800_m.csv](#).

Bloque	Botón	Contenido
2	↓ Plantilla (.csv)	Las columnas que la app entiende, con dos filas de muestra.
2	↓ Serie limpia (.csv)	La serie tras el control de calidad, con la columna flags que dice qué se hizo en cada fila.
2	↓ Guardar proyecto (.json)	El sitio y la serie limpia; se vuelve a abrir en cualquier copia de la app.
3	↓ Normales (.csv)	Las doce filas de normales mensuales con todas sus columnas.
4	↓ Por año (.csv) · ↓ Mapa completo (.csv)	Los grados-día por año desde la siembra; el mapa por fecha de siembra cada cinco días.
5	↓ Mensual (.csv) · ↓ Diaria con todos los términos (.csv)	La ETo mensual por método; la diaria con R_a , R_s , R_n , e_s , e_a , u_2 y la ETo de cada método.
6	↓ Por año (.csv) · ↓ Balance diario del año visto (.csv)	El balance de cada temporada; el balance día a día del año elegido.
7	↓ Calendario del año (.csv) · ↓ Todos los años (.csv)	Los riegos del año visto; los totales de cada año.

Bloque	Botón	Contenido
8	↓ Fechas por año (.csv) · ↓ Frío por invierno (.csv)	La fecha de cada etapa en cada año; el frío de cada invierno en las tres unidades.
9	↓ Ventana completa (.csv)	La ventana de siembra cada cinco días con los cuatro criterios y el éxito.
10	↓ de cada figura · ↓ Exportar las seleccionadas .zip	Figuras en PNG, JPG o SVG hasta 900 ppp, con los colores del estilo ya resueltos.
10	↓ Descargar informe .html	El informe de un solo archivo, imprimible a PDF.
10	↓ Construir y descargar el paquete .zip	LEEME.txt, informe.html, proyecto.json, parametros.json, cuadros/ y figuras/.

B Las reglas de decisión, reunidas

Las escalas que la app pone junto a cada número, en una sola lista. Las marcadas como *convención* son costumbres de lectura, no leyes: lo que se sabe del cultivo, del cultivar y de la parcela siempre manda.

Bloque	Magnitud	Escala
2	Años completos en la serie	< 3 una anécdota · 3–10 una estimación · 10–30 aceptable · ≥ 30 normal climática (OMM)
2	Días interpolados por hueco	≤ 3 seguro · 3–6 aceptable con cuidado · > 6 no interpolar
3	Índice de aridez P/ETP (PNUMA)	< 0.05 hiperárido · 0.05–0.20 árido · 0.20–0.50 semiárido · 0.50–0.65 subhúmedo seco · ≥ 0.65 húmedo
3	Índice de humedad Im (Thornthwaite 1955)	< –66.7 árido (E) · –66.7 a –33.3 semiárido (D) · –33.3 a 0 subhúmedo seco (C1) · 0–20 subhúmedo húmedo (C2) · 20–100 húmedo (B1–B4) · ≥ 100 perhúmedo (A)
3	Concentración de la lluvia (PCI)	< 10 uniforme · 10–15 moderadamente estacional · 15–20 estacional · > 20 fuertemente estacional
3	Temperatura mínima del aire	> 2 °C sin helada · 0–2 riesgo en superficie · –2 a 0 helada ligera · –4 a –2 moderada · < –4 severa
4	CV de los °C·d de la temporada entre años	< 5 % muy estable · 5–10 % estable · 10–20 % variable (planea con el P20) · > 20 % muy variable
5	ETo diaria (mm/día)	< 2 baja · 2–4 moderada · 4–6 alta · 6–8 muy alta · > 8 extrema
5	Desviación de Hargreaves respecto a PM	< 10 % aceptable · 10–20 % calibrar · > 20 % no usar sin corregir
5	RMSE diario del método simple	< 0.5 mm/día muy bueno · 0.5–1.0 aceptable · 1.0–1.5 pobre · > 1.5 malo
5	Parte aerodinámica de la ETo	< 25 % la radiación manda · 25–45 % equilibrado · 45–60 % advectivo · > 60 % fuertemente advectivo
6	Kc	< 0.5 suelo casi desnudo · 0.5–0.9 cobertura parcial · 0.9–1.2 dosel completo · > 1.2 muy alto
6	ADT por metro de suelo	< 90 mm/m baja (arenosos) · 90–140 media · > 140 alta

Bloque	Magnitud	Escala
6	Coeficiente de estrés Ks	1 sin estrés · 0.8–1 leve · 0.5–0.8 moderado · < 0.5 severo
6	Número de curva CN	< 60 poco escurrimiento · 60–75 moderado · 75–85 alto · > 85 muy alto
6	Rendimiento relativo Ya/Ym (FAO-33)	≥ 0.90 sin pérdida apreciable · 0.75–0.90 moderada · 0.50–0.75 severa · < 0.50 cosecha comprometida
7	Eficiencia de aplicación	< 60 % gravedad mal nivelada · 60–75 % gravedad bien manejada, aspersión con viento · 75–88 % aspersión, pivote, microaspersión · > 88 % goteo
8	CV del tiempo térmico a una etapa entre años	< 5 % excelente · 5–10 % bueno · 10–20 % utilizable · > 20 % pobre
8	Porciones de frío del invierno	< 20 muy poco · 20–45 frío medio · 45–70 frío alto · > 70 muy alto
9	Años con calor (o helada) en la etapa sensible	< 10 % bajo · 10–25 % moderado · 25–50 % alto · > 50 % muy alto
9	Éxito de una fecha de siembra	≥ 80 % ventana recomendable · 60–80 % aceptable con riesgo · < 60 % evitar
10	Resolución de exportación	< 150 ppp pantalla · 150–300 tesis · 300–600 revistas · > 600 carteles

c Glosario

Término	Qué es
Agotamiento (Dr)	Lo que le falta a la zona radical para estar a capacidad de campo, en mm. Cero es suelo lleno; igual al ADT es el punto de marchitez.
Agua disponible total (ADT; TAW)	La lámina entre capacidad de campo y punto de marchitez en la profundidad de raíces: $(\theta_{CC} - \theta_{PMP}) \times Z_r$.
Agua fácilmente aprovechable (AFA; RAW)	La fracción p del ADT que el cultivo toma sin estrés. Regar al agotarla es la regla de referencia de FAO-56.
Año completo	Un año con al menos 90 % de los días con Tmax, Tmin y lluvia. Solo los completos entran en las normales por omisión.
BBCH	Escala decimal de estados de desarrollo, común a mono y dicotiledóneas (Meier 2018): 00 semilla seca, 09 emergencia, 65 plena floración, 89 madurez fisiológica.
Climograma de Walter–Lieth	Diagrama de temperatura y lluvia mensuales con la escala 10 °C = 20 mm; donde la lluvia va por encima el mes es húmedo, donde va por debajo, seco.
Coeficiente de cultivo (Kc)	La razón ETc/ETo, que sube de la siembra al dosel completo y baja hacia la madurez; se corrige al viento y la humedad con la ecuación 62 de FAO-56.
Coeficiente de estrés (Ks)	La fracción de la ETc que el cultivo transpira cuando el agotamiento pasa del AFA; 1 sin estrés, 0 en el punto de marchitez.
Corte del umbral superior	Qué hace el método de grados-día con las horas por encima del umbral: horizontal (las cuenta como el umbral), intermedio (las descuenta), vertical (no las cuenta) o ninguno.

Término	Qué es
Déficit (no transpirado)	ETc menos ETc real: el agua que la planta pidió y no tuvo, en mm de la temporada.
Escurrimiento por número de curva	El método del NRCS para la parte de la lluvia que no entra al suelo; el número de curva CN crece con la arcilla, la compactación y la falta de cobertura.
Evapotranspiración de referencia (ET_o)	La de un pasto de 12 cm bien regado bajo el clima del sitio, por Penman–Monteith FAO-56. Depende del clima, no del cultivo.
Evapotranspiración del cultivo (ET_c)	$K_c \times ET_o$: la demanda del cultivo sin estrés. La ETc real es $ET_c \times K_s$.
Factor de respuesta Ky (FAO-33)	Cuánto rendimiento relativo se pierde por cada unidad de déficit relativo de agua en la temporada: $1 - Y_a/Y_m = K_y (1 - ET_a/ET_m)$.
Fotoperiodo	La duración del día; con crepúsculo civil (sol a -6°) es el que las plantas perciben.
Grados-día (°C·d)	La suma diaria de la temperatura por encima de la base, acotada al umbral superior según el corte; la moneda del tiempo térmico.
Grados-hora de crecimiento (GDH)	El calor acumulado hora a hora después de cubierto el frío, que fecha la floración de un frutal (Anderson, Richardson y Kesner 1986).
Helada meteorológica / agronómica	T_{min} del aire $\leq 0^\circ\text{C}$ / daño en las hojas, que en noche despejada se enfrían por debajo del aire; por eso el umbral de 2°C para cultivos sensibles.
Horas frío, unidades Utah, porciones de frío	Las tres formas de contar el frío del invierno: horas entre 0 y 7.2°C ; horas ponderadas que pueden restar; y el modelo dinámico, en el que el frío fijado ya no se pierde.
Índice de aridez (PNUMA)	P/ETP anual con la ETP de Thornthwaite; clases en 0.05, 0.20, 0.50 y 0.65.
Lluvia efectiva	La parte de la lluvia que queda disponible para el cultivo: en el balance diario, lo que entra a la cubeta y no percola; en la necesidad mensual, la fórmula del USDA-SCS.
Mediana, P20, P80	El valor central entre los años del registro y los percentiles 20 y 80: el 60 % central de los años queda entre ambos. Casi todo lo que la app calcula año por año se resume así.
Método delta	Sumar un incremento fijo de temperatura (y escalar la lluvia) a toda la serie para ver cómo responde el estudio; un análisis de sensibilidad, no un pronóstico.
Método de Linvill	La reconstrucción de las 24 temperaturas horarias del día a partir de la máxima y la mínima, con una senoide de día y un enfriamiento logarítmico de noche.
Normal climática	El promedio mensual de una variable sobre un periodo largo; la OMM pide 30 años, en la práctica se aceptan 10.
Periodo libre de heladas	Los días entre la última helada de primavera y la primera de otoño, con la temporada partida en el mes más cálido.
Requerimiento térmico	Los °C·d que una etapa necesita desde la siembra; el del catálogo es orientativo, el calibrado es el del cultivar en el sitio.
Temperatura base	La temperatura por debajo de la cual el desarrollo se detiene; la de Arnold es la que hace mínimo el CV del tiempo térmico entre años.
Temporada de lluvias (inicio y fin)	Definición agronómica de Stern, Dennett y Garbutt: 20 mm en 3 días sin una racha seca de 10 días en el mes siguiente; fin cuando caen menos de 10 mm en 30 días, al menos 60 días después.
Ventana de siembra	Las fechas en que, en al menos la fracción objetivo de los años, el cultivo maduró y no vio helada, calor ni falta de agua a la vez.

D Cuando algo no sale

Lo que pasa	Qué hacer
La app abre pero un bloque dice «Primero hace falta una serie»	No hay serie en memoria: carga una en el Bloque 2 o abre el proyecto .json. La serie de la sesión anterior solo se recupera en el mismo navegador de la misma computadora.
Pegué la tabla y dice «No se encontraron filas con números»	Falta la fila de encabezados, o la fecha viene en un formato que no se reconoce (por ejemplo, texto como «3 de marzo»). Revisa que haya una columna de fecha o las de año, mes y día.
Las fechas salieron con el mes y el día cambiados	En la tarjeta 3 del Bloque 2 elige día/mes/año o mes/día/año a mano y vuelve a armar la serie.
Las temperaturas parecen absurdas (60 °C de máxima)	Están en Fahrenheit: elige °F en la tarjeta 3. Si el viento sale enorme, revisa km/día contra m/s.
El Bloque 3 marca error de normales	Algún mes no tiene ningún año con 80 % de días; usa Todos, mes por mes o revisa el calendario de disponibilidad.
El maíz no alcanza la meta térmica en ningún año	El sitio es frío para ese requerimiento o la temporada es corta: alarga la temporada, baja la meta con un cultivar precoz o cambia la fecha. El mapa del Bloque 4 lo muestra.
La ETo de Penman—Monteith es más baja que la de Hargreaves en verano	Es normal con radiación estimada de la amplitud térmica en climas con lluvias de verano; la tabla de k mensual lo cuantifica.
El déficit controlado aplica más agua que regar al AFA	Con lluvias de verano, esperar más obliga a rellenar una cubeta más vacía justo antes de una lluvia. La app lo advierte; usa la regla de referencia.
Las unidades Utah salen negativas	El sitio es demasiado cálido para ese modelo; reporta porciones de frío.
La calibración no encuentra base de Arnold	Hace falta una etapa con al menos tres años observados.
Exporté diez figuras y solo bajaron unas cuantas	El navegador bloquea las descargas seguidas; usa Todas las seleccionadas en un .zip .
El PNG a 900 ppp tarda o el navegador se queja	Un PNG de 8750 × 4000 píxeles es pesado; expórtalo solo o usa SVG, que no tiene resolución.
El informe no trae una sección que esperaba	Ese bloque no estaba calculado o su casilla estaba desmarcada; visítalo y genera de nuevo.
La ventana de imprimir no se abre	El navegador bloqueó la ventana emergente; descarga el informe y desde él, Imprimir → Guardar como PDF.
Quiero comprobar que el motor calcula bien aquí	Abre tests/index.html : son las pruebas contra los ejemplos resueltos de FAO-56 y las fórmulas de cada método; todas deben salir en verde.

E Referencias

Las cuarenta referencias de la portada de la app, por familia, más las que citan las fichas de ayuda. El informe del Bloque 10 cita solo las de los métodos que el estudio usó.

Evapotranspiración

- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Rome.
- Doorenbos, J. & Pruitt, W.O. (1977). *Guidelines for predicting crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 24. FAO, Rome.
- Hargreaves, G.H. & Samani, Z.A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture* 1(2): 96–99.
- Hargreaves, G.H. & Allen, R.G. (2003). History and evaluation of Hargreaves evapotranspiration equation. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering* 129(1): 53–63.
- Priestley, C.H.B. & Taylor, R.J. (1972). On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters. *Monthly Weather Review* 100: 81–92.
- Thornthwaite, C.W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical Review* 38: 55–94.
- Turc, L. (1961). Évaluation des besoins en eau d'irrigation, évapotranspiration potentielle. *Annales Agronomiques* 12: 13–49.
- Willmott, C.J., Rowe, C.M. & Mintz, Y. (1985). Climatology of the terrestrial seasonal water cycle. *Journal of Climatology* 5: 589–606.

Tiempo térmico

- McMaster, G.S. & Wilhelm, W.W. (1997). Growing degree-days: one equation, two interpretations. *Agricultural and Forest Meteorology* 87: 291–300.
- Baskerville, G.L. & Emin, P. (1969). Rapid estimation of heat accumulation from maximum and minimum temperatures. *Ecology* 50: 514–517.
- Allen, J.C. (1976). A modified sine wave method for calculating degree days. *Environmental Entomology* 5: 388–396.
- Lindsey, A.A. & Newman, J.E. (1956). Use of official weather data in spring time: temperature analysis of an Indiana phenological record. *Ecology* 37: 812–823.
- Zalom, F.G., Goodell, P.B., Wilson, L.T., Barnett, W.W. & Bentley, W.J. (1983). *Degree-days: the calculation and use of heat units in pest management*. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Leaflet 21373.
- Brown, D.M. (1975). *Heat units for corn in southern Ontario*. Ontario Ministry of Agriculture and Food, Factsheet 75-077.
- Brown, D.M. & Bootsma, A. (1993). *Crop heat units for corn and other warm-season crops in Ontario*. Ontario Ministry of Agriculture and Food, Factsheet 93-119.

- Arnold, C.Y. (1959). The determination and significance of the base temperature in a linear heat unit system. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 74: 430–445.
- Neild, R.E. & Newman, J.E. (1990). *Growing season characteristics and requirements in the Corn Belt*. National Corn Handbook NCH-40. Purdue University Cooperative Extension Service.
- Abendroth, L.J., Elmore, R.W., Boyer, M.J. & Marlay, S.K. (2011). *Corn growth and development*. PMR 1009. Iowa State University Extension.
- Miller, P., Lanier, W. & Brandt, S. (2001). *Using growing degree days to predict plant stages*. MontGuide MT200103 AG. Montana State University Extension.
- Ritchie, S.W., Hanway, J.J. & Benson, G.O. (1993). *How a corn plant develops*. Special Report 48. Iowa State University of Science and Technology, Cooperative Extension Service.

Frío y fenología

- Weinberger, J.H. (1950). Chilling requirements of peach varieties. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 56: 122–128.
- Richardson, E.A., Seeley, S.D. & Walker, D.R. (1974). A model for estimating the completion of rest for 'Redhaven' and 'Elberta' peach trees. *HortScience* 9: 331–332.
- Fishman, S., Erez, A. & Couvillon, G.A. (1987). The temperature dependence of dormancy breaking in plants: mathematical analysis of a two-step model involving a cooperative transition. *Journal of Theoretical Biology* 124: 473–483.
- Erez, A., Fishman, S., Linsley-Noakes, G.C. & Allan, P. (1990). The dynamic model for rest completion in peach buds. *Acta Horticulturae* 276: 165–174.
- Linville, D.E. (1990). Calculating chilling hours and chill units from daily maximum and minimum temperature observations. *HortScience* 25: 14–16.
- Anderson, J.L., Richardson, E.A. & Kesner, C.D. (1986). Validation of chill unit and flower bud phenology models for 'Montmorency' sour cherry. *Acta Horticulturae* 184: 71–78.
- Luedeling, E. (2012). Climate change impacts on winter chill for temperate fruit and nut production: a review. *Scientia Horticulturae* 144: 218–229.
- Meier, U. (ed.) (2018). *Growth stages of mono- and dicotyledonous plants: BBCH Monograph*. Julius Kühn-Institut, Quedlinburg.
- Zadoks, J.C., Chang, T.T. & Konzak, C.F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. *Weed Research* 14: 415–421.
- Forsythe, W.C., Rykiel, E.J., Stahl, R.S., Wu, H. & Schoolfield, R.M. (1995). A model comparison for daylength as a function of latitude and day of year. *Ecological Modelling* 80: 87–95.

Balance y riego

- Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. (1955). *The water balance*. Publications in Climatology 8(1). Drexel Institute of Technology, Centerton, NJ.
- Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. (1957). Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. *Publications in Climatology* 10(3): 185–311.
- Doorenbos, J. & Kassam, A.H. (1979). *Yield response to water*. FAO Irrigation and Drainage Paper 33. FAO, Rome.
- Smith, M. (1992). *CROPWAT: a computer program for irrigation planning and management*. FAO Irrigation and Drainage Paper 46. FAO, Rome.
- Dastane, N.G. (1974). *Effective rainfall in irrigated agriculture*. FAO Irrigation and Drainage Paper 25. FAO, Rome.
- Brouwer, C., Prins, K. & Heibloem, M. (1989). *Irrigation water management: irrigation scheduling*. Training Manual 4. FAO, Rome.
- USDA Natural Resources Conservation Service (2004). Estimation of direct runoff from storm rainfall. *National Engineering Handbook*, Part 630 Hydrology, Chapter 10. Washington, DC.

Clima y riesgo

- Walter, H. & Lieth, H. (1960–1967). *Klimadiagramm-Weltatlas*. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Lang, R. (1920). *Verwitterung und Bodenbildung als Einführung in die Bodenkunde*. Schweizerbart, Stuttgart.
- De Martonne, E. (1926). Une nouvelle fonction climatologique: l'indice d'aridité. *La Météorologie* 2: 449–458.
- UNEP (1992). *World atlas of desertification*. Middleton, N. & Thomas, D.S.G. (eds.). Edward Arnold, London.
- Peel, M.C., Finlayson, B.L. & McMahon, T.A. (2007). Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification. *Hydrology and Earth System Sciences* 11: 1633–1644.
- Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B. & Rubel, F. (2006). World map of the Köppen–Geiger climate classification updated. *Meteorologische Zeitschrift* 15: 259–263.
- García, E. (2004). *Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen* (5.^a ed.). Instituto de Geografía, UNAM, México.
- Oliver, J.E. (1980). Monthly precipitation distribution: a comparative index. *The Professional Geographer* 32: 300–309.
- Stern, R.D., Dennett, M.D. & Garbutt, D.J. (1981). The start of the rains in West Africa. *Journal of Climatology* 1: 59–68.
- Snyder, R.L. & de Melo-Abreu, J.P. (2005). *Frost protection: fundamentals, practice and economics*. FAO Environment and Natural Resources Series 10. FAO, Rome.
- FAO (1978). *Report on the agro-ecological zones project. Vol. 1: Methodology and results for Africa*. World Soil Resources Report 48. FAO, Rome.

- Hatfield, J.L. & Prueger, J.H. (2015). Temperature extremes: effect on plant growth and development. *Weather and Climate Extremes* 10: 4–10.
- Porter, J.R. & Gawith, M. (1999). Temperatures and the growth and development of wheat: a review. *European Journal of Agronomy* 10: 23–36.
- Hatfield, J.L., Boote, K.J., Kimball, B.A., Ziska, L.H., Izaurralde, R.C., Ort, D., Thomson, A.M. & Wolfe, D. (2011). Climate impacts on agriculture: implications for crop production. *Agronomy Journal* 103: 351–370.
- IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report. Cambridge University Press.
- WMO (2017). *WMO guidelines on the calculation of climate normals*. WMO-No. 1203. World Meteorological Organization, Geneva.
- WMO (2018). *Guide to climatological practices*. WMO-No. 100. World Meteorological Organization, Geneva.

Reproducibilidad

- Sandve, G.K., Nekrutenko, A., Taylor, J. & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLoS Computational Biology* 9(10): e1003285.
- Wilkinson, M.D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3: 160018.

F La herramienta: licencia y cómo citarla

F.1 · Qué lleva la app por dentro

PhenologyPro está escrita en HTML, CSS y JavaScript sin ninguna biblioteca de terceros: ni para las gráficas, ni para leer archivos, ni para escribir el .zip. Las ecuaciones son las de FAO-56 y de los artículos originales de cada método, citadas por número; los coeficientes de cultivo, las fracciones de agotamiento y los factores K_y son los de las tablas públicas de la FAO; los seis climas de ejemplo son sintéticos y ficticios, generados por el propio programa. El archivo [PROCEDENCIA.md](#) de la carpeta del programa detalla el origen de cada cosa, y [tests/index.html](#) comprueba el motor contra los ejemplos resueltos de FAO-56.

F.2 · Licencia

El programa se distribuye bajo la **Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior** (GPL-3.0-or-later): se puede usar, copiar, estudiar y modificar libremente, con la condición de que las versiones modificadas se distribuyan bajo la misma licencia y conserven la atribución. El texto completo está en el archivo [LICENSE](#). Este manual es © 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán, todos los derechos reservados.

F.3 · Cómo citarla

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PhenologyPro: plataforma en el navegador para la agroclimatología y la fenología de cultivos* (versión 1.0) [Programa de cómputo]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23004710>

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PhenologyPro. Manual de usuario* (1.^a ed.). Distribuido con PhenologyPro, versión 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23004710>

El DOI de concepto 10.5281/zenodo.23004710 resuelve siempre a la versión más reciente archivada en Zenodo; cada versión tiene el suyo (la 1.0.1: 10.5281/zenodo.23004711). El código fuente está en <https://github.com/luisangelbg/PhenologyPro> y la app en línea en <https://luisangelbg.github.io/PhenologyPro/>. La cita del programa está también en [CITATION.cff](#) y al final de cada informe del Bloque 10.