

Livro: Probabilidade - Aplicações à Estatística – Paul L. Meyer
Capítulo 10 – A Função Geratriz de Momentos.

Problemas

1. Suponha que X tenha fdp dada por $f(x) = 2x, 0 \leq x \leq 1$.

a. Determine a fgm de X .

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = 2 \int_{x=0}^{x=1} x e^{tx} dx = 2 e^{tx} \frac{tx - 1}{t^2} \Big|_0^1 = 2 e^t \frac{t - 1}{t^2} + \frac{2}{t^2} \\ &= \frac{2}{t^2} [e^t(t - 1) + 1] \end{aligned}$$

b. Empregando a fgm, calcule $E(X)$ e $V(X)$ e verifique sua resposta. (Veja o Comentário à Pág. 262.)

$$M'_X(t) = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{2}{t^2} [e^t(t - 1) + 1] \right\} = \frac{2e^t(t^2 - 2t + 2) - 4}{t^3}$$

$$M''_X(t) = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{2e^t(t^2 - 2t + 2) - 4}{t^3} \right\} = \frac{2[e^t(t^3 - 3t^2 + 6t - 6) + 6]}{t^4}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \lim_{t \rightarrow 0} M'_X(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{2e^t(t^2 - 2t + 2) - 4}{t^3} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{2e^t(t^2 - 2t + 2) + 2e^t(2t - 2)}{3t^2} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{2t^2 e^t}{3t^2} \right] \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \lim_{t \rightarrow 0} M''_X(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{2[e^t(t^3 - 3t^2 + 6t - 6) + 6]}{t^4} \right] \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{e^t(t^3 - 3t^2 + 6t - 6) + 6}{t^4} \right] = 2 \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{t^3 e^t}{4t^3} \right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$E(X) = 2 \int_{x=0}^{x=1} x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$E(X^2) = 2 \int_{x=0}^{x=1} x^3 dx = \frac{2}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

2.

a. Determine a fgm da tensão (incluindo o ruído) tal como apresentada no Probl. 7.25.

$$\begin{aligned}
M_X(t) &= M_S(t)M_N(t) = E(e^{ts})E(e^{tn}) = \int_0^1 e^{ts} ds \frac{1}{2} \int_0^2 e^{tn} dn = \frac{e^{ts}}{t} \Big|_0^1 \frac{e^{tn}}{2t} \Big|_0^2 = \\
&= \left(\frac{e^t}{t} - \frac{1}{t} \right) \left(\frac{e^{2t}}{2t} - \frac{1}{2t} \right) = \frac{1}{2t^2} (e^t - 1)(e^{2t} - 1) \\
&= \frac{1}{2t^2} (e^t - 1)^2 (e^t + 1)
\end{aligned}$$

b. Empregando a fgm, obtenha o valor esperado e a variância dessa tensão.

$$\begin{aligned}
M'_X(t) &= -\frac{1}{t^3} (e^t - 1)(e^{2t} - 1) + \frac{1}{2t^2} (e^t)(e^{2t} - 1) + \frac{1}{2t^2} (e^t - 1)(2e^{2t}) \\
&= \frac{1}{2t^3} (e^t - 1)[-2e^{2t} + 2 + te^t(e^t + 1) + 2te^{2t}] \\
&= \frac{1}{2t^3} (e^t - 1)[t(e^{2t} + e^t) + 2e^{2t}(t - 1) + 2] \\
&= \frac{1}{2t^3} (e^t - 1)[te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M''_X(t) &= -\frac{3}{2t^4} (e^t - 1)[te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1] \\
&\quad + \frac{1}{2t^3} (e^t)[te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1] \\
&\quad + \frac{1}{2t^3} (e^t - 1)[e^t(t + 1) + 2e^{2t}(3t - 2) + e^{2t}(3)] \\
&= \frac{1}{2t^4} \{(te^t - 3e^t + 3)[te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1] \\
&\quad + t(e^t - 1)[e^t(t + 1) + 2e^{2t}(3t - 2) + 3e^{2t}]\} \\
&= \frac{1}{2t^4} \{[e^t(t - 3) + 3][te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1] \\
&\quad + t(e^t - 1)[e^t(t + 1) + e^{2t}(6t - 1)]\} \\
&= \frac{1}{2t^4} \{[e^t(t - 3) + 3][te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1] \\
&\quad + te^t(e^t - 1)[t + 1 + e^t(6t - 1)]\} \\
&= \frac{1}{2t^4} \{[e^t(t - 3) + 3][e^t(t + e^t(3t - 2)) + 1] \\
&\quad + te^t(e^t - 1)[t + 1 + e^t(6t - 1)]\}
\end{aligned}$$

$$E(X) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_X(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{(e^t - 1)[te^t + e^{2t}(3t - 2) + 1]}{2t^3} \right] = -\infty$$

3. Suponha que X tenha a seguinte fdp:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)}, \quad x \geq a.$$

(Esta é conhecida como distribuição exponencial a dois parâmetros.)

a. Determine a fgm de X .

$$\begin{aligned}
M_X(t) &= E(e^{xt}) = \lambda e^{\lambda a} \int_a^{\infty} e^{xt} e^{-\lambda x} dx = \lambda e^{\lambda a} \int_a^{\infty} e^{-x(t-\lambda)} dx \\
&= \frac{\lambda e^{\lambda a}}{-(t-\lambda)} \int_a^{\infty} e^{-x(t-\lambda)} [-(t-\lambda) dx] = \frac{\lambda e^{\lambda a}}{-(t-\lambda)} e^{-x(t-\lambda)} \Big|_a^{\infty} \\
&= \frac{\lambda e^{\lambda a} e^{-a(\lambda-t)}}{\lambda-t} = \frac{\lambda e^{ta}}{\lambda-t}
\end{aligned}$$

b. Empregando a fgm, ache $E(X)$ e $V(X)$.

$$M'_x(t) = \frac{\lambda a e^{ta}(\lambda-t) + \lambda e^{ta}}{(\lambda-t)^2} = \frac{\lambda e^{ta}[a(\lambda-t) + 1]}{(\lambda-t)^2} = \frac{\lambda a e^{ta}}{(\lambda-t)} + \frac{\lambda e^{ta}}{(\lambda-t)^2}$$

$$\begin{aligned}
M''_x(t) &= \frac{\lambda a^2 e^{ta}(\lambda-t) + \lambda a e^{ta}}{(\lambda-t)^2} + \frac{\lambda a e^{ta}(\lambda-t)^2 + 2\lambda e^{ta}(\lambda-t)}{(\lambda-t)^4} \\
&= \frac{\lambda a^2 e^{ta}(\lambda-t)}{(\lambda-t)^2} + \frac{\lambda a e^{ta}}{(\lambda-t)^2} + \frac{\lambda a e^{ta}(\lambda-t)^2}{(\lambda-t)^4} + \frac{2\lambda e^{ta}(\lambda-t)}{(\lambda-t)^4} \\
&= \frac{\lambda a^2 e^{ta}}{(\lambda-t)} + 2 \frac{\lambda a e^{ta}}{(\lambda-t)^2} + \frac{2\lambda e^{ta}}{(\lambda-t)^3} \\
&= \frac{\lambda e^{ta}}{(\lambda-t)^3} (2 + a(\lambda-t)(a(\lambda-t) + 2))
\end{aligned}$$

$$E(X) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda e^{ta}[a(\lambda-t) + 1]}{(\lambda-t)^2} = \frac{\lambda a \lambda + \lambda}{\lambda^2} = \frac{\lambda a + 1}{\lambda}$$

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= \lim_{t \rightarrow 0} M''_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda e^{ta}}{(\lambda-t)^3} (2 + a(\lambda-t)(a(\lambda-t) + 2)) \\
&= \frac{2 + \lambda a(\lambda a + 2)}{\lambda^2} = \frac{\lambda^2 a^2 + 2\lambda a + 2}{\lambda^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V(X) &= E(X^2) - E^2(X) = \frac{\lambda^2 a^2 + 2\lambda a + 2}{\lambda^2} - \left(\frac{\lambda a + 1}{\lambda}\right)^2 \\
&= \frac{\lambda^2 a^2 + 2\lambda a + 2}{\lambda^2} - \frac{\lambda^2 a^2 + 2\lambda a + 1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}
\end{aligned}$$

4. Seja X o resultado da jogada de uma moeda equilibrada.

a. Determine a fgm de X .

$$P(X = x) = \frac{1}{2}, \quad x = 0, 1$$

$$M_X(t) = E(e^{xt}) = \sum_{k=0}^1 e^{kt} P(X = x) = \frac{1 + e^t}{2}$$

Se fosse um dado então

$$P(X = x) = \frac{1}{6}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$M_X(t) = E(e^{Xt}) = \sum_{k=1}^6 e^{kt} P(X = x) = \frac{1}{6}(e^t + e^{2t} + e^{3t} + e^{4t} + e^{5t} + e^{6t})$$

b. Empregando a fgm, ache $E(X)$ e $V(X)$.

$$M'_x(t) = \frac{e^t}{2}, \quad M''_x(t) = \frac{e^t}{2}$$

$$E(X) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{2} = \frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = \lim_{t \rightarrow 0} M''_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{2} = \frac{1}{2}$$

$$V(X) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Se fosse um dado então

$$M'_x(t) = \frac{1}{6}(e^t + 2e^{2t} + 3e^{3t} + 4e^{4t} + 5e^{5t} + 6e^{6t})$$

$$M''_x(t) = \frac{1}{6}(e^t + 4e^{2t} + 9e^{3t} + 16e^{4t} + 25e^{5t} + 36e^{6t})$$

$$E(X) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{6}(e^t + 2e^{2t} + 3e^{3t} + 4e^{4t} + 5e^{5t} + 6e^{6t}) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

$$E(X^2) = \lim_{t \rightarrow 0} M''_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{6}(e^t + 4e^{2t} + 9e^{3t} + 16e^{4t} + 25e^{5t} + 36e^{6t}) = \frac{91}{6}$$

$$V(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{364 - 147}{24} = \frac{364 - 147}{24} = \frac{217}{24}$$

5. Determine a fgm da variável aleatória X do Probl. 6.7. Empregando a fgm, ache $E(X)$ e $V(X)$.

$$g(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 < x \leq 2, \\ -x + 3, & 2 < x < 3 \\ 0, & c.c \end{cases}$$

$$\begin{aligned} M_X(t) = E(e^{xt}) &= \int_1^2 e^{xt}(x-1)dx + \int_2^3 e^{xt}(3-x)dx \\ &= \frac{e^t(e^t(t-1)+1)}{t^2} + \frac{e^{2t}(e^t-t-1)}{t^2} = \frac{e^t}{t^2}[1+e^{2t}-2e^t] \\ &= \frac{e^t}{t^2}(e^t(e^t-2)+1) = \frac{e^t}{t^2}(e^t-1)^2 \end{aligned}$$

$$M'_x(t) = \frac{t^2 e^t - 2te^t}{t^4} (e^t - 1)^2 + \frac{e^t}{t^2} 2(e^t - 1)e^t = \frac{e^t(e^t - 1)}{t^3} (e^t(3t - 2) - t + 2)$$

$$\begin{aligned} M''_x(t) &= \frac{(e^t(e^t - 1) + e^t(e^t))}{t^6} t^3 - 3t^2 e^t(e^t - 1) (e^t(3t - 2) - t + 2) \\ &\quad + \frac{e^t(e^t - 1)}{t^3} (e^t(3t - 2) + 3e^t - 1) \\ &= \frac{e^t}{t^4} (t^2 + 3e^{2t}(3t^2 - 4t + 2) - 4e^t(2t^2 - 4t + 3) - 4t + 6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \lim_{t \rightarrow 0} M'_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t(e^t - 1)}{t^3} (e^t(3t - 2) - t + 2) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{27(3t + 1)e^{3t} - 16(2t + 1)e^{2t} + (t + 1)e^t}{6} = \frac{27 - 16 + 1}{6} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \lim_{t \rightarrow 0} M''_x(t) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{t^4} (t^2 + 3e^{2t}(3t^2 - 4t + 2) - 4e^t(2t^2 - 4t + 3) - 4t + 6) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{81(9t^2 + 12t + 2)e^{3t} - 64(2t^2 + 4t + 1)e^{2t} + (t^2 + 4t + 2)e^t}{24} = \frac{25}{6} \end{aligned}$$

$$V(X) = \frac{25}{6} - 4 = \frac{1}{6}$$

6. Suponha que a variável aleatória X tenha fdp

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

a. Ache a fgm de X .

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{xt}) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{xt} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^{-x(t-1)} dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x(t+1)} dx \\ &= \frac{1}{1-t^2}, \quad -1 < t < 1 \end{aligned}$$

b. Empregando a fgm, ache $E(X)$ e $V(X)$.

$$M'_x(t) = \frac{2t}{(t^2 - 1)^2}$$

$$M''_x(t) = -2 \frac{3t^2 + 1}{(t^2 - 1)^3}$$

$$E(X) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{(t^2 - 1)^2} = 0$$

$$E(X^2) = \lim_{t \rightarrow 0} M''_x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} -2 \frac{3t^2 + 1}{(t^2 - 1)^3} = 2$$

$$V(X) = 2$$

7. Empregue a fgm para mostrar que, se X e Y forem variáveis aleatórias independentes, com distribuição $N(\mu_x, \sigma_x^2)$ e $N(\mu_y, \sigma_y^2)$, respectivamente, então $Z = aX + bY$ será também normalmente distribuída, onde a e b são constantes.

$$M_X(t) = \exp\left(t\mu_x + \frac{\sigma_x^2 t^2}{2}\right), \quad M_Y(t) = \exp\left(t\mu_y + \frac{\sigma_y^2 t^2}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= M_X(t)M_Y(t) = \exp\left(t\mu_x + \frac{\sigma_x^2 t^2}{2}\right) \exp\left(t\mu_y + \frac{\sigma_y^2 t^2}{2}\right) \\ &= \exp\left[t(\mu_x + \mu_y) + \frac{t^2}{2}(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)\right] \end{aligned}$$

$$E(Z) = \mu_x + \mu_y, \quad V(Z) = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 \therefore Z \sim N(\mu_x + \mu_y, \sigma_x^2 + \sigma_y^2)$$

8. Suponha que a fgm da variável aleatória X seja da forma

$$M_X(t) = (0,4e^t + 0,6)^8.$$

- a. Qual será a fgm da variável aleatória $Y = 3X + 2$?

$$M_Y(t) = e^{2t} M_X(3t) = e^{2t} (0,4e^{3t} + 0,6)^8$$

- b. Calcule $E(X)$.

$$M'_X(t) = 3,2e^t (0,4e^t + 0,6)^7$$

$$E(X) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_X(t) = \lim_{t \rightarrow 0} 3,2e^t (0,4e^t + 0,6)^7 = 3,2$$

- c. Você poderá verificar sua resposta a (b), por algum outro método? [Tente “reconhecer” $M_X(t)$.]

$M_X(t)$ é a fgm de uma distribuição binomial com $n = 8$, $p = 0,4$.

$$E(X) = np = 8(0,4) = 3,2$$

9. Alguns resistores, R_i , $i = 1, 2, \dots, n$, são montados em série em um circuito. Suponha que a resistência de cada um seja normalmente distribuída, com $E(R_i) = 10 \text{ ohms}$ e $V(R_i) = 0,16$.

- a. Se $n = 5$, qual será a probabilidade de que a resistência do circuito exceda 49 ohms ?

$$R = \sum_{i=1}^5 R_i, \quad E(R) = 50, \quad V(R) = 0,8$$

$$P(R > 49) = P\left(Y > \frac{49 - 50}{\sqrt{0,8}}\right) \cong P(Y > -1,12) = \Phi(1,12) = 0,8686$$

- b. Para que se tenha aproximadamente igual a 0,05 a probabilidade de que a resistência total exceda 100 ohms , que valor deverá ter n ?

$$P(R > 100) = P\left(Y > \frac{100 - 10n}{\sqrt{0,16n}}\right) = \Phi\left(\frac{10n - 100}{\sqrt{0,16n}}\right) \cong 0,05 \therefore$$

$$\frac{10n - 100}{\sqrt{0,16n}} \cong -1,645 \equiv 10n + 0,658\sqrt{n} - 100 \cong 0 \therefore$$

$$\sqrt{n} = \frac{-0,658 \pm \sqrt{(0,658)^2 - 4 \cdot 10(-100)}}{2 \cdot 10} \cong \begin{cases} 3,12955 \\ -3,19535 \equiv \emptyset \end{cases}$$

$$n \cong (3,12955)^2 \cong 9,79$$

$$n = \begin{cases} 9 \rightarrow P(R > 100) = P\left(Y > \frac{100 - 90}{1,2}\right) = \Phi(-8,333) \cong 0 \\ 10 \rightarrow P(R > 100) = P\left(Y > \frac{100 - 100}{\sqrt{1,6}}\right) = \Phi(0) \cong 0,5 \end{cases}$$

$n = 9$ é mais adequado.

10. Em um circuito, n resistores são montados em série. Suponha que a resistência de cada um seja uniformemente distribuída sobre $[0, 1]$ e suponha, também, que todas as resistências sejam independentes. Seja R a resistência total.

- a. Estabeleça a fgm de R .

$$f(r_i) = 1, \quad 0 \leq r_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$M_{R_i}(t) = \int_0^1 e^{r_i t} dr_i = \frac{e^t - 1}{t}$$

$$M_R(t) = \prod_{i=1}^n M_{R_i}(t) = \left(\frac{e^t - 1}{t}\right)^n$$

- b. Empregando a fgm, obtenha $E(R)$ e $V(R)$. Confirme suas respostas pelo cálculo direto.

$$M'_R(t) = n \left(\frac{e^t - 1}{t}\right)^{n-1} \left(\frac{te^t - e^t + 1}{t^2}\right)$$

$$M''_R(t) = n \left(\frac{e^t - 1}{t}\right)^n \left(\frac{e^{2t}(n(t-1)^2 + 1) - e^t(2n(1-t) + t^2 + 2) + n + 1}{(e^t - 1)^2 t^2}\right)$$

$$E(R) = \lim_{t \rightarrow 0} M'_R(t) = \lim_{t \rightarrow 0} n \left(\frac{e^t - 1}{t}\right)^{n-1} \left(\frac{te^t - e^t + 1}{t^2}\right) = \frac{n}{2}$$

$$\begin{aligned}
E(R^2) &= \lim_{t \rightarrow 0} M_R''(t) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} n \left(\frac{e^t - 1}{t} \right)^n \left(\frac{e^{2t}(n(t-1)^2 + 1) - e^t(2n(1-t) + t^2 + 2) + n + 1}{(e^t - 1)^2 t^2} \right) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} n \left(\frac{e^t - 1}{t} \right)^n \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(16nt^2 + 32nt + 16)e^{2t} + (-t^2 + (2n-8)t + 6n-14)e^t}{(16t^2 + 64t + 48)e^{2t} - (2t^2 + 16t + 24)e^t} \Big|_{f^{nv}} \\
&= \frac{3n^2 + n}{12} = \frac{n^2}{4} + \frac{n}{12} \\
V(R) &= \frac{3n^2 + n}{12} - \frac{n^2}{4} = \frac{n}{12} \\
E(R) &= E \left(\sum_{i=1}^n R_i \right) = nE(R_i) = \frac{n}{2} \\
V(R) &= V \left(\sum_{i=1}^n R_i \right) = n^2 V(R_i) = \frac{n^2}{12} \\
E(R_i^2) &= \int_0^1 r_i^2 dr_i = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

11. Se X tiver distribuição de X_n^2 , empregando a fgm, mostre que $E(X) = n$ e $V(X) = 2n$.

$$M_X(t) = (1 - 2t)^{-\frac{n}{2}}$$

$$M_X'(t) = n(1 - 2t)^{-\frac{1}{2}(n+2)}$$

$$M_X''(t) = n(n+2)(1 - 2t)^{-\frac{1}{2}(n+4)}$$

$$E(X) = M_X'(0) = n, \quad E(X^2) = M_X''(0) = n(n+2)$$

$$V(X) = n(n+2) - n^2 = 2n$$

12. Suponha que V , a velocidade (cm/seg) de um objeto, tenha distribuição $N(0, 4)$. Se $K = mV^2/2$ ergs for a energia cinética do objeto (onde $m = massa$), determine a fdp de K . Se $m = 10$ gramas, calcule $P(K \leq 3)$.

$$W = \frac{V}{2} \rightarrow W \sim N(0, 1)$$

$$K = \frac{mV^2}{2} = 2mW^2 \therefore$$

$$\begin{aligned}
G(k) &= P(K \leq k) = P(2mW^2 \leq k) = P\left(-\sqrt{\frac{k}{2m}} \leq W \leq \sqrt{\frac{k}{2m}}\right) \\
&= F\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) - F\left(-\sqrt{\frac{k}{2m}}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
g(k) = G'(k) &= \frac{d}{dk} F\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) - \frac{d}{dk} F\left(-\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) \\
&= f\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) \frac{d}{dk} \left(\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) - f\left(-\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) \frac{d}{dk} \left(-\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{k}} \left[\varphi\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) + \varphi\left(-\sqrt{\frac{k}{2m}}\right) \right] \\
&= \sqrt{\frac{m}{2k}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{-\frac{\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}\right)^2}{2}} + e^{-\frac{\left(-\sqrt{\frac{k}{2m}}\right)^2}{2}} \right] = 2 \sqrt{\frac{m}{4\pi k}} e^{-\frac{k}{40}} = \sqrt{\frac{m}{\pi k}} e^{-\frac{k}{40}}, \\
&\quad k > 0
\end{aligned}$$

$$g(k|m=10) = \sqrt{\frac{10}{\pi k}} e^{-\frac{k}{40}}$$

$$P(K \leq 3) = P(2mW^2 \leq 3) = P\left(W^2 \leq \frac{3}{20}\right) = 0,3015$$

13. Suponha que a duração da vida de uma peça seja exponencialmente distribuída, com parâmetro 0,5. Suponha que 10 dessas peças sejam instaladas sucessivamente, de modo que a i -ésima peça seja instalada “imediatamente” depois que a peça de ordem $(i-1)$ tenha falhado. Seja T_i a duração até falhar a i -ésima peça, $i = 1, 2, \dots, 10$, sempre medida a partir do instante de instalação. Portanto, $S = T_1 + \dots + T_{10}$ representa o tempo total de funcionamento das 10 peças. Admitindo que os T_i sejam independentes, calcule $P(S \geq 15,5)$.

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0$$

$$T_i \sim \text{Exp}(\alpha) \rightarrow S = T_1 + \dots + T_r \sim \Gamma(\alpha; r)$$

$$T_i \sim \text{Exp}(0,5) \rightarrow S = T_1 + \dots + T_{10} \sim \Gamma(0,5; 10)$$

$$P(S \geq 15,5) = \sum_{k=0}^9 e^{-(0,5)(15,5)} \frac{((0,5)(15,5))^k}{k!} = 0,7471$$

14. Suponha que X_1, \dots, X_{80} sejam variáveis aleatórias independentes, cada uma tendo distribuição $N(0, 1)$. Calcule $P[X_1^2 + \dots + X_{80}^2 > 77]$. [Sugestão: Empregue o Teor. 9.2]

Teorema 10.8

$$X_i \sim N(0, 1) \rightarrow S = X_1^2 + \dots + X_{80}^2 \sim \chi_{80}^2 \therefore$$

$$P[X_1^2 + \dots + X_{80}^2 > 77] = P[S > 77] = 0,5743$$

Teorema 9.2

$$n \sim \infty \rightarrow \sqrt{2S} \approx N(\sqrt{2n-1}, 1) \therefore$$

$$P[S > 77] = P[\sqrt{2S} > \sqrt{154}] = P\left[Y > \sqrt{154} - \sqrt{2(80) - 1}\right] = \Phi(\sqrt{159} - \sqrt{154}) \\ \cong \Phi(0,2) \cong 0,5793$$

15. Mostre que se $X_i, i = 1, 2, \dots, k$, representar o número de sucessos em n_i repetições de um experimento, o qual $P(\text{sucesso}) = p$, para todo i , então $X_1 + \dots + X_k$ terá uma distribuição binomial. (Isto é, a distribuição binomial possui a propriedade aditiva.)

$$X = X_1 + \dots + X_k \therefore$$

$$M_X(t) = M_{X_1}(t) \dots M_{X_k}(t) = [pe^t + q]^n \dots [pe^t + q]^n = [pe^t + q]^{nk} \therefore$$

$$X \sim B(nk, p)$$

16. (Distribuições de Poisson e Multinomial.) Suponha que $X_i, i = 1, 2, \dots, n$, sejam variáveis aleatórias independentes com distribuição de Poisson, com parâmetros $\alpha_i, i = 1, \dots, n$. Faça $X = \sum_{i=1}^n X_i$. Nesse caso, a distribuição de probabilidade conjunta de X_1, \dots, X_n , dado $X = x$, é dada por uma distribuição multinomial. Isto é,

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n | X = x) = \frac{x!}{x_1! \dots x_n!} \left(\frac{\alpha_1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}\right)^{x_1} \dots \left(\frac{\alpha_n}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}\right)^{x_n}.$$

Observando a definição da distribuição multinomial, verificamos que basta provar que

$$p_j = \frac{\alpha_j}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$$

$$p_j = \frac{\text{eventos favoráveis à } j}{\text{eventos totais}} = \frac{x_j}{x} = \frac{nE(X_j)}{nE(X)} = \frac{E(X_j)}{E(X)} = \frac{\alpha_j}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} \therefore$$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n | X = x) = \frac{x!}{\prod_{i=1}^n x_i!} \prod_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha}\right)^{x_i}, \quad \alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i \blacksquare$$

17. Estabeleça a fgm de uma variável aleatória que tenha distribuição geométrica. Essa distribuição possui a propriedade aditiva?

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{x=1}^{\infty} e^{tx} (1-p)^x p = p \sum_{x=1}^{\infty} [e^t(1-p)]^x = \frac{pe^t(1-p)}{1 - e^t(1-p)}$$

$$M_Z(t) = M_X(t)M_Y(t) = E(e^{tX})E(e^{tY}) = \left[\frac{pe^t(1-p)}{1 - e^t(1-p)}\right]^2 \therefore$$

Não possui a propriedade aditiva.

18. Se a variável aleatória X tiver uma fgm dada por $M_X(t) = 3/(3-t)$, qual será o desvio-padrão de X ?

$$\sigma = \sqrt{V(X)} = \sqrt{M_X''(0) - [M_X'(0)]^2}$$

$$M_X'(t) = \frac{3}{(3-t)^2}, \quad M_X''(t) = \frac{6}{(3-t)^3}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{6}{(3-0)^3} - \left[\frac{3}{(3-0)^2}\right]^2} = \frac{1}{3}$$

19. Estabeleça a fgm de uma variável aleatória que seja uniformemente distribuída sobre $(-1, 2)$.

$$f(x) = \frac{1}{3}, \quad -1 < x < 2$$

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 e^{tx} = \frac{1}{3} \left[\frac{e^{tx}}{t} \right]_{-1}^2 = \frac{e^{3t} - 1}{3te^t}$$

20. Um determinado processo industrial produz grande número de cilindros de aço, cujos comprimentos são distribuídos, normalmente, com média 3,25 polegadas e desvio-padrão 0,05 polegadas. Se dois desses cilindros forem escolhidos ao acaso e dispostos um em continuação ao outro, qual será a probabilidade de que seu comprimento combinado seja menor do que 6,60 polegadas?

$$X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2), Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2) \rightarrow Z = X + Y \sim N(\mu_x + \mu_y, \sigma_x^2 + \sigma_y^2) \therefore$$

$$Z \sim N(6,5; 0,005)$$

$$P(Z < 6,6) = P\left(W < \frac{6,6 - 6,5}{\sqrt{0,005}}\right) = \Phi(\sqrt{2}) = 0,9207$$

Comentário: Ao calcular $M_X'(t)$, para $t = 0$, pode surgir uma forma indeterminada. Assim, $M_X'(0)$ pode ser da forma $0/0$. Nesse caso, deveremos tentar aplicar a regra de L'Hôpital.

Por exemplo, se X for uniformemente distribuída sobre $[0, 1]$, nós facilmente encontraremos que $M_X(t) = (e^t - 1)/t$ e $M_X'(t) = (te^t - e^t + 1)/t^2$.

Consequentemente, em $t = 0$, $M_X'(t)$ é indeterminada.

Aplicando a regra de L'Hôpital, encontraremos que

$$\lim_{t \rightarrow 0} M_X'(t) = \lim_{t \rightarrow 0} te^t/2t = 1/2.$$

Isto confirma que $M_X'(0) = E(X)$, que é igual a $1/2$ para a variável aleatória apresentada aqui.