Cirugía de Terceros Molares

1. ¿Cómo describiría el tratamiento brevemente a un paciente?

Los terceros molares, conocidos comúnmente como muelas del juicio, son los últimos dientes en la parte posterior de la boca y suelen aparecer entre la adolescencia y la adultez temprana. En algunos pacientes pueden desarrollarse y salir correctamente, pero en otros pueden quedar parcialmente retenidos, crecer en una posición inadecuada o no contar con suficiente espacio para erupcionar.

La cirugía de terceros molares consiste en la extracción de una o más muelas del juicio cuando su posición, desarrollo o condición puede ocasionar problemas o cuando el especialista determina que su extracción está indicada.

Antes del procedimiento se realiza una valoración clínica y estudios de imagen para conocer la posición de las piezas, su relación con estructuras cercanas y el grado de dificultad de la cirugía. Dependiendo de cada caso, la extracción puede ser sencilla o requerir un procedimiento quirúrgico.

El procedimiento se realiza con anestesia para controlar el dolor durante la cirugía. Posteriormente, el paciente recibe indicaciones específicas para favorecer una adecuada recuperación.

El objetivo es resolver o prevenir problemas asociados con terceros molares, como dolor, inflamación, infecciones, caries, daño a dientes vecinos o alteraciones en los tejidos que los rodean, cuando estos riesgos están presentes.

———

2. ¿Qué considera que diferencia o destaca la atención de CEDES en este tratamiento?

En CEDES CLÍNICA sabemos que la extracción de las muelas del juicio puede generar preocupación o miedo en algunos pacientes. Por ello, buscamos brindar una atención segura, personalizada y cercana, desde la valoración inicial hasta el seguimiento posterior.

Nuestra atención se enfoca en:

* Valoración individualizada: cada tercer molar tiene una posición y grado de dificultad diferente.

* Estudios de imagen: analizamos la posición de las piezas y su relación con estructuras anatómicas importantes para planificar el procedimiento.

* Planeación quirúrgica personalizada: determinamos el abordaje más adecuado de acuerdo con las características de cada caso.

* Control del dolor y ansiedad: utilizamos anestesia local y las medidas necesarias para procurar que el procedimiento sea lo más cómodo posible.

* Explicación clara del procedimiento: informamos al paciente sobre qué se realizará, qué puede esperar y cuáles son los cuidados posteriores.

* Seguimiento después de la cirugía: damos indicaciones específicas y acompañamos al paciente durante su recuperación.

* Enfoque preventivo: cuando existe riesgo de complicaciones futuras, la valoración permite determinar oportunamente si la extracción está indicada.

Nuestro objetivo es que el paciente se sienta informado, tranquilo y acompañado, procurando realizar el procedimiento con la mayor seguridad y precisión posible.

———

3. Preguntas o dudas más frecuentes de los pacientes

¿Todas las muelas del juicio deben extraerse?

No necesariamente. Algunas pueden permanecer en la boca sin causar problemas. La decisión depende de factores como su posición, espacio disponible, estado de la pieza, higiene, síntomas y posibles riesgos para los dientes o tejidos cercanos.

¿Cómo sé si necesito una cirugía de terceros molares?

Algunas señales pueden ser dolor, inflamación, dificultad para abrir la boca, infecciones recurrentes, mal sabor u olor, caries o molestias en la zona posterior. Sin embargo, una muela del juicio puede causar problemas incluso sin presentar síntomas, por lo que es importante realizar una valoración.

¿Duele la cirugía?

Durante el procedimiento se utiliza anestesia local para evitar dolor. Después de la cirugía es normal presentar cierto grado de inflamación, sensibilidad o molestia, especialmente durante los primeros días. El especialista indicará las medidas necesarias para controlar estas molestias.

¿Cuánto dura la cirugía?

El tiempo depende del número de terceros molares que se retirarán, su posición y el grado de dificultad. Una extracción sencilla puede ser relativamente rápida, mientras que un tercer molar retenido puede requerir más tiempo.

¿Puedo extraerme las cuatro muelas del juicio el mismo día?

En algunos pacientes es posible realizar la extracción de varias piezas en una misma cita, pero depende de la valoración, complejidad de cada tercer molar, estado de salud y planificación quirúrgica. El especialista determinará qué opción es la más adecuada.

¿Qué significa que una muela del juicio esté retenida o incluida?

Significa que la pieza no ha logrado salir completamente a la boca porque está bloqueada por hueso, encía, otro diente o por su propia posición. En estos casos puede ser necesario realizar una extracción quirúrgica.

¿Siempre se necesita una radiografía?

Los estudios de imagen son muy importantes para conocer la posición de los terceros molares y planificar la cirugía. Dependiendo del caso, el especialista puede solicitar una radiografía panorámica u otro estudio de imagen.

¿Qué puedo comer después de la cirugía?

Durante los primeros días se recomienda consumir alimentos suaves y de fácil masticación, evitando alimentos muy calientes, duros, crujientes o que puedan introducirse en la zona de extracción. Las indicaciones pueden variar según cada procedimiento.

¿Cuánto tiempo tarda la recuperación?

La recuperación varía entre pacientes y depende de la complejidad de la cirugía. La inflamación suele ser más evidente durante los primeros días y posteriormente comienza a disminuir. El especialista proporcionará indicaciones específicas y te informará cuándo es necesario acudir a revisión.

¿Puedo trabajar o estudiar después de la extracción?

Depende del tipo de cirugía y de las actividades que realice el paciente. Después de una cirugía compleja puede ser recomendable contar con un periodo de reposo. Se deben seguir las indicaciones específicas proporcionadas por el especialista.

¿Puedo hacer ejercicio después de la cirugía?

Generalmente se recomienda evitar ejercicio intenso durante los primeros días, ya que puede favorecer el sangrado o aumentar la inflamación. El momento adecuado para retomar las actividades dependerá de la evolución de cada paciente.

¿Qué cuidados debo tener después de la extracción?

Es importante seguir exactamente las indicaciones proporcionadas por el especialista. Entre ellas pueden incluirse mantener una higiene cuidadosa, evitar fumar, no manipular la zona de extracción y respetar las recomendaciones sobre alimentación y actividad física.

¿Puedo fumar después de la cirugía?

Se recomienda evitar fumar durante el periodo de recuperación, ya que puede interferir con la cicatrización y aumentar el riesgo de complicaciones, incluida la alveolitis.

¿Qué es la alveolitis?

Es una complicación que puede presentarse después de una extracción cuando el coágulo que protege el sitio de extracción se pierde o no se mantiene adecuadamente. Puede provocar dolor intenso y retrasar la recuperación. Seguir las indicaciones posteriores a la cirugía ayuda a disminuir este riesgo.

¿Es normal que se me hinche la cara?

Sí. La inflamación es una respuesta frecuente después de una cirugía de terceros molares, especialmente cuando la extracción es quirúrgica. Generalmente aumenta durante los primeros días y posteriormente comienza a disminuir.

¿Qué pasa si tengo mucho dolor después de la cirugía?

Es normal presentar cierta molestia, pero si el dolor es intenso, aumenta en lugar de mejorar, aparece fiebre, sangrado persistente, dificultad importante para abrir la boca o cualquier otro síntoma que genere preocupación, es importante comunicarse con la clínica para realizar una valoración.

¿Las muelas del juicio pueden dañar los dientes de al lado?

En determinados casos, sí. Una muela del juicio en una posición inadecuada puede favorecer la acumulación de alimentos y bacterias, producir caries o afectar el tejido y la estructura del segundo molar. Por eso es importante evaluar su posición y evolución.

¿Es necesario retirar una muela del juicio aunque no me duela?

No todas las muelas asintomáticas necesitan ser extraídas. Sin embargo, algunas pueden presentar riesgos aunque no causen dolor. La decisión debe basarse en la valoración clínica, estudios de imagen y características individuales del paciente.