

EAE1223: ECONOMETRIA III

AULA 7 - COINTEGRAÇÃO

Luis A. F. Alvarez

2 de maio de 2024

NATUREZA DA INFERÊNCIA ESPÚRIA

- Em algumas aulas atrás, vimos que a inferência baseada nos estimadores de MQO de um modelo linear de um processo $I(1)$ em outro processo $I(1)$, **completamente independentes**, gerava conclusões espúrias.
 - Relação verdadeira é 0, mas testes de hipótese proviam forte evidência contra hipótese de associação nula (p-valores baixíssimos).
- Uma pergunta que cabe é: se há dependência entre os processos $I(1)$, há condições sob as quais estimadores de MQO produzem inferência **não espúria**?

UM EXEMPLO

- Considere o seguinte processo bivariado :


$$x_t = x_{t-1} + u_t ,$$

$$y_t = \gamma x_t + v_t ,$$

onde $\{u_t\}_t$ e $\{v_t\}_t$ são ruídos brancos independentes uns dos outros.


- Observe que ambos os processos são $I(1)$
- Vamos considerar as propriedades do estimador de MQO $\hat{\gamma}$ de γ , sobre realizações repetidas da incerteza econômica:

UMA REALIZAÇÃO DO PROCESSO POR $T = 500$ PERÍODOS ($\gamma = 0.5$)



DISTRIBUIÇÃO DE $\hat{\gamma}$ EM REALIZAÇÕES REPETIDAS DA INCERTEZA ($T = 500$ E $\gamma = 0.5$)

Distribuição de $\hat{\gamma}$ em amostras repetidas



TENDÊNCIA ESTOCÁSTICA COMUM

- Note que o estimador de MQO tem distribuição convencional (normal) sobre realizações repetidas da incerteza.
- Isso ocorre mesmo com ambas as séries sendo $I(1)$.
- Por que isso ocorre?
 - Processos possuem tendência estocástica **comum**.
 - A tendência comum “amarra” o comportamento explosivo dos processos, recuperando a validade da aproximação normal.
 - A processos $I(1)$ com tendência estocástica comum, damos o nome de **processos cointegrados**.

COINTEGRAÇÃO

- Considere um processo vetorial $\{\mathbf{Z}_t\}_{t \in \mathbb{Z}}$ com n variáveis.
- Dizemos que o vetor é cointegrado (de ordem $(1,1)$), ou $CI(1,1)$, se:
 1. Cada uma das séries $\{Z_{jt}\}_{t \in \mathbb{Z}}$, $j = 1, \dots, n$, é $I(1)$.
 2. Existe um vetor $\gamma \in \mathbb{R}^n$, $\gamma \neq \mathbf{0}_{n \times 1}$, tal que $\gamma' \mathbf{Z}_t$, é $I(0)$.
- Se processo é $CI(1,1)$, existe combinação linear não trivial tal que processo resultante é estacionário.
 - Existe uma **relação de longo prazo**, fruto de uma tendência comum, amarrando os processos, de modo que desvios dessa relação são $I(0)$.
 - Note que a relação não é única, visto que sempre podemos multiplicá-la por uma constante não nula.
- De modo mais geral, um processo vetorial é dito cointegrado de ordem (d,b) , ou $CI(d,b)$, $0 < b \leq d$, se:
 - Cada uma das séries $\{Z_{jt}\}_{t \in \mathbb{Z}}$, $j = 1, \dots, n$, é $I(d)$.
 - Existe um vetor $\gamma \in \mathbb{R}^n$, $\gamma \neq 0$, tal que $\gamma' \mathbf{Z}_t$, é $I(d-b)$.
- Focaremos no caso $CI(1,1)$, que é o mais economicamente interessante.

COINTEGRAÇÃO E TEORIA ECONÔMICA

- O conceito de cointegração é de natureza estatística.
 - Não obstante, a evidência ou não de uma relação de longo prazo pode ter uma interpretação econômica.
- Considere uma medida dos preços praticados para uma cesta de bens no Brasil, em reais; uma outra medida, para cesta similar, dos preços praticados em dólares nos Estados Unidos, e a taxa de câmbio real/Estados Unidos.
 - Pela teoria da paridade do poder de compra, embora processos individualmente apresentem comportamento não estacionário (estocástico), deveria haver uma relação de cointegração entre estas variáveis.
- Se há neutralidade da moeda no longo prazo, não deveria haver relação de longo prazo entre produto real e base monetária real.

TESTANDO PELA PRESENÇA DE COINTEGRAÇÃO

- Engle e Granger (1987) popularizaram um procedimento bastante intuitivo para se testar a nula de **não cointegração**.
- Considere um processo vetorial $\mathbf{Z}_t = (y_t, \mathbf{x}_t)$ em que cada entrada é $I(1)$, e para o qual acreditamos que possa haver alguma relação de cointegração envolvendo y_t .
 - Para sistemas com duas variáveis (\mathbf{x}_t escalar), crença é sem perda de generalidade, visto que cointegração necessariamente envolve y_t .
 - Para sistemas com mais de duas variáveis, efetivamente nos restringimos a alternativas em que y_t participa da relação.
- Ideia de Engle e Granger (1987): estimar por MQO uma regressão de y_t em \mathbf{x}_t (e um intercepto):

$$y_t = \hat{\alpha} + \hat{\gamma}' \mathbf{x}_t + \hat{u}_t, \quad t = 1, \dots, T$$

e fazer um teste da nula de raiz unitária nos resíduos $\{\hat{u}_t\}_{t=1}^T$.

- Se não há cointegração, resíduos devem apresentar tendência estocástica.
- Se há cointegração envolvendo y_t , resíduos deveriam ser estacionários.

PROCEDIMENTO DE PHILLIPS E OULIARIS (1990)

- Teste não pode ser feito usando valores críticos convencionais, pois estimação preliminar afeta valores críticos.
 - Phillips e Ouliaris (1990) tabularam os valores críticos para as estatísticas do teste ADF e de Phillips e Perron (1988).
- Tabulação depende de existência de tendência linear no nível da série.
 - Se há somente tendência estocástica em nível, usar [Caso 2](#).
 - Se séries apresentam tendência estocástica, e ao menos uma das séries em \mathbf{x}_t apresentar tendência determinística linear em nível, usar [Caso 3](#).
 - Se séries apresentam tendência estocástica, nenhuma das séries em \mathbf{x}_t apresentar tendência determinística em nível, mas y_t apresentar tendência linear, há que se modificar o conceito de cointegração. Nesse caso, é impossível gerar combinação linear estacionária, mas ainda é possível gerar combinação linear *trend-stationary* (cointegração em torno de tendência determinística). Se quisermos testar isso, rodamos

$$y_t = \hat{\alpha} + \hat{\delta}t + \hat{\gamma}'\mathbf{x}_t + \hat{u}_t, \quad t = 1, \dots, T,$$

e usamos os valores críticos do [Caso 3](#), supondo que há $n + 1$ variáveis.

- Se sabemos que relação de cointegração tem média zero, podemos omitir o intercepto da regressão e considerando o [Caso 1](#).

VALORES CRÍTICOS

TABLE B.9

Critical Values for the Phillips Z_t Statistic or the Dickey-Fuller t Statistic When Applied to Residuals from Spurious Cointegrating Regression

Number of right-hand variables in regression, excluding trend or constant ($n - 1$)	Sample size (T)	Probability that $(\hat{\rho} - 1)/\hat{\sigma}_{\hat{\rho}}$ is less than entry						
		0.010	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
		Case 1						
1	500	-3.39	-3.05	-2.76	-2.58	-2.45	-2.35	-2.26
2	500	-3.84	-3.55	-3.27	-3.11	-2.99	-2.88	-2.79
3	500	-4.30	-3.99	-3.74	-3.57	-3.44	-3.35	-3.26
4	500	-4.67	-4.38	-4.13	-3.95	-3.81	-3.71	-3.61
5	500	-4.99	-4.67	-4.40	-4.25	-4.14	-4.04	-3.94
Case 2								
1	500	-3.96	-3.64	-3.37	-3.20	-3.07	-2.96	-2.86
2	500	-4.31	-4.02	-3.77	-3.58	-3.45	-3.35	-3.26
3	500	-4.73	-4.37	-4.11	-3.96	-3.83	-3.73	-3.65
4	500	-5.07	-4.71	-4.45	-4.29	-4.16	-4.05	-3.96
5	500	-5.28	-4.98	-4.71	-4.56	-4.43	-4.33	-4.24
Case 3								
1	500	-3.98	-3.68	-3.42	—	-3.13	—	—
2	500	-4.36	-4.07	-3.80	-3.65	-3.52	-3.42	-3.33
3	500	-4.65	-4.39	-4.16	-3.98	-3.84	-3.74	-3.66
4	500	-5.04	-4.77	-4.49	-4.32	-4.20	-4.08	-4.00
5	500	-5.36	-5.02	-4.74	-4.58	-4.46	-4.36	-4.28

The probability shown at the head of the column is the area in the left-hand tail.

Source: P. C. B. Phillips and S. Ouliaris, "Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration," *Econometrica* 58 (1990), p. 190. Also Wayne A. Fuller, *Introduction to Statistical Time Series*, Wiley, New York, 1976, p. 373.

O QUE O MQO ESTIMA SOB COINTEGRAÇÃO?

- Para um processo vetorial $\mathbf{Z}_t = (y_t, \mathbf{x}_t)$ n -variado cointegrado, há no mínimo uma, e no máximo $n - 1$ relações de cointegração linearmente independentes disponíveis.
 - Se houvesse n relações de cointegração, é possível mostrar que o processo na verdade seria estacionário.
- Sejam $\{(1, \mathbf{b}'_1)', (1, \mathbf{b}'_2)', \dots, (1, \mathbf{b}'_q)'\}$ as q relações linearmente independentes que envolvem y_t .
- Se $q > 0$, possível mostrar que estimador de MQO de y_t em \mathbf{x}_t e em um intercepto é consistente para o parâmetro $\gamma^* \in \text{span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_q\}$ do **melhor preditor linear de y_t em \mathbf{x}_t** definido de tal forma que:

$$y_t = \alpha^* + \mathbf{x}'_t \gamma^* + u_t$$

com u_t estacionário, $\mathbb{E}[u_t] = 0$ e $\text{cov}(\mathbf{x}_t, u_t) = \mathbf{0}$.

- Se $\text{cov}(\Delta \mathbf{x}_t, u_s) = \mathbf{0}$ para todo t e s , podemos realizar inferência sobre γ^* com base no estimador de MQO, erros padrão HAC e valores críticos normais.
- Se $q = 0$, inferência com base no MQO é espúria.

REFERÊNCIAS



Engle, Robert F. e C. W. J. Granger (1987). “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”. Em: *Econometrica* 55.2, pp. 251–276. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/1913236> (acesso em 02/05/2024).



Phillips, P. C. B. e S. Ouliaris (1990). “Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration”. Em: *Econometrica* 58.1, pp. 165–193. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/2938339> (acesso em 02/05/2024).



Phillips, Peter C. B. e Pierre Perron (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”. Em: *Biometrika* 75.2, pp. 335–346. ISSN: 00063444. URL: <http://www.jstor.org/stable/2336182> (acesso em 13/03/2024).