

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

AULA 2 – INTEGRAÇÃO E EXPECTATIVA

Luis A. F. Alvarez

19 de janeiro de 2025

INTEGRAL DE LEBESGUE

- Nesta aula, partiremos de um espaço de medida (Ω, Σ, μ) e definiremos, para uma função mensurável $f : \Omega \mapsto \mathbb{R}$, a integral de Lebesgue com respeito a μ .
 - Como veremos, essa noção de integral *estende* a noção de integral de Riemann para uma classe mais ampla de funções e espaços subjacentes.
 - Esse conceito de integral será fundamental para a definição formal de esperança condicional.

FUNÇÕES SIMPLES

- Seja (Ω, Σ, μ) um espaço de medida.
- Uma função $f : \Omega \mapsto \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ é dita simples se existem $k \in \mathbb{N}$ e $E_1, E_2, \dots, E_k \in \Sigma$, $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ tais que:

$$f(\omega) = \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{1}_{E_i}(\omega), \quad \omega \in \Omega$$

onde $\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \\ 0 & \text{se } \omega \notin A \end{cases}$ é a função indicadora do conjunto A .

- **Convenção:** se $\mathbf{1}_{E_i}(\omega) = 0$ e $a_i = \pm\infty$, então $\mathbf{1}_{E_i}(\omega)a_i = 0$
- Fácil ver que f é mensurável.
 - Também fácil ver que, sem perda de generalidade, podemos tomar os E_i como disjuntos.

INTEGRAL DE LEBESGUE DE FUNÇÕES SIMPLES NÃO NEGATIVAS

- Seja f uma função simples **não negativa**. A integral de Lebesgue com respeito a μ , denotada por $\mu(f)$ ou $\int f(\omega)\mu(d\omega)$ ou $\int f d\mu$, é definida por:

$$\int f(\omega)\mu(d\omega) := \sum_{i=1}^k a_i \mu(E_i).$$

- Fácil de ver que integral está bem-definida (para duas expressões distintas da função simples em termos de conjuntos finitos, expressão dará a mesma coisa).
- Integral será um elemento de $[0, \infty]$

INTEGRAL DE LEBESGUE DE FUNÇÕES MENSURÁVEIS NÃO NEGATIVAS

- Seja $f : \Omega \mapsto [0, \infty]$ uma função mensurável não negativa. Definimos a integral de Lebesgue como:

$$\mu(f) := \sup(\mu(g) : g \text{ simples e não negativa, } g \leq f).$$

LEMA

Seja $f \geq 0$ mensurável.

- Se $\mu(f) < \infty$, então, $\mu(\{\omega : f(\omega) = \infty\}) = 0$.
- Se $\mu(f) = 0$, então $\mu(\{\omega : f(\omega) > 0\}) = 0$.
- Seja $g \geq 0$ mensurável. Se $\mu(\{\omega : g(\omega) \neq f(\omega)\}) = 0$, então $\mu(f) = \mu(g)$.
- **Obs:** Quando uma afirmação é válida a não ser em um conjunto de pontos ω de medida zero, dizemos que ela vale em μ -quase todo ponto (μ -q.t.p.).
 - Se μ é medida de probabilidade, equivalente ao qualificador “quase certamente” visto em aula anterior.

TEOREMA DA COVERGÊNCIA MONÓTONA

- Seja $(f_n)_n$ uma sequência de funções mensuráveis. Dizemos que f_n converge a uma função f em μ -quase todo ponto se $\mu(\{\omega : f_n(\omega) \not\rightarrow f(\omega)\}) = 0$.
 - Medida do evento em que não há convergência é zero.
- Como f é mensurável (por quê?), se $f_n \geq 0$ para todo n , podemos nos perguntar se:

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu,$$

i.e. podemos passar o limite por “debaixo” da integral?

- Resposta é verdadeira se a convergência for **monótona** em μ -quase todo ponto, i.e. $\mu(\{\omega : f_n(\omega) \uparrow f(\omega)\}^c) = 0$.

TEOREMA

Seja $(f_n)_n$ uma sequência de funções não negativas mensuráveis tais que $f_n \uparrow f$ em μ -quase todo ponto. Então.

$$\mu(f_n) \uparrow \mu(f) \leq \infty$$

CONSTRUINDO APROXIMAÇÃO MONOTÔNICAS

- Em alguns contextos, é interessante construir funções monotônicas que aproximam uma dada função não negativa f .
- Uma construção bastante comum é dada por $f_n = s_n \circ f$, onde s_n são funções escada da forma:

$$s_n(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y = 0 \\ \frac{(j-1)n}{2^n}, & \text{se } y \in \left(\frac{(j-1)n}{2^n}, \frac{jn}{2^n} \right], j \in \{1, \dots, 2^n\} \\ n, & \text{se } y > n \end{cases}$$

- Sequência é tal que $f_n \uparrow f$.

INTEGRAL DE LEBESGUE NO CASO GERAL

- Seja $f : \Omega \mapsto \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ uma função mensurável. Defina as partes positiva e negativa de f como:

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \quad f^- = -\min\{f, 0\},$$

- Dizemos que f é **integrável** se $\mu(|f|) = \mu(f^+) + \mu(f^-) < \infty$. Nesse caso, a integral de f é definida como:

$$\mu(f) = \mu(f^+) - \mu(f^-)$$

- Vamos denotar por $L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ o espaço de funções Lebesgue-integráveis.

INTEGRAL DE LEBESGUE: PROPRIEDADES

PROPOSIÇÃO

Sejam $f, g \in L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Temos que:

- 1 (Monotonicidade) $f \leq g \implies \mu(f) \leq \mu(g)$
- 2 (Linearidade) $f + \lambda g \in L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ e $\mu(f + \lambda g) = \mu(f) + \lambda \mu(g)$.

PROPOSIÇÃO

Seja $(f_n)_n$ uma sequência de funções em $L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$, tais que $f_n \rightarrow f$ em μ -q.t.p. Se existe $g \geq$ mensurável tal que $\mu(g) < \infty$ e:

$$|f_n(\omega)| \leq g(\omega) \forall n \in \mathbb{N}, \omega \in \Omega,$$

então $f \in L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ e:

$$\mu(|f_n - f|) \rightarrow 0,$$

$$\mu(f_n) \rightarrow \mu(f)$$

INTEGRAL DE LEBESGUE E INTEGRAL DE RIEMANN

- Considere o espaço $([0, 1], \mathcal{B}[0, 1], \lambda)$, com λ a medida de Lebesgue.
- Nesse espaço, podemos tanto calcular a integral de Lebesgue $\int f(x)\lambda(dx)$ como a integral de Riemann:

$$\int_0^1 f(x)dx$$

- Qual a relação entre as duas integrais?

PROPOSIÇÃO

Seja $f \geq$ uma função real com domínio em $[0, 1]$ Riemann integrável. Então f é mensurável e $\lambda(f) = \int_0^1 f(x)dx$.

- A recíproca do resultado acima nem sempre verdadeira. Por exemplo, a função

$$\mathbf{1}_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}},$$

não é Riemann-integrável, embora $\lambda(\mathbf{1}_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}) = 0$.

DENSIDADE COM RESPEITO A UMA MEDIDA

- Seja (Ω, Σ, μ) um espaço de medida, e $f \geq 0$ uma função mensurável.
- O conjunto de integrais:

$$\int_A f d\mu := \mu(f \mathbf{1}_A), A \in \Sigma$$

define uma medida sobre (Ω, Σ) (verifique).

- Reciprocamente, se Φ é uma medida sobre (Ω, Σ, μ) , dizemos que Φ admite uma densidade com respeito a μ se existe $g \geq 0$ mensurável tal que, para todo $A \in \Sigma$:

$$\Phi(A) = \int_A g d\mu$$

- Condição necessária e suficiente para existência de densidade é dada pelo teorema de Radon-Nikodyn.

TEOREMA

Seja (Ω, Σ) um espaço mensurável, e μ e Φ duas medidas σ -finitas. Φ admite uma densidade com respeito a μ se, e somente se, para todo $A \in \Sigma$, $\mu(A) \implies \Phi(A)$.

DENSIDADE E UMA FÓRMULA PADRÃO

LEMA

Seja (Ω, Σ) um espaço mensurável, e μ e Φ duas medidas. Se Φ admite densidade g com respeito a μ , então para qualquer $h \in L^1(\Omega, \Sigma, \Phi)$, temos que:

$$\Phi(f) = \int h(\omega)g(\omega)\mu(d\omega)$$

- Fórmula acima nos permite calcular esperança diretamente da integral com respeito a μ .
- **Demonstração:** primeiro verificamos a expressão para funções simples, depois para funções não negativas usando uma aproximação por funções-escada, e por fim estendemos para funções gerais.

ESPERANÇA

- Seja $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ espaço de probabilidade.
- Neste caso, damos à integral de Lebesgue o nome de expectativa ou esperança, denotando-a, para $X \in L^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ por:

$$\mathbb{E}[X] := \mathbb{P}(X)$$

- .
- Como uma medida de probabilidade é finita, um corolário imediato do teorema da convergência dominada é:

COROLÁRIO (TEOREMA DA CONVERGÊNCIA LIMITADA)

Seja $(X_n)_n \in L^1(\Sigma, \Omega, \mathbb{P})^{\mathbb{N}}$ tais que $X_n \rightarrow X$ quase certamente. Se existe $K > 0$ tal que:

$$\mathbb{P}[\{\omega : |X_n(\omega)| \leq K, \forall n\}] = 1,$$

então $X \in L^1(\Sigma, \Omega, \mathbb{P})$ e: $\mathbb{E}[X_n] \rightarrow \mathbb{E}[X]$

ESPERANÇA: DESIGUALDADES FUNDAMENTAIS

- No que segue, considere um espaço de probabilidade $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.

LEMA

Desigualdade de Markov Seja Z uma variável aleatória, e $g : \mathbb{R} \mapsto [0, \infty]$ mensurável e não decrescente. Então, para todo $c \in \mathbb{R}$.

$$\mathbb{P}[Z \geq c]g(c) \leq \mathbb{E}[g(Z)]$$

LEMA

Desigualdade de Jensen Seja X uma variável aleatória, e $c : C \mapsto \mathbb{R}$ uma função convexa onde $C \subseteq \mathbb{R}$ é um conjunto aberto. Suponha que:

$$\mathbb{E}[|X|] < \infty, \quad \mathbb{P}[X \in C] = 1, \quad \mathbb{E}[|c(X)|] < \infty,$$

então $\mathbb{E}[X] \in C$ e:

$$c(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[c(X)].$$

A NORMA L^p

- Fixe $p \in [1, \infty]$. Para uma variável aleatória X , nós definimos:

$$\|X\|_p = (\mathbb{E}[|X|^p])^{1/p}$$

- Denotamos por $L^p(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ o espaço de variáveis aleatórias $X \in m(\Sigma)$ tais que $\|X\|_p < \infty$.
- É possível mostrar que esse espaço é linear normado, com $\|\cdot\|_p$ definindo uma (semi)norma em $L^p(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.
 - “Semi” vem do fato de que $\|X\|_p = 0 \implies \mathbb{P}[X = 0] = 1$, de modo que há múltiplas variáveis aleatórias com norma zero, embora todas-quase certamente iguais a zero.
 - Essa multiplicidade não é problemática.

NORMAS L_p : PROPRIEDADES ÚTEIS

- Abaixo, elencamos algumas propriedades úteis das normas L_p .

LEMA

1. (Monotonicidade) Sejam $1 \leq p \leq q$. Se $X \in L^q(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, então $X \in L^p(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ e $\|X\|_p \leq \|X\|_q$.
2. (Cauchy-Schwarz) sejam $X, Y \in L^2(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$. Então $X \cdot Y \in L^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ e :

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \mathbb{E}[|XY|] \leq \|X\|_2 \|Y\|_2.$$

3. (Hölder) Seja $1 \leq p \leq q \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Sejam $X \in L^p(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ e $Y \in L^q(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$. Então $X \cdot Y \in L^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ e:

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \mathbb{E}[|XY|] \leq \|X\|_p \|Y\|_q.$$

4. (Minkowski) Seja $p \geq 1$, e $X, Y \in L^p(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, então:

$$\|X + Y\|_p \leq \|X\|_p + \|Y\|_p$$

- Cauchy-Schwarz é caso particular de Hölder.
- Minkowski garante desigualdade triangular (e que $\|\cdot\|_p$ é norma)