



Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias  
Universidad Autónoma de Madrid

# Redes Neuronales: aproximación de EDPs

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Grado en Matemáticas

*Autor:* Luis Hebrero Garicano

*Tutor:* Julia Novo

Curso 2024-2025



## Resumen

Las redes neuronales son un modelo matemático inspirado en el funcionamiento cerebral que, en esencia, se utiliza para encontrar funciones: funciones que clasifican datos, que predicen valores o incluso que anticipan la siguiente palabra en una frase. En este trabajo, se estudiará cómo se puede aplicar esta capacidad de aproximación de funciones para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Exploraremos distintas estrategias para construir estas redes y analizaremos su aplicación en problemas concretos, centrándonos en las ventajas que aportan con respecto a los métodos numéricos tradicionales, así como en los casos en los que una aproximación mediante redes neuronales no resulta efectiva.

## Abstract

Neural networks are a mathematical model inspired by the brain's functioning, primarily used to find functions: functions that classify data, predict values, or even anticipate the next word in a sentence. This work will explore how this function approximation capability can be applied to solve partial differential equations. We will investigate different strategies for constructing these networks and analyze their application to specific problems, focusing on the advantages they offer over traditional numerical methods, as well as the cases where a neural network-based approach proves ineffective.



# Índice general

---

<b>1</b>	<b>Introducción y preliminares</b>	<b>1</b>
1.1	Introducción a las redes neuronales . . . . .	1
1.1.1	Comentarios sobre la función sigmoide . . . . .	3
1.2	Espacios de funciones . . . . .	4
1.3	Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales . . . . .	5
1.4	Forma fuerte y débil de una EDP . . . . .	7
1.5	Métodos numéricos tradicionales: el método de los elementos finitos . .	9
1.6	El problema elíptico autoadjunto . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Aproximación de EDPs mediante redes neuronales</b>	<b>13</b>
2.1	PINS: Physics-Informed Neural Networks . . . . .	13
2.2	El “Deep Ritz Method” . . . . .	14
<b>3</b>	<b>Resultados</b>	<b>15</b>
3.1	Notas del formato . . . . .	16
<b>4</b>	<b>El segundo capítulo</b>	<b>19</b>
4.1	Uno más . . . . .	20
4.2	Y otro . . . . .	21
	<b>Bibliografía</b>	<b>25</b>



# CAPÍTULO 1

## Introducción y preliminares

---

Para poder entender el las aproximaciones a las EDPs mediante redes neuronales, es necesario tener un conocimiento previo de las redes neuronales y de las ecuaciones en derivadas parciales. En este capítulo, se introducirán los conceptos básicos de ambos temas, así como las herramientas matemáticas necesarias para comprender el resto del trabajo.

### 1.1. Introducción a las redes neuronales

Una red neuronal, de forma abstracta, es simplemente una función que toma una entrada y produce una salida. Es decir, una red neuronal, es una función  $F$  que toma un vector de entrada  $x$  y produce un vector de salida  $y$ , siendo  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . La red neuronal se compone de una serie de capas, cada una de las cuales está formada por un conjunto de neuronas. Cada neurona de una capa recibe una serie de entradas, las procesa y produce una salida. La salida de cada neurona se calcula mediante una función de activación, que puede ser de distintos tipos, como la función sigmoide, la función tangente hiperbólica o la función ReLU. Para entender este concepto nos vamos a centrar en el caso concreto de la red neuronal de la Figura 1.1.




Figura 1.1: Esquema de una red neuronal con 4 capas.

Como se ve en la Figura 1.1, la entrada en nuestra función está representada por los dos círculos de la izquierda, que representan los valores de entrada  $x_1$  y  $x_2$ , siendo así la entrada  $x \in \mathbb{R}^2$ . Estos valores se multiplican por unos pesos ( $W^{[2]}$ ) y se suman a un sesgo  $b$ . La salida de esta neurona se calcula mediante una función de activación.

Así, los valores que “llegan” a la segunda capa de nuestra red neuronal serán de la forma

$$\sigma(W^{[2]}x + b^{[2]}) \in \mathbb{R}^2,$$

Siendo  $W^{[2]} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  y el vector  $b^{[2]} \in \mathbb{R}^2$ . A partir de aquí, se repite el proceso para cada capa de la red neuronal, hasta llegar a la capa de salida, que nos dará el valor de salida de nuestra red neuronal. De forma visual, se pueden interpretar las flechas de la Figura 1.1 como los pesos por los que se va multiplicando.

En la tercera capa de la red neuronal, vemos que los valores que llegan de la capa 2, estos  $\sigma(W^{[2]}x + b^{[2]})$ , pertenecen a  $\mathbb{R}^2$ . De este modo, como tenemos 3 neuronas en la tercera capa, para obtener un valor perteneciente a  $\mathbb{R}^3$ , necesitamos una matriz  $W^{[3]} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$  y un vector  $b^{[3]} \in \mathbb{R}^3$ . Así, el valor de nuestra red neuronal en la tercera capa será

$$\sigma(W^{[3]}\sigma(W^{[2]}x + b^{[2]}) + b^{[3]}) \in \mathbb{R}^3.$$

Finalmente, la capa de salida recibirá de la tercera capa un vector perteneciente a  $\mathbb{R}^3$ , por lo que necesitaremos una matriz  $W^{[4]} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  y un vector  $b^{[4]} \in \mathbb{R}^3$ . Así, el valor de salida de nuestra red neuronal, esa  $F$  de la que habíamos hablado al principio, será

$$(1.1) \quad F(x) = \sigma(W^{[4]}\sigma(W^{[3]}\sigma(W^{[2]}x + b^{[2]}) + b^{[3]}) + b^{[4]}) \in \mathbb{R}^3.$$

En general, una red neuronal se puede representar como una composición de funciones, donde cada función es una capa de la red neuronal.

Nuestra intención con este tipo de funciones es ir variando los valores de las matrices  $W$ , también conocidos como pesos, y los vectores  $b$  también conocidos como sesgos, para que la salida de nuestra red neuronal se acerque lo máximo posible a la salida deseada.

Para entender esto, vamos a utilizar la red neuronal de la Figura 1.1 para resolver un problema concreto muy sencillo de clasificación. Supongamos que tenemos una serie de puntos en el plano, de tres tipos distintos, como los de la Figura 1.2, y queremos clasificarlos en tres grupos, los puntos de tipo azul, rojo y amarillo.

De este modo, nuestra red neuronal recibirá como entrada un punto del plano, y nos dirá a qué categoría pertenece, devolviendo  $(1, 0, 0)^T$  si es de la categoría azul,  $(0, 1, 0)^T$  si es de la categoría roja y  $(0, 0, 1)^T$  si es de la categoría amarilla.

Lo siguiente que queremos hacer será entrenar la red neuronal, es decir, ajustar los pesos y sesgos de la red neuronal para que la salida se acerque lo máximo posible a la salida deseada. Es decir, que cuando se introduzca un punto de un tipo concreto, la salida lo asigne a la categoría adecuada.

Designamos a  $y(x)$  como la salida deseada de nuestra red neuronal, y a  $F(x)$  como la salida real. Así, el error vendrá dado en función de los pesos y sesgos de la siguiente forma

$$E(W^{[2]}, W^{[3]}, W^{[4]}, b^{[2]}, b^{[3]}, b^{[4]}) = \frac{1}{2} \sum_{x \in X} \|y(x) - F(x)\|^2,$$






Figura 1.2: Puntos en el plano que marcan las dos categorías

Donde  $X$  es el conjunto de puntos que tenemos para entrenar la red neuronal, en nuestro caso, serán 15. Así, lo que queremos hacer es minimizar esta función de error, es decir, encontrar los pesos que minimicen la función  $E$ . Para ello, se utilizan algoritmos de optimización, como el descenso del gradiente. Este proceso es conocido como el entrenamiento de la red neuronal. Si se logra con éxito, la red neuronal será capaz de clasificar correctamente los puntos en el plano. En este caso concreto, al entrenar la red neuronal, se obtiene la clasificación de la Figura 1.3, en la que simplemente hemos aplicado nuestra función para cada punto del plano y lo hemos sombreado de acuerdo a la clasificación que se le ha dado.




Figura 1.3: Puntos en el plano que marcan las dos categorías

Más adelante entenderemos con más detalle como es este proceso de entrenamiento.

### 1.1.1. Comentarios sobre la función sigmoide

Como hemos visto con el ejemplo anterior, las redes neuronales se pueden utilizar para generar funciones. A su vez, estas funciones se utilizan para resolver problemas de forma aproximada. En el ejemplo de la Figura 1.1, la función red neuronal clasifica cualquier parte del plano en una de las tres categorías sombreadas a partir del

entrenamiento. Dicho entrenamiento fija los valores de los pesos y sesgos, y por tanto define la función red neuronal (en el ejemplo define la función 1.1).

Como las redes neuronales se utilizan para aproximar problemas de tipos muy distintos, una de las características deseables es que sean capaces de aproximar el conjunto de funciones "mayor posible".

Para poder lograr este objetivo, se necesitan las funciones de activación. Como ejercicio, supongamos que en nuestra ecuación 1.1 en lugar de utilizar la función sigmoide, no utilizamos ninguna función de activación, es decir, que nuestra red neuronal es simplemente una composición de funciones lineales. En este caso, nuestra red tendría la siguiente forma

$$F(x) = W^{[4]}(W^{[3]}(W^{[2]}x + b^{[2]}) + b^{[3]}) + b^{[4]} \in \mathbb{R}^3.$$

Claramente, una función lineal definida de forma global puede estar muy lejos de aproximar bien funciones generales. De este modo, parece por tanto razonable utilizar funciones de activación no lineales. La función sigmoide es una de las más utilizadas, pero existen otras como la función tangente hiperbólica o la función ReLU. En este trabajo, nos centraremos en la función sigmoide, que se define como

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Esta función tiene la ventaja de que su derivada es fácil de calcular, y es precisamente esta derivada la que se utiliza en el algoritmo de entrenamiento de la red neuronal.

Un resultado relevante para justificar el uso de funciones de activación no lineales es el siguiente es el propuesto por Pinkus[3]. Este resultado es para neuronales de una sola capa, no obstante, si se cumple en una sola capa, es trivial la extensión a  $n$  capas.

**Teorema 1.1** (Pinkus). *Sea  $\sigma \in C(\mathbb{R})$  y sea conjunto  $\mathcal{M}(\sigma) = \text{span}\{\sigma(w \cdot x + b) : b \in \mathbb{R}, w \in \mathbb{R}^n\}$ , se cumple que*

*Para cualquier  $f \in C(\mathbb{R}^n)$ , cualquier conjunto compacto  $K \in \mathbb{R}^n$  y cualquier  $\epsilon > 0$ , existe una función  $g \in \mathcal{M}(\sigma)$  tal que  $\max_{x \in K} |f(x) - g(x)| < \epsilon$ . Si y solo si  $\sigma$  no es una función polinómica.*

De forma más intuitiva, cualquier función  $f \in C(\mathbb{R}^n)$ , se puede aproximar tan bien como se quiera con una red neuronal de una sola capa si y solo si la función de activación no es polinómica.

Este resultado nos aporta una intuición de por qué las funciones de activación no lineales son necesarias para aproximar funciones de forma general pues, de nos ser funciones no lineales, habría muchas funciones que no podríamos aproximar.

## 1.2. Espacios de funciones

Para poder entender y formular de forma matemática el problema de aproximación de EDPs mediante redes neuronales, es necesario tener un conocimiento previo de los

espacios de funciones en los que trabajamos. Como veremos más adelante al estudiar los problemas de frontera para EDPs elípticas, es importante tener una caracterización del espacio  $H_1^0$ . Para entenderlo, empezaremos por los espacios de Hilbert Sobolev.

**Definición 1.2.** Sean  $\Omega$  un conjunto abierto de  $\mathbb{R}^n$ . Definimos el espacio de Sobolev  $H^1(\Omega)$  como el conjunto de funciones en el siguiente conjunto

$$(1.2) \quad H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, n\}.$$

En este espacio, se define la norma de funciones de con la siguiente ecuación

$$(1.3) \quad \|u\|_{H^1(\Omega)} = \left( \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}.$$

Dada esta definición, se define el espacio  $H_0^1(\Omega)$  como el cierre de las funciones de  $C_0^\infty(\Omega)$  en la norma de  $H^1(\Omega)$ . Es decir,  $H_0^1(\Omega)$  es el conjunto de funciones  $u \in H^1(\Omega)$  que se obtienen como límite en  $H^1(\Omega)$  de una serie de funciones  $\{u_m\}_{m=1}^\infty$  todas ellas en  $C_0^\infty(\Omega)$ . Así, de forma más simple, se puede demostrar que  $H_0^1(\Omega)$  se trata del siguiente conjunto.

$$(1.4) \quad H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega) : u = 0 \text{ en } \partial\Omega\}.$$

Nótese que  $H_0^1(\Omega)$  es un espacio de Hilbert con la misma norma y producto interno que  $H^1(\Omega)$ .

**Ejemplo 1.3.** Es fácil ver por ejemplo que la función  $u = x^2 + y^2 - 4$  pertenece a  $H_0^1(C)$ , siendo  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\}$  el círculo abierto de radio 2 centrada en el origen. Esto se debe a que  $u \in L_2(C)$  y además:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \in L_2(C), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y \in L_2(C), \quad u = 0 \text{ en } \partial C.$$

Por tanto,  $u \in H_0^1(C)$ .

### 1.3. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales

Las ecuaciones en derivadas parciales (EDPs) son ecuaciones que relacionan una función desconocida con sus derivadas parciales. Son fundamentales en la física y en la ingeniería, ya que permiten modelar fenómenos físicos y predecir su evolución en el tiempo.

Existen varios tipos de EDPs, no obstante, nosotros nos centraremos en los problemas de frontera para ecuaciones en derivadas parciales elípticas. Estas se utilizan para resolver problemas de equilibrio, que implican encontrar la solución de una ecuación diferencial en un dominio acotado con condiciones de frontera específicas. Estos

problemas incluyen la distribución estacionaria de temperatura, el flujo de fluidos incompresibles no viscosos, la distribución de tensiones en sólidos en equilibrio, y el cálculo de campos eléctricos en regiones con densidad de carga. En general, se aplican cuando se busca determinar un potencial en situaciones estacionarias.

Lo he sacado de: [este enlace](#), [este tipo de cosas se citan?](#)

Uno de los primeros ejemplos de este tipo de ecuaciones es la ecuación de Poisson,

$$-\Delta u = f,$$

donde  $\Delta$  es el operador laplaciano, que se define como la suma de las segundas derivadas parciales de la función  $u$ :

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Esta ecuación es una EDP elíptica pues cumple la siguiente definición general.

**Definición 1.4.** Dado un conjunto  $\Omega$ , acotado y abierto en  $\mathbb{R}^n$ , decimos que una ecuación en derivadas parciales es elíptica si:

$$(1.5) \quad - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), \quad x \in \Omega.$$

Donde los coeficientes  $a_{ij}(x)$ ,  $b_i(x)$ ,  $c(x)$  y  $f$  son funciones que satisfacen las siguientes condiciones

$$(1.6) \quad a_{ij} \in C^1(\overline{\Omega}), \quad i, j = 1, \dots, n$$

$$(1.7) \quad b_i, c \in C(\overline{\Omega}), \quad i = 1, \dots, n$$

$$(1.8) \quad c \in C(\overline{\Omega}),$$

$$(1.9) \quad f \in C(\overline{\Omega})$$

De entre los problemas elípticos definidos en 1.4, como comentábamos, nos interesan las ecuaciones en derivadas parciales elípticas con condiciones de frontera, en concreto, las condiciones de frontera de Dirichlet.

**Definición 1.5.** El problema de condición de frontera de Dirichlet es concretamente el que tenemos una EDP elíptica como la definida en 1.4, tal que, nuestra solución  $u$ , además de cumplir la ecuación 1.5, cumple la siguiente condición de frontera

$$(1.10) \quad u(x) = g(x), \quad \forall x \in \partial\Omega.$$

Asimismo, el problema homogéneo de Dirichlet es aquel en el que  $g = 0$ . A lo largo del trabajo nos centraremos principalmente en este tipo de EDPs.

Con todo, el tipo de ecuaciones elípticas en el que nos vamos a centrar (entendiendo que se cumplen las condiciones de 1.6 - 1.9) serán de la siguiente forma.

$$(1.11) \quad \begin{cases} - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), & x \in \Omega \\ u(x) = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

## 1.4. Forma fuerte y débil de una EDP

En la formulación que hemos dado de las ecuaciones en derivadas parciales elípticas, nos estábamos refiriendo a su formulación en forma fuerte. De forma intuitiva, esta es la que se obtiene directamente de la definición de la ecuación, y es la que relaciona la función desconocida con sus derivadas parciales. La solución de estas ecuaciones en forma fuerte es la que se conoce como solución clásica. De esto surge la siguiente definición.

**Definición 1.6.** Una función  $u \in C^2(\Omega)$  que cumple las condiciones de frontera de Dirichlet y satisface la ecuación 1.5 en  $\Omega$  se dice que es una solución clásica o fuerte de la ecuación 1.5.

No obstante, en muchos casos, no es posible encontrar una solución en forma fuerte, es decir, una función que cumpla la ecuación en todo el dominio y que además cumpla las condiciones de frontera. En estos casos, se recurre a métodos alternativos, como la formulación débil de la ecuación, que permite encontrar una solución en un espacio de funciones más amplio. A continuación, vemos un ejemplo que motiva la necesidad de recurrir a la formulación débil de una ecuación.

**Ejemplo 1.7.** Supongamos que tenemos la siguiente ecuación de Poisson con una condición de frontera de Dirichlet homogénea,

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{en } \Omega, \\ u = 0, & \text{en } \partial\Omega. \end{cases}$$

Donde  $\Omega$  es un conjunto acotado y abierto en  $\mathbb{R}^n$ . En este caso, no siempre es posible encontrar una solución en forma fuerte, es decir, una función  $u$  que cumpla la ecuación en todo el dominio  $\Omega$  y que además cumpla la condición de frontera. Por ejemplo, si  $f$  no es una función suave, no se puede garantizar la existencia de una solución en forma fuerte pues estaríamos rompiendo la condición de 1.9. En estos casos, se recurre a métodos alternativos, como la formulación débil de la ecuación, que permite encontrar una solución en un espacio de funciones más amplio.

Para pasar de forma fuerte a débil, lo que hacemos es seguir el siguiente proceso

1. Multiplicamos a ambos lados de la igualdad por una función  $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$  e integramos.

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left( - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u \right) \varphi \, dx \\ = \int_{\Omega} f(x) \varphi \, dx \end{aligned}$$

2. Expandimos la multiplicación e integramos por partes en la primera integral, llegando a

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} a_{ij}(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \frac{\partial u}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi + \int_{\Omega} c(x) \varphi u \, dx \\ = \int_{\Omega} f(x) \varphi \, dx \end{aligned}$$

Con esta manipulación hemos conseguido una cosa muy interesante: ya no tenemos segundas derivadas de  $u$ , es decir, ya no necesitamos que  $u \in C^2$ . Para que esta igualdad tenga sentido, solo hace falta que  $u \in L_2(\Omega)$  y que  $\partial u / \partial x_i \in L_2(\Omega)$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Nótese además que, para que se cumpla la condición de frontera de Dirichlet,  $u = 0 \in \partial\Omega$ . Todo esto se traduce a que  $u \in H_0^1(\Omega)$ . Esto simplifica las condiciones del problema pues el espacio de funciones en el que puede estar  $u$ , ahora es mucho más amplio.

3. Para simplificar aun más el problema, nótese que  $a_{ij}$  ya no aparecen tras derivadas de ningún tipo, luego no es necesario asumir que  $a_{ij} \in C^1(\overline{\Omega})$ , basta con que  $a_{ij} \in L_{\infty}(\Omega)$ . Por lo mismo,  $b_i, c \in L_{\infty}(\Omega)$ ,  $i = 1, \dots, n$  es suficiente.
4. Por último, nótese que  $C_0^{\infty}(\Omega) \subset H_0^1(\Omega)$ , luego se puede ver que teniendo  $u, v \in H_0^1(\Omega)$ , nuestra ecuación sigue teniendo sentido. Con todo esto, surge la siguiente definición de forma débil.

**Definición 1.8.** Dadas las funciones  $a_{ij} \in L_{\infty}(\Omega)$ ,  $i, j = 1, \dots, n$ ,  $b_i \in L_{\infty}(\Omega)$ ,  $i = 1, \dots, n$ ,  $c \in L_{\infty}(\Omega)$ , y la función  $f \in L_2(\Omega)$ . Decimos que la función  $u \in H_0^1(\Omega)$  es una solución débil de la ecuación 1.5 si se cumple que,

$$\begin{aligned} (1.12) \quad \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \, dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi \, dx \\ + \int_{\Omega} c(x) u \varphi \, dx = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega). \end{aligned}$$

Para simplificar esta engorrosa notación, nos interesa definir la siguiente forma bilineal y lineal.


$$(1.13) \quad a(u, \varphi) = \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \, dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi \, dx + \int_{\Omega} c(x) u \varphi \, dx,$$

y,

$$(1.14) \quad l(\varphi) = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) \, dx.$$

De este modo, nuestro problema elíptico en forma débil con condiciones de frontera de Dirichlet en forma débil se puede expresar de la siguiente forma.

$$(1.15) \quad a(u, \varphi) = l(\varphi) \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Figura 1.4: División de  $\Omega = (0, 1)$  en  $N$  elementos finitos

## 1.5. Métodos numéricos tradicionales: el método de los elementos finitos

El método de los elementos finitos (MEF) es una técnica numérica para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Este método es ampliamente utilizado en ingeniería y ciencias aplicadas porque permite aproximar soluciones en dominios complejos.

Para un problema elíptico con condiciones de frontera, se parte de una ecuación en su formulación débil. Como hemos visto en el apartado anterior, este problema se puede formular de forma muy simplificada como:

$$a(u, \varphi) = l(\varphi) \quad \forall \varphi \in V,$$

Donde  $V$  es el espacio de funciones en el que están nuestras soluciones. En el caso del problema homogéneo, hemos visto que este espacio será  $V = H_0^1(\Omega)$ .

Lo siguiente que se hace es dividir el dominio  $\Omega$  en un conjunto de subdominios más pequeños, llamados elementos finitos. Por ejemplo, si estamos trabajando con un problema de una dimensión, con  $\Omega = (0, 1)$ , dividimos  $\bar{\Omega} = [0, 1]$  en  $N$  subintervalos  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = 1, \dots, N - 1$ , como se hace en la Figura 1.5.


A esta subdivisión, se le asocia una base de polinomios. Así, se reemplaza el subespacio de funciones que habíamos llamado  $V$  por un subespacio de dimensión finita  $V_h$  formado por polinomios a trozos de grado fijo. Siguiendo nuestro ejemplo de antes, la base de polinomios que vamos a utilizar será la de los polinomios como los vistos en la Figura 1.5. Definidos de la siguiente forma.

$$\phi_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & \text{si } x \in [x_{i-1}, x_i], \\ \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, & \text{si } x \in [x_i, x_{i+1}], \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Así, en este ejemplo, nuestro espacio de funciones será  $V_h = \text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$ , donde  $N$  es el número de elementos finitos en los que hemos dividido el dominio. De este modo, al buscar soluciones en este nuevo espacio de funciones, nuestra ecuación diferencial elíptica se convertiría en encontrar los  $u_h \in V_h$  tal que

$$a(u_h, v_h) = l(v_h) \quad \forall v_h \in V_h,$$

De forma intuitiva, lo que se hace es que en vez de buscar una solución en un espacio de funciones infinito, como es  $V$ , se busca una solución en un espacio de funciones finito, como es  $V_h$ . Para poder hacer eso, que nos simplifica mucho el problema, lo que hemos hecho es que nuestro dominio, lo hemos dividido en subdominios más pequeños a partir de los cuales hemos construido nuestro nuevo espacio de funciones.

Figura 1.5: Polinomio  $\phi_i$ 

Al hacer esto, ahora, encontrar una solución se convierte en encontrar los coeficientes de los polinomios que forman nuestra base, es decir, los  $U_i$  en la siguiente ecuación

$$(1.16) \quad u_h = \sum_{i=1}^N U_i \phi_i.$$

Es decir, resolver la ecuación diferencial se convierte en encontrar  $U = (U_1, \dots, U_N) \in \mathbb{R}^N$  que cumplen:

$$(1.17) \quad \sum_{i=1}^N a(\phi_i, \phi_j) U_i = l(\phi_j) \quad \forall j = 1, \dots, N.$$

Esto se traduce en un sistema lineal de la forma  $AU = b$ , donde  $A$  es la matriz de rigidez (con entradas  $A_{ij} = a(\phi_i, \phi_j)$ ), y  $b$  es el vector de términos fuerte (con entradas  $b_j = l(\phi_j)$ ). A este nuevo sistema lineal se le pueden aplicar métodos numéricos tradicionales para resolverlo, como la factorización LU, o el método de Jacobi, encontrando así los coeficientes  $U$  que nos dan  $u_h$ , la aproximación de  $u$ .

## 1.6. El problema elíptico autoadjunto

Un problema interesante en el ámbito de las ecuaciones elípticas es el llamado problema elíptico autoadjunto, el cual permite caracterizar las soluciones de las EDP elípticas como el mínimo de una función. Esto conecta de manera lógica con el enfoque de redes neuronales para aproximar soluciones, donde la función de coste de la red neuronal se puede definir como esta función. Al minimizarla, se obtiene una solución aproximada del problema original. No obstante, esto lo veremos más adelante en detalle. De momento, se define el problema elíptico autoadjunto de la siguiente forma.

**Definición 1.9.** Dado un conjunto  $\Omega$ , acotado y abierto en  $\mathbb{R}^n$ , decimos que una ecuación en derivadas parciales es elíptica autoadjunta si es elíptica, es decir:

$$-\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), \quad x \in \Omega.$$



Donde los coeficientes  $a_{ij}(x)$ ,  $b_i(x)$ ,  $c(x)$  y  $f$  son funciones que satisfacen las siguientes condiciones

$$\begin{aligned} a_{ij} &\in C^1(\overline{\Omega}), & i, j &= 1, \dots, n \\ b_i, c &\in C(\overline{\Omega}), & i &= 1, \dots, n \\ c &\in C(\overline{\Omega}), \\ f &\in C(\overline{\Omega}) \end{aligned}$$

Y además, cumple las siguientes condiciones de simetría,

$$(1.18) \quad \begin{aligned} a_{ij} &= a_{ji}, & i, j &= 1, \dots, n, \\ b_i &= 0, & i &= 1, \dots, n, \end{aligned}$$

Bajo estas condiciones, nuestro problema de condición de frontera de Dirichlet se puede formular de la siguiente forma.

$$(1.19) \quad \begin{cases} -\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u(x) = g(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

El problema elíptico autoadjunto es interesante porque permite caracterizar las soluciones de las EDPs elípticas como el mínimo de una función. Esto es así por el siguiente resultado.

**Lema 1.10.** *Bajo las condiciones del problema elíptico autoadjunto y condiciones de frontera de Dirichlet, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. encontrar  $u \in H_0^1(\Omega)$  tal que  $a(u, \varphi) = l(\varphi) \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$
2. Encontrar  $u \in H_0^1(\Omega)$  tal que  $J(u) \leq J(\varphi) \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$ , siendo  $J(u)$  la siguiente función

$$J(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - l(u), \quad u \in H_0^1(\Omega)$$

Es importante darse cuenta de que, aunque estemos formulando el problema y las condiciones sobre la forma fuerte, la solución se puede calcular a partir de la forma débil. Esto es así porque, bajo estas condiciones, la solución de la forma débil es única y coincide con la de la forma fuerte.

Esto es verdad no? Tampoco se si estas cosas hay que demostrarlas más...

además tengo dudas de si demostrar este lema o no

HASTA AQUÍ CREO QUE TENGO TODOS LOS RECURSOS PARA PODER PONERME A HABLAR DE LAS REDES NEURONALES. AUNQUE NO SE SI DEBERÍA HABLAR DE ALGUNA COSA MÁS DE LAS EDPs, O SI DEBERÍA HABLAR DE ALGUNA COSA MÁS DE LAS REDES NEURONALES.



## CAPÍTULO 2

# Aproximación de EDPs mediante redes neuronales

---

### 2.1. PINS: Physics-Informed Neural Networks

Las PINS, o Physics-Informed Neural Networks, son una técnica que combina la resolución de ecuaciones en derivadas parciales con redes neuronales. La idea es que, en vez de resolver la ecuación diferencial directamente o con métodos numéricos tradicionales, se entrena una red neuronal para que aproxime la solución de la ecuación. Como habíamos comentado en la sección 1.1, las redes neuronales son capaces de aproximar cualquier función, por lo que, en teoría, pueden aproximar cualquier solución de una ecuación diferencial. De este modo, las PINS van a aprovechar esto, definiendo la aproximación de nuestra solución  $\hat{u}$ , como la salida de nuestra función red neuronal que habíamos llamado  $F$ .




Figura 2.1: Esquema de una PINS

Como hemos visto, la función de coste de una red neuronal, mide lo bien que la función red neuronal aproxima la función que queremos. En el caso de las PINS, la función de coste se define como la suma de dos términos. El primero de ellos, se encarga

de verificar la ecuación diferencial, es decir, que la función red neuronal aproxima la ecuación diferencial en todo el dominio. El segundo término, se encarga de verificar las condiciones de frontera. De este modo, la función de coste de una PINS se define como

## **2.2. El “Deep Ritz Method”**

## CAPÍTULO 3

# Resultados

---

---

### 3.1. Notas del formato

**Teorema** (Cauchy–Schwarz). *Nullam quis ante.*

**Teorema 3.1.** *Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc.*

**Definición 3.2.** *Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc.*

**Lema 3.3.** *Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc.*

*Demostración.* *Nullam quis ante.* □

**Lema 3.4.** *Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc.

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA 3.4. *Nullam quis ante:*

$$(3.1) \quad 2 + 2 = 4. \quad \square$$

Lorem ipsum dolor sit amet, Teorema 3.1, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

$$(3.2) \quad e^{i\pi} + 1 = 0,$$

$$(3.3) \quad 2e^{i\pi} + 2 = 0.$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

$$(3.4) \quad \begin{aligned} 0 &= e^{i\pi} + 1 = e^{i\pi} + 1 = e^{i\pi} + 1 = e^{i\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &= -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = -1 + 1 = 0. \end{aligned}$$

et

$$(3.5) \quad \begin{aligned} e^{i\pi} + 1 &= 0, \\ e^{i\pi} + 1 &= 0. \end{aligned}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

$$\begin{aligned} e^{i\pi} + 1 &= 0, \\ e^{i\pi} + 1 &= 0. \end{aligned}$$

Aenean massa:

$$(3.6) \quad \begin{cases} e^{i\pi} + 1 = 0, \\ e^{i\pi} + 1 = 0. \end{cases}$$

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum

semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,



## CAPÍTULO 4

# El segundo capítulo

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

$$(4.1) \quad e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

$$(4.2) \quad e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

$$(4.3) \quad e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

## 4.1. Uno más

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,

sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

## 4.2. Y otro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,

---

sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,



# Bibliografía

---

- [1] ABEL, N. H.: Beweis eines Ausdrucks, von welchem die Binomial-Formel ein einzelner Fall ist. *J. Reine angew. Math.* **1** (1826), 159–160.
- [2] STEIN, E. M. AND WEISS, G. *Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces*. Princeton Mathematical Series 32, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1971.
- [3] PINKUS, A.: *Approximation theory of the MLP model in neural networks*. Acta Numerica, 8, (1999) 143–195.

