

Musterlösungen

Übung 1: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

Teil A: Kontrollfragen

1. Man bezeichnet mit S die Menge der Elementarereignisse (Ereignisraum) und mit $E(S)$ die Menge aller Teilmengen von S , welche auch Ereignismenge genannt wird.
Für den einfachen Würfelwurf gilt $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Die Ereignismenge hingegen enthält alle Ereignisse (z.B. das Ereignis $A = \{1, 3, 5\} \in E(S)$).
Bemerke:
 - Jedes Elementarereignis ist auch ein Ereignis, aber nicht jedes Ereignis ist gleichzeitig ein Elementarereignis
 - Der Ereignisraum S ist ein Element der Ereignismenge $E(S)$ ($S \in E(S)$)
2. komplementär \Rightarrow disjunkt
disjunkt \nRightarrow komplementär
3. klassische (Laplace), statistische (frequent.), subjektive Wahrscheinlichkeit
4. Eine Zufallsvariable heisst diskret, wenn die Wertemenge der Abbildung abzählbar viele Werte enthält.
5. $A \Rightarrow B$, d.h. $A \subseteq B$
 $P(A \cap B) \stackrel{A \subseteq B}{=} P(A) \stackrel{\text{unabh.}}{=} P(A)P(B)$
ja, falls $P(B) = 1$
6. Man nehme an A und B seien unabhängig, i.e., $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
Für disjunkte Ereignisse muss nun zusätzlich gelten: $P(A \cap B) = 0$.
 $\Rightarrow P(A) = 0$ oder $P(B) = 0$
 A, B disjunkt falls $0 = P(A \cap B)$. Diese sind gleichzeitig unabhängig falls $0 = P(A \cap B) = P(A)P(B)$, i.e., nur falls $P(A) = 0$ oder $P(B) = 0$.

7. Wir definieren die folgenden Ereignisse: L: steigende Löhne, K: steigende Konjunktur, A: sinkende Arbeitslosigkeit. Es gilt
- $$\left. \begin{array}{l} P(K|L) > P(K) \\ P(A|K) < P(A) \end{array} \right\} \text{abhängig}$$
8. K: "Prämie", S: "Jahre ohne Schaden"
Ereignisse: $K|S = x \rightarrow P(S|K)!$
9. Satz von Bayes: Umkehrung von Ursache und Wirkung. Die durch die Beobachtung modifizierte Wahrscheinlichkeit ist die sogenannte a posteriori-Wahrscheinlichkeit.

Teil B: Multiple Choice

Kreuzen Sie bitte in den folgenden Mehrfachwahl-Aufgaben die richtigen Aussagen an. Dabei kann es sein, dass von den zu einer Aufgabe vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten keine, eine, mehrere oder alle richtig sind.

1. A und B sind zwei unabhängige Ereignisse. Dann gilt
 - ☐ $P[B | A] = 0$
 - ☒ $P[B | A] = P[B]$
 - ☐ $P[B | A] = P[A]$
 - ☐ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[B | A]$ anzugeben
2. A und B sind zwei disjunkte Ereignisse. Dann gilt
 - ☒ $P[B | A] = 0$
 - ☐ $P[B | A] = P[B]$
 - ☐ $P[B | A] = P[A]$
 - ☐ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[B | A]$ anzugeben
3. A und B sind zwei Ereignisse mit $P[A] = 0.5$ und $P[B | A] = 0.6$. Dann gilt
 - ☒ $P[B \cap A] = 0.3$
 - ☐ $P[B \cap A] = 0.83$
 - ☐ $P[B \cap A] = 0.5$

☐ $P[B \cap A] = 0.6$

4. A und B sind zwei Ereignisse mit $P[B \mid A] = 0$. Dann gilt

☒ $P[B \cap A] = 0$

☐ $P[B \cap A] = P[A] \cdot P[B]$

☐ $P[B \cap A] = 1$

☐ $P[B \cup A] = 1$

5. A und B seien zwei Ereignisse und A eine Teilmenge von B . Dann gilt

☐ $P[A \mid B] = 1$

☒ $P[A \mid B] = P[A]/P[B]$

☐ $P[A \mid B] = 0$

☐ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[A \mid B]$ anzugeben

6. A und B sind zwei Ereignisse, wobei B eine Teilmenge von A ist. Dann gilt

☒ $P[A \mid B] = 1$

☐ $P[A \mid B] = P[A]/P[B]$

☐ $P[A \mid B] = 0$

☐ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[A \mid B]$ anzugeben

7. A und B sind zwei Ereignisse, wobei A und B sich gegenseitig ausschliessen. Dann gilt

☐ $P[A \mid B] = 1$

☐ $P[A \mid B] = P[A]/P[B]$

☒ $P[A \mid B] = 0$

☐ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[A \mid B]$ anzugeben

8. A und B sind zwei unvereinbare Ereignisse, für deren Wahrscheinlichkeiten wir $P[A] > 0$ und $P[B] > 0$ voraussetzen. Dann gilt

☐ A und B sind unabhängig

☒ A und B sind abhängig

☐ Wir haben nicht genügend Elemente um etwas über die Abhängigkeit von A und B zu sagen

9. Aus “ A impliziert B ” folgt, $P[A] > 0$ vorausgesetzt,

☒ $P[A | B] \geq P[A]$

☐ $P[A | B] < P[A]$

☐ $P[A | B] \geq P[B]$

☒ $P[B | A] > 0$

10. Aus “ A und B sind unvereinbar” folgt, $P[A] > 0$ vorausgesetzt,

☐ $P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$

☒ $P[A \cup B] = P[A] + P[B]$

☒ $P[A \cap B] = 0$

☐ $P[A | B] = P[A]$

11. Von zwei Ereignissen A und B sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt: $P[A] = 0.5$, $P[B] = 0.4$ und die Wahrscheinlichkeit, dass weder A noch B eintritt, sei 0.2. Dann gilt

☐ A und B sind unvereinbar

☒ A und B sind nicht unvereinbar

☐ A und B sind unabhängig

☒ A und B sind nicht unabhängig

12. A , B und C seien Ereignisse mit den Eigenschaften:

$P[A] = 0.6$, $P[B] = 0.8$, $P[A \cap B] = 0.4$, $P[C] = 0.3$ und $C \subset A$. Dann gilt

☐ A und B sind unvereinbar

☒ A und B sind abhängig

☒ $A \cup B = S$, wobei S den Ereignisraum bezeichnet

☐ $P[C | A] = 2/3$

☒ $P[C | A] = 1/2$

☒ $P[A | C] = 1$

13. A und B sind zwei unabhängige Ereignisse mit $P[A] = 0.9$ und $P[\overline{A \cup B}] = 0.5$. Dann gilt
- ☐ $P[B] = 0.05$
 - ☒ $P[B] = 0.44$
 - ☐ $P[B] = 0.55$
 - ☐ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[B]$ zu berechnen
14. A und B sind zwei Ereignisse mit $P[A] = 0.1$ und $P[B] = 0.5$. Dann gilt
- ☐ $P[A \cap B] = 0.1 \cdot 0.5$
 - ☐ $P[A \cap B] = 0.1 + 0.5$
 - ☐ $P[A \cap B] = P[A \mid B]$
 - ☒ Wir haben nicht genügend Informationen um $P[A \cap B]$ anzugeben
15. A und B sind zwei Ereignisse mit $P[A] = 1/3$, $P[B] = 1/2$ und $P[B \mid A] = 1/3$. Dann gilt
- ☐ $P[A \mid B] = 1/6$
 - ☐ $P[A \mid B] = 1/9$
 - ☒ $P[A \mid B] = 2/9$
 - ☐ $P[A \mid B] = 1/2$
16. A , B und C sind drei Ereignisse mit $P[A \cap B \cap C] = P[A] \cdot P[B] \cdot P[C]$. Dann gilt
- ☐ A , B und C sind unabhängig
 - ☐ A und C sind unabhängig
 - ☐ A , B und C sind nicht unabhängig
 - ☒ Wir haben nicht genügend Elemente um etwas über die Abhängigkeit von A , B und C zu sagen

Teil C: Aufgaben

1. (a) $\{11, 12, \dots, 16, 21, \dots, 66\}$

$$(b) \frac{\# \text{günstige Fälle}}{\# \text{mögliche Fälle}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$(c) \frac{\# \text{günstige Fälle}}{\# \text{mögliche Fälle}} = \frac{3}{11}$$

$$2. (a) X = \# \text{ Würfe bis erstmals 6: } P[X = 4] = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} = 0.0964$$

$$(b) P[X \geq 2] = 1 - P[X = 1] = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$(c) P[X \leq 4] = \sum_{i=1}^4 P[X = i] = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} = 0.518$$

$$3. (a) P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B] = 0.6$$

$$(b) P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{2}{3}$$

$$(c) P[\overline{A \cap B}] = 1 - P[A \cap B] = 0.8$$

$$(d) P[\overline{A} \cap \overline{B}] = 1 - P[A \cup B] = 0.4$$

$$(e) P[\overline{A \cup B}] = 1 - P[A \cup B] = 0.4$$

$$(f) P[\overline{A} \cup \overline{B}] = 1 - P[A \cap B] = 0.8$$

4. Inkonsistent!

$$P[\text{“Annahme durch A oder B”}] =$$

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B] = 0.3 + 0.4 - 0.2 = 0.5$$

$$\text{Aber: } P[\text{“keine”}] = 1 - P[A \cup B] = 0.3 \text{ Widerspruch!}$$

$$5. A: \text{“Maschine A”}; P[A] = 0.7$$

$$B: \text{“Maschine B”}; P[B] = 0.3$$

$$SF: \text{“Stück fehlerhaft”}; P[SF|A] = 0.08; P[SF|B] = 0.06$$

$$\rightsquigarrow P[A|SF] = \frac{P[SF|A] \cdot P[A]}{P[SF|A] \cdot P[A] + P[SF|B] \cdot P[B]} = 0.7568 \text{ (Bayes)}$$

$$6. M: \text{“Matura bestanden”}; P[M] = 0.6$$

$$NM: \text{“Matura nicht bestanden”}; P[NM] = 0.4$$


$$TP: \text{“Aufnahmetest bestanden”};$$

$$TN: \text{“Aufnahmetest nicht bestanden”};$$

$$P[TN|NM] = 0.9 \Rightarrow P[TP|NM] = 0.1;$$

$$P[TN|M] = 0.01 \Rightarrow P[TP|M] = 0.99$$

(a) Baumdiagramm



(b) $P[TN] = P[TN|M] \cdot P[M] + P[TN|NM] \cdot P[NM] = 0.366$

(c) $P[NM|TN] = \frac{P[TN|NM] \cdot P[NM]}{P[TN]} = 0.9836$

7. A: "Werk A"; $P[A] = 0.7$

B: "Werk B"; $P[B] = 0.3$

N: "Lampe normgerecht"; $P[N|A] = 0.83$, $P[N|B] = 0.63$

$$\implies P[B|N] = \frac{P[N|B] \cdot P[B]}{P[N|B] \cdot P[B] + P[N|A] \cdot P[A]} = 0.24545$$


8. (a) 0: $P[A] = 1$;

$$2: P[A] = \frac{\binom{2}{0} \binom{50-2}{5}}{\binom{50}{5}} = 0.8082;$$

$$5: P[A] = \frac{\binom{5}{0} \binom{50-5}{5}}{\binom{50}{5}} = 0.5766;$$

$$10: P[A] = \frac{\binom{10}{0} \binom{50-10}{5}}{\binom{50}{5}} = 0.3106$$

(b) $P[A] = \frac{(50-k)!45!}{(50-k-5)!50!}, k \geq 1$



9. (a) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

(b) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

(c) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

(d) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

(e)
$$\frac{\begin{matrix} JJMM & MJJM \\ JMJM & MJMJ \\ JMMJ & MMJJ \end{matrix}}{\begin{matrix} JJMM & MJJM \\ JMJM & MJMJ \\ JMMJ & MMJJ \end{matrix}} = \frac{\text{\#günstige Fälle}}{\text{\#mögliche Fälle}} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

(f)
$$\frac{\begin{matrix} JJMM & MJJM \\ JMJM & MJMJ \\ JMMJ & MMJJ \\ JJJM & JMJJ \\ MJJJ & JJMJ \\ JJJJ \end{matrix}}{\begin{matrix} JJMM & MJJM \\ JMJM & MJMJ \\ JMMJ & MMJJ \\ JJJM & JMJJ \\ MJJJ & JJMJ \\ JJJJ \end{matrix}} = \frac{\text{\#günstige Fälle}}{\text{\#mögliche Fälle}} = \frac{6}{11}$$

10. (a) 0.2

(b) 0.8

(c) $0.8^3 = 0.512$

- (d) $0.2^3 = 0.008$
- (e) SWW, WSW, WWS: $3 \cdot 0.8^2 \cdot 0.2 = 0.384$
11. (a) Arbeitslosenquote: $0.8 \cdot 0.033 + 0.2 \cdot 0.093 = 0.045$
- (b) $P[\text{Schw.}|\text{Arbeitslos}] = \frac{P[\text{Arbeitslos}|\text{Schw.}] \cdot P[\text{Schw.}]}{0.045} = \frac{0.033 \cdot 0.8}{0.045} = 0.586667$
12. HIV; $P[\text{HIV}] = 0.01\%$
 TP: "Test positiv"; $P[\text{TP}|\text{HIV}] = 0.9995$; $P[\text{TN}|\text{nicht HIV}] = 0.998$
- (a) $P[\text{HIV}|\text{TP}] = \frac{P[\text{TP}|\text{HIV}] \cdot P[\text{HIV}]}{P[\text{TP}|\text{HIV}] \cdot P[\text{HIV}] + P[\text{TP}|\text{nicht HIV}] \cdot P[\text{nicht HIV}]} = 0.0474$
- (b) $P[\text{nicht HIV}|\text{TN}] = \dots \approx 1$
13. (a) $P[\text{"Gewinn"}] = \frac{11}{36}$
- (b) $E[\text{"Gewinn"}] = \frac{11}{36} \cdot 1 + \frac{25}{36} \cdot 0 = \frac{11}{36} \cong 30 \text{ Rappen}$