

Tablas de frecuencia

Luis Temis

2022-03-18

TABLAS DE FRECUENCIAS Y GRÁFICOS

Se implementa la matriz iris

Exploración de la Matriz Iris

1.- Importación de la matriz

```
data(iris)
```

2.- Exploración de la matriz

```
dim(iris)
```

```
## [1] 150 5
```

3.- Nombre de las columnas

```
colnames(iris)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
```

4.- Tipo de variables

```
str(iris)
```

```
## 'data.frame': 150 obs. of 5 variables:
## $ Sepal.Length: num 5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
## $ Sepal.Width : num 3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
## $ Petal.Length: num 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
## $ Petal.Width : num 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
## $ Species : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

5.- En busca de datos perdidos

```
anyNA(iris)
```

```
## [1] FALSE
```

Generación de tablas

1.- Convertimos la matriz de datos a un data frame, se agrupan los valores para la variable Petal.Length y se calcula la frecuencia absoluta.

```
tabla_PL<-as.data.frame(table(PL = iris$Petal.Length))
```

2.- Frecuencia absoluta de la variable Petal.Length (PL) se muestra la tabla de contingencia para la variable PL con su respectiva frecuencia absoluta.

```
tabla_PL
```

```
##      PL Freq
## 1      1      1
## 2     1.1      1
## 3     1.2      2
## 4     1.3      7
## 5     1.4     13
## 6     1.5     13
## 7     1.6      7
## 8     1.7      4
## 9     1.9      2
## 10      3      1
## 11     3.3      2
## 12     3.5      2
## 13     3.6      1
## 14     3.7      1
## 15     3.8      1
## 16     3.9      3
## 17      4      5
## 18     4.1      3
## 19     4.2      4
## 20     4.3      2
## 21     4.4      4
## 22     4.5      8
## 23     4.6      3
## 24     4.7      5
## 25     4.8      4
## 26     4.9      5
## 27      5      4
## 28     5.1      8
## 29     5.2      2
## 30     5.3      2
## 31     5.4      2
## 32     5.5      3
## 33     5.6      6
## 34     5.7      3
## 35     5.8      3
## 36     5.9      2
## 37      6      2
## 38     6.1      3
## 39     6.3      1
## 40     6.4      1
## 41     6.6      1
## 42     6.7      2
## 43     6.9      1
```

3.- Se contruye la tabla de frecuencias completas redondeando las frecuencias absolutas a 3 decimales

```
transform(tabla_PL,
          freqAc=cumsum(Freq),
          Rel= round(prop.table(Freq),3),
          RelAc=round(cumsum(prop.table(Freq)),3))
```

```
##      PL Freq freqAc   Rel RelAc
```

```
## 1 1 1 1 0.007 0.007
## 2 1.1 1 2 0.007 0.013
## 3 1.2 2 4 0.013 0.027
## 4 1.3 7 11 0.047 0.073
## 5 1.4 13 24 0.087 0.160
## 6 1.5 13 37 0.087 0.247
## 7 1.6 7 44 0.047 0.293
## 8 1.7 4 48 0.027 0.320
## 9 1.9 2 50 0.013 0.333
## 10 3 1 51 0.007 0.340
## 11 3.3 2 53 0.013 0.353
## 12 3.5 2 55 0.013 0.367
## 13 3.6 1 56 0.007 0.373
## 14 3.7 1 57 0.007 0.380
## 15 3.8 1 58 0.007 0.387
## 16 3.9 3 61 0.020 0.407
## 17 4 5 66 0.033 0.440
## 18 4.1 3 69 0.020 0.460
## 19 4.2 4 73 0.027 0.487
## 20 4.3 2 75 0.013 0.500
## 21 4.4 4 79 0.027 0.527
## 22 4.5 8 87 0.053 0.580
## 23 4.6 3 90 0.020 0.600
## 24 4.7 5 95 0.033 0.633
## 25 4.8 4 99 0.027 0.660
## 26 4.9 5 104 0.033 0.693
## 27 5 4 108 0.027 0.720
## 28 5.1 8 116 0.053 0.773
## 29 5.2 2 118 0.013 0.787
## 30 5.3 2 120 0.013 0.800
## 31 5.4 2 122 0.013 0.813
## 32 5.5 3 125 0.020 0.833
## 33 5.6 6 131 0.040 0.873
## 34 5.7 3 134 0.020 0.893
## 35 5.8 3 137 0.020 0.913
## 36 5.9 2 139 0.013 0.927
## 37 6 2 141 0.013 0.940
## 38 6.1 3 144 0.020 0.960
## 39 6.3 1 145 0.007 0.967
## 40 6.4 1 146 0.007 0.973
## 41 6.6 1 147 0.007 0.980
## 42 6.7 2 149 0.013 0.993
## 43 6.9 1 150 0.007 1.000
```

4.- Agruparemos las variables en 8 clases y se calcula la frecuencia absoluta

```
tabla_clases<-as.data.frame(table (Petal.length = factor
                                   (cut(iris$Petal.Length,
                                       breaks = 8))))
```

5.- Visualizamos la tabla de clases

```
tabla_clases
```

```
## Petal.length Freq
## 1 (0.994,1.74] 48
```

```
## 2 (1.74,2.48] 2
## 3 (2.48,3.21] 1
## 4 (3.21,3.95] 10
## 5 (3.95,4.69] 29
## 6 (4.69,5.43] 32
## 7 (5.43,6.16] 22
## 8 (6.16,6.91] 6
```

6.- Contrucción de la tabla de frecuencias completa redondeando las frecuencias relativas a 3 decimales

```
tabla<-transform(tabla_clases,
  freqAc=cumsum(Freq),
  Rel= round(prop.table(Freq),3),
  RelAc=round(cumsum(prop.table(Freq)),3))
```

7.- visualización del objeto **tabla**.

```
tabla
```

```
##   Petal.length Freq freqAc   Rel RelAc
## 1 (0.994,1.74]  48    48 0.320 0.320
## 2 (1.74,2.48]   2    50 0.013 0.333
## 3 (2.48,3.21]   1    51 0.007 0.340
## 4 (3.21,3.95]  10    61 0.067 0.407
## 5 (3.95,4.69]  29    90 0.193 0.600
## 6 (4.69,5.43]  32   122 0.213 0.813
## 7 (5.43,6.16]  22   144 0.147 0.960
## 8 (6.16,6.91]   6   150 0.040 1.000
```

7.1.- Instalamos la librería knitr

7.2.- Se abre la librería

```
library(knitr)
```

7.3.- Se visualiza la tabla

```
kable(tabla)
```

Petal.length	Freq	freqAc	Rel	RelAc
(0.994,1.74]	48	48	0.320	0.320
(1.74,2.48]	2	50	0.013	0.333
(2.48,3.21]	1	51	0.007	0.340
(3.21,3.95]	10	61	0.067	0.407
(3.95,4.69]	29	90	0.193	0.600
(4.69,5.43]	32	122	0.213	0.813
(5.43,6.16]	22	144	0.147	0.960
(6.16,6.91]	6	150	0.040	1.000