
a
1
2
3
4
5
6
78
9
b
39.04
39.06
39.08
39.10
BTA20 position (Mb, ARS-UCD1.2); exons of ENSBTAT00000014437
b
SLICK4
c.1281C>G
p.Tyr427Ter
absent (0 copies)
SLICK1
c.1382del
p.Ala461ValfsTer2
5 carrier hap.
SLICK3
c.1394C>A
p.Ser465Ter
1 carrier hap.
SLICK5
c.1396A>T
p.Lys466Ter
not assigned
SLICK6
c.1435C>T
p.Gln479Ter
3 carrier hap.
SLICK2
c.1489C>T
p.Arg497Ter
22 carrier hap.
39,099,100
39,099,140
39,099,180
39,099,220
39,099,260
39,099,300
39,099,340
Final exon, BTA20 bp: the six published truncating alleles lie within 208 bp
c
TM
cytoplasmic tail
STAT5 Tyr
extracellular
Box1
SLICK4
426 aa (−155)
SLICK1
461 aa (−120)
SLICK3
464 aa (−117)
SLICK5
465 aa (−116)
SLICK6
478 aa (−103)
SLICK2
496 aa (−85)
0
100
200
300
400
500
600
PRLR residue (wild type 581 aa, UniProt Q28172); bars end at the last residue before the premature stop
carrier haplotypes assigned in this study
not assigned (see text)