
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE USO DE ANTIMICROBIANOS
Equipo PROA

Cba. 1-09-2025

TABLA DE RECONSTITUCIÓN, DILUCIÓN Y VELOCIDAD DE INFUSIÓN DE ANTIMICROBIANOS

Se presentan los antimicrobianos disponibles en el hospital según clasificación AWaRe (OPS) (Acceso, precaución o vigilancia y reserva), quedando con las siguientes categorías:

- **ANTIBIOTICOS DE ACCESO**
- **ANTIBIOTICOS EN VIGILANCIA**
- **ANTIBIOTICOS DE RESRVA (AUTOSTOP EN 48 HS)**



Antibióticos Presentación	Vías de administración		Reconstitución (diluyente)	Concentración del ATB reconstituido	Estabilidad		Dilución		Concentración final (llevar a)		Velocidad de la administración	Observaciones
	IVD	IVI			25°C	2,8° C	SF	Dx 5%	Recomendada Vía periférica	Máxima Vía central		
Aciclovir F/A	NO	SI	10 ml AD	50 mg/ml	12 hs	NO	SI	SI	2,5-5 mg/ml	7 mg/ml	60 minutos	No refrigerar el vial reconstituido.
Amikacina Ampolla 2 ml (250 mg/ml)	NO	SI	No requiere	…….	…….	…….	SI	SI	0,25-05 mg/ml	5-10 mg/ml	60 minutos a 2 horas	Vial de un solo uso. Separar 1 h antes o después de las cefalosporinas o penicilinas.
Ampicilina F/A 1g	SI		En ambas formas: 10 ml AD	100/ml	1h	2h	SI	NO	50 mg/ml	100 mg/ml	5-10 minutos	El tiempo de preparación y administración no debe exceder 1 h.
		SI							10-20 mg/ml	30 mg/ml	15-30 minutos	
Ampicilina Sulbactan F/A 1,5g	SI		En ambas formas: 3,2 ml AD	250 mg/ml de Ampicilina	1 hs	2 hs	SI	NO	30 mg/ml	30 mg/ml	10-15 minutos	Datos consignados en base a Ampicilina. No usar dextrosa al 5%
		SI							10-20 mg/ml	30 mg/ml	30-60 minutos	
Anfotericina B FA 50mg	NO	SI	10 ml AD	5 mg/ml	24hs	48hs	NO	SI	0,1 mg/ml Vía periférica	0,5 mg/ml Vía central	4-6 horas	Proteger de la luz durante su conservación y administración.
Anfotericina Liposomal F/A 50mg	NO	SI	10ml AD	5 mg/ml	……	24hs	NO	SI	0,2-0,5 mg/ml	2 mg/ml	60 minutos a 2 horas	Lavar la vía antes y después de su adm. Con dx 5%.
Cefazolina F/A 1g	SI		En ambas formas: 10 ml AD	100 mg/ml	24hs	4 días	SI	SI	50 mg/ml	100 mg/ml	3-5 minutos	Reacciones alérgicas, tromboflebitis, nefrotoxicidad.
		SI							20 mg/ml	40 mg/ml	30 minutos	
Cefalotina F/A 1g	SI		En ambas formas: 10 ml AD	100 mg/ml	12hs	24hs	SI	SI	50 mg/ml	100 mg/ml	3-5 minutos	El cambio de color no indica inactividad.
		SI							20 mg/ml	50 mg/ml	30 minutos	

Ceftazidima F/A 1g	**SI**		**En ambas formas: 10 ml AD**	**100 mg/ml**	**8hs**	**24hs**	**SI**	**SI**	**40 mg/ml**	**100 mg/ml**	**3-5 minutos**	**Eliminar la burbujas de dióxido de carbón antes de administrar**
		SI							**20 mg/ml**	**40 mg/ml**	**15-30 minutos**	
Ceftriaxona F/A 1g	**SI**		**En ambas formas: 10 ml AD**	**100 mg/ml**	**6hs**	**24hs**	**SI**	**SI**	**40 mg/ml**	**100 mg/ml**	**3-5 minutos**	**No administrar simultáneamente con soluciones que contengan calcio.**
		SI							**20 mg/ml**	**40 mg/ml**	**30 minutos**	
Cefuroxima F/A 750 mg	**SI**		**En ambas formas 6ml AD**	**116 mg/ml**	**5hs**	**48hs**	**SI**	**SI**	**30 mg/ml**	**50 mg/ml**	**3-5 minutos**	**Ptes. Con RH pueden alcanzar una concentración final de 100mg/ml.**
		SI							**10-15 mg/ml**	**30 mg/ml**	**30-60 minutos**	
Claritromicina F/A 500 mg	**NO**	**SI**	**10ml AD**	**50 mg/ml**	**24hs**	**48hs**	**SI**	**SI**	**2 mg/ml**	**2 mg/ml**	**60 minutos**	**No usar SF para reconstituir, puede precipitar.**
Ciprofloxacina Sachet 200 mg (2mg/ml)	**NO**	**SI**	**No requiere**	**……**	**24hs Sach FLEX**	**NO**	**SI Sólo en dosis bajas**	**Si Sólo en dosis bajas**	**2 mg/ml Dosis bajas 1mg/ml**	**2mg/ml Dosis bajas 1mg/ml**	**60 minutos**	**Sachet rígido una vez abierto desechar. Proteger de la luz la jeringa y el sachet, NO requiere protección el perfus, baja fotosensibilidad.**
Clindamicina Ampolla 600 mg (150 mg/ml)	**NO**	**SI**	**No requiere**	**……**	**……**	**……**	**SI**	**SI**	**6 mg/ml**	**12 mg/ml**	**30-60 minutos**	**Ampolla de un solo uso, conciliar horario de administración.**
Colistina F/A 100 mg	**NO**	**SI**	**2 ml solvente del producto**	**50 mg/ml**	**24hs**	**24hs**	**SI**	**SI**	**2 mg/ml**	**2 mg/ml**	**30 minutos**	**Ver vademecum para la administración intravenosa continua.**
Fluconazol Sachet 200 mg 2 mg/ml)	**NO**	**SI**	**No requiere**	**……**	**24hs Sach flex**	**NO**			**2 mg/ml**	**2 mg/ml**	**60 minutos en dosis >6mg infundir en 2hs**	**Sachet rígido una vez utilizado desechar. Conservar sachet FLEX 24hs T° ambiente.**
Ganciclovir F/A 500 mg	**NO**	**SI**	**10 ml AD**	**50 mg/ml**	**12hs**	**NO**	**SI**	**SI**	**5 mg/ml**	**10 mg/ml**	**60 minutos 2 horas**	**Por sus propiedades cancerígenas debe prepararse bajo flujo laminar.**
Gentamicina Ampolla 80 mg (40mg/ml)	**PRP**		**No requiere**	**……**	**……**	**……**	**SI**	**SI**	**10 mg/ml**	**10 mg/ml Pr**	**15 minutos**	**Su administración IVD en PR para pediatría. Vial de un solo uso.**
		SI							**3 mg/ml**	**10 mg/ml**	**30-60 minutos**	
Imipenem F/A 500 mg	**PRP**	**SI**	**10 ml SF**	**50 mg/ml**	**10hs**	**48hs**	**SI**	**NO**	**5 mg/ml**	**7 mg/ml en pctes RH**	**Dosis<500 mg 30 minutos. >500 mg 60 min.**	**El tiempo de preparación y administración no debe exceder las 2 hs.**

Meropenem F/A 500 mg F/A 1 g	**SI**		**En ambas formas reconstituir 10ml SF/500mg 20ml SF/1G**	**50 mg/ml**	**8hs**	**24hs**	**SI**	**NO**	**50 mg/ml**	**50 mg/ml**	**5 minutos**	**Puede ser infundido en 2 hs, mejor actividad antimicrobiana.**
		SI							**2,5-10 mg/ml**	**50 mg/ml**	**15-30 minutos**	
Metronidazol Sachet 500 mg (5 mg/ml)	**NO**	**SI**	**No requiere**	**……..**	**24hs Sach flex**	**……**	**……**	**……**	**5 mg/ml**	**5 mg/ml**	**30-60 minutos**	**Sachet rígido,una vez abierto no conservar. Proteger de la luz**
Penicilina G F/A 1M-3M	**NO**	**SI**	**1M: 4,5 ml AD 3M: 9 ml AD**	**1M: 200,000ui 3M: 300,000ui**	**6hs**		**SI**	**NO**	**10.000 a 30.000 UI/ml**	**50.0000 UI/ml**	**60 minutos a 2hs**	**Se recomienda administrar y desechar.**
Piperacilina Tazobactam F/A 4,5 g (Piperacina 4 g. + Tazobactam 0.5 g)	**NO**	**SI**	**20 ml AD o SF**	**200 mg/ml de Piperacilina**	**24hs**	**48hs**	**SI**	**SI**	**10 mg/ml**	**20 mg/ml**	**30-60 minutos**	**Datos consignados en base a Piperacilina.**
Rifampicina F/A 600 mg	**NO**	**SI**	**10 ml AD**	**60 mg/ml**	**24hs**	**……**	**SI**	**SI**	**Menos de 6 mg/ml**	**6 mg/ml**	**30 minutos a 3 horas**	**El diluido precipita luego de las 4 hs.**
Sulfametaxazol + Trimetroprim Ampolla de 5 ml: 80 mg TMP 400 mg SMX	**NO**	**SI**	**No requiere**	**……**	**……**	**……**	**NO**	**SI**	**0,6 mg/ml**	**1mg/ml Pctes RH: 1,6mg/ml**	**30-60 minutos**	**Datos consignados en base a Trimetropima.**
Vancomicina F/A 500 mg	**NO**	**SI**	**10 ml AD**	**50 mg/ml**	**……**	**4 días**	**SI**	**SI**	**2,5 mg/ml**	**5 mg/ml**	**60 minutos**	**Puede ser infundido por 3hs, mejor actividad antimicrobiana.**

Referencias: **AD:** Agua destilada - **DX5%:** dextrosa 5% - **F/A:** frasco ampolla - **IR**: insificiencia renal - **PRP:** poco recomendado para pediatría - **RH**: restrcción hídrica - **SF:** solución fisiológica

IVD: intravenosa directa
IVI: intravenosa intermitente