ANTIMICROBIANO	DOSIS HABITUAL	AJUSTE EN EN ENFERMEDAD RENAL CRONICA FILTRADO GLOMERULAR (mL/min/1.73m2)			DOSIS EN TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL
		50-25	25-10	< 10	
ACICLOVIR	VER MANUAL	EV: 5-10 mg/kg c/12 hs Encefalitis : 20 mg/kg c/12 hs	EV: 5-10 mg/kg c/24 hs Encefalitis: 20 mg/kg c/24 hs	EV: 5 mg/kg c/24 hs Encefalitis: 10 mg/kg c/24 hs	Hemo: 5 mg/kg c/24 hs. Ad: EV 2,5 -5 mg c/24 dar dosis postD. VO: 800 mg c/12 hs
		VO: No ajustar	VO: 20 mg/kg c/8 hs	VO: 20 mg/kg c/12 hs	
AMIKACINA	VER MANUAL	5-7,5 mg/kg c/24 hs	5 -7,5 mg/kg c/48 hs Control de funcion renal	5 - 7,5 mg/kg c/ 48-72 hs. Control de funcion renal	DP 5-7,5 mg/kg y luego, Monitorizar valoracion con nefrologia Hemo: 5-7,5 mg/kg
AMOXICILINA	VER MANUAL	No ajustar	10-20 mg/kg cada 12 hs	10-20 mg/kg cada 24 hs	DP y Hemo: 10-20 mg/kg c/24 hs
AMOXICILINA/ CLAVULANICO	VER MANUAL	No ajustar	10-20 mg/kg c/12 hs	10-20 mg/kg c/24 hs	DP y Hemo: 10-20 mg/kg c/24 hs
AMPICILINA	VER MANUAL	No ajustar	25-50 mg/kg c/8-12 hs SNC: 50-100 mg/kg c/8-12 hs	25-50 mg/kg c/12 hs SNC: 50-100 mg/kg c/12 hs	DP y Hemo: 25-50 mg/kg c/12 hs. SNC: 75-100 mg/kg c/12 hs
AMPICILINA/SULBACTAM	VER MANUAL	Clear >= 30 No ajustar Clear< 30: 50 mg/kg c/8 hs	50 mg/kg c/12 hs	50 mg/kg c/24 hs	DP :50 mg/kg c/24 hs. Hemo: 50 mg/kg c/24 hs. TRRC: 50 mg/kg c/8 hs.
ANFOTERICINA DEOXICOLATO	VER MANUAL	Con IR pre existente : No ajustar. Si IR es secundaria a Anfotericina B, disminuir dosis 50% ó dosis cada 72 hs			
ANFOTERICINA LIPOSOMAL	VER MANUAL	No ajustar			
AZITROMICINA	VER MANUAL	No ajustar			
CASPOFUNGINA	VER MANUAL	No ajustar			
CEFALEXINA	VER MANUAL	No ajustar			
CEFALOTINA	VER MANUAL	No ajustar	25 mg/kg c/ 12 hs	25 mg/kg c/ 24 hs	DP y Hemo: 25-37,5 mg/kg c/ 24 hs dosis
CEFAZOLINA	VER MANUAL	No ajustar	26 mg/kg c/ 12 hs	26 mg/kg c/ 24 hs	DP y Hemo: 25-37,5 mg/kg c/ 24 hs dosis
CEFIXIMA	VER MANUAL	No ajustar	75% de la dosis habitual	50% de la dosis habitual	
CEFTAZIDIMA	VER MANUAL	50 mg/kg c/12 hs	50 mg/kg c/12-24 hs	50 mg/kg c/48 hs	
CEFTRIAXONA	VER MANUAL	No ajustar			
CEFUROXIMA	VER MANUAL	No ajustar	50 mg/kg c/ 12 hs	50 mg/kg c/ 24 hs	
CIPROFLOXACINA	VER MANUAL	No ajustar	10-15 mg/kg c/ 24hs	10-15 mg/kg c/ 24 hs	DP: 10-15 mg/ kg c/24 hs. Hemo: 10-15 mg/ kg c/24 hs

ANTIMICROBIANO	DOSIS HABITUAL	AJUSTE EN EN ENFERMEDAD RENAL CRONICA FILTRADO GLOMERULAR (mL/min/1.73m2)			DOSIS EN TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL
		50-25	25-10	< 10	
CLARITROMICINA	VER MANUAL	No ajustar	3.75 mg/kg cada 12 hs. (Max. 500 mg/dia)	3.75 mg/kg cada 24 hs. (Max. 500 mg/dia)	DP :3,75 mg/kg c/24 hs. Hemo: 3,75 mg/kg c/24 hs. TRRC: No ajustar
CLINDAMICINA	VER MANUAL	No ajustar			
COLISTIN	VER MANUAL	1,25 mg/kg c/12hs	1,25 mg/kg c/24-36 hs	1,5 mg/kg c/ 36-48 hs	Hemo: 1,5 mg/kg c/24-48 hs. DP: 1,5 mg/kg c/48 hs PostD TRRC: 2,5 mg/kg c/24 hs.
ERITROMICINA	VER MANUAL	No ajustar			
FLUCONAZOL	VER MANUAL	3-6 mg/kg c/ 24 hs	3-6 mg/kg c/ 24 hs	3-6 mg/kg c/ 48 hs	DP: 3-6 mg/kg c/ 48 hs. Hemo 3-6 mg/kg c/24 h.
FOSCARNET	VER MANUAL	La dosis de foscarnet debe ser ajustada en pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 1,4 ml/minuto/kg.			
FOSFOMICINA	VER MANUAL	**FG < 40**: 50-100 mg/kg c/8 hs. **FG 30-20**: 40-80 mg/kg c/8 hs	**FG 30-20**: 40-80 mg/kg c/8 hs. **FG: 20-10:** 30-60 mg/kg c/8 hs	**FG < 10**: 20-40 mg/kg c/12 hs	Sin datos en pediatria
GANCICLOVIR	Dosis Induccion: 5 mg/k/12hs.	Induccion: 2,5 mg/kg c/24 hs	Induccion: 1,25 mg/kg c/24 hs	Induccion: 1,25 mg/kg 3 vps	DP: inducción: 1,25 mg/kg 3 vps; Hemo: inducción 1,25 mg/kg c/48 -72 hs; D. mantenimiento 0,625 mg/kg c/48-72 hs.
	Dosis mantenimineto: 5 mg/k/dia	Mantenimineto: 1,25 mg/kg c/24 hs	Mantenimineto: 0,625 mg/kg c/24 hs	Mantenimineto: 0,625 mg/kg 3 vps	
GENTAMICINA	VER MANUAL	1,7-2,5 mg/kg c/12 hs	1,7-2,5 mg/kg c/24 hs	1,7-2,5 mg/kg c/48-72 hs	2 mg/kg c/48 hs. Hemo: RC: 2 mg/kg/dosis
IMIPENEM	VER MANUAL	7-13 mg/kg c/8 hs	7-13 mg/kg c/12 hs		DP: 7,5-12,5 mg/kg c/24 hd. Hemo: 7,5-12,5 mg/kg c/12 hs
LEVOFLOXACINA	VER MANUAL	No ajustar	5-10 mg/k/24 hs.	5-10 mg/k/48 hs.	DP: 5-10 mg/kg c/48 hs. Hemo : 5-10 mg/kg c/48 hs
LINEZOLID	VER MANUAL	No ajustar		10 mg/k/24 hs.	DP: 10 mg/kg c/12 hs Hemo:10 mg /kg c/12 hs.
MEBENDAZOL	VER MANUAL	No ajustar			
MEROPENEM	VER MANUAL	20 mg/kg c/12 hs. Meningitis, shock septico y FQ: 40 mg. /k/12 hs.	10 mg/kg c/12 hs. Meningitis, shock septico y FQ: 20 mg./k/12 hs.	10 mg/kg c/12 hs. Meningitis, shock septico y FQ: 20 mg./k/12 hs.	DP: 10-20 mg/kg c/24 hs Hemo: 10-20 mg/kg c/24 hs.
METRONIDAZOL	VER MANUAL	No ajustar		10 mg /kg c/ 12 hs o 4mg/kg c/6hs	DP : 4 mg/kg c/6 hs. Hemo: 4 mg/kg c/6 hs.

ANTIMICROBIANO	DOSIS HABITUAL	AJUSTE EN EN ENFERMEDAD RENAL CRONICA FILTRADO GLOMERULAR (mL/min/1.73m2)			DOSIS EN TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL
		50-25	25-10	< 10	
NISTATINA	VER MANUAL	No ajustar			
OSELTAMIVIR	< 15 kg. de peso	No ajustar	30 mg/24 hs.	12 mg. Dosis unica	DP: 12 mg/dosis unica. Hemo: 12 mg/ POSTD
	> 15 kg. < 23 kg. de peso	No ajustar	45 mg/24 hs.	18 mg. dosis unica	DP: 18 mg/dosis unica. Hemo: 18 mg/ POSTD
	> 23 kg. < 40 Kg. de peso	No ajustar	60 mg/24 hs.	24 mg. dosis unica	DP: 24 mg/dosis unica. Hemo: 24 mg/ POSTD
	> 40 kg de peso	No ajustar	75 mg/24 hs.	30 mg. dosis unica	DP: 30 mg/dosis unica. Hemo: 30 mg/ POSTD
PENICILINA G SODICA	VER MANUAL	75.000-300.000 unidades/kg/día c/4-6 hs		50.000-200.000 unidades/kg/día c/ 8 hs	DP: 20.000-200.000 Unidades/ kg/día c/12 hs. Hemo: 25.000-200.000 Unidades/ kg/día c/8-12 hs.
PIPERACILINA/ TAZOBACTAM	75 mg./kg. c/ 6 hs.	50 mg/kg c/ 6 hs	50 mg/kg c/ 8 hs	50 mg/kg c/ 6 hs	DP:50- 75 mg/kg c/12h. Hemo: 50-75 mg/kg c/12h.
RIFAMPICINA	VER MANUAL	No ajustar			
TRIMETROPRIM+SULFAMETOXAZOL	VER MANUAL	No ajustar			DP/Hemo: Profilaxis: 2,5 mg /kg, dosis POSTD. Tratamiento: 5-10 mg /kg c/24 hs, dosis POSTD.
TEICOPLANINA	VER MANUAL	A partir del día 3 ajusta: 10 mg/kg c/48hs	A partir del día 3 ajusta: 3-6 mg/kg c/48 hs FGR < 10 mg/min:3-6 mg/kg c/72 hs		DP/Hemo: 10 mg/kg c/12 hs x 3 dosis , luego 3-6 mg/kg c/72 hs.
VANCOMICINA	VER MANUAL	10-15 mg/kg c/12 hs Y monitorizar vancocinemia	10-15 mg/kg c/ 24 hs y monitorizar vancocinemia	10 mg/kg c/24-48 hs y monitorizar vancocinemia	DP: 10 mg/kg . Hemo:10-15 mg/kg. y monitorizar vancocinemia
VORICONAZOL	VER MANUAL	No usar vía EV, contiene ciclodextrinas. Usar sólo si riesgo-beneficio lo justifica. Se recomienda vo			

ANTIMICROBIANO	DOSIS HABITUAL	AJUSTE EN EN ENFERMEDAD RENAL CRONICA FILTRADO GLOMERULAR (mL/min/1.73m2)			DOSIS EN TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL
		50-25	25-10	< 10	
IR. Insuficiencia renal/ DP: dialisis peritoneal/ Hemo: hemodialisis/ FG: filtrado glomerular/ EV: via endovenosa.					