

Lineær algebra noter - Unitær diagonalisering

Lukas Peter Jørgensen, 201206057, DA4

24. juni 2014

Indhold

Indhold	1
1 Disposition	1
2 Noter	1
2.1 Hermitiske matricer	1
2.2 Unitære matricer	1
2.3 Schurs theorem	1
2.4 Spektralsætningen	2

1 Disposition

1. TBD

2 Noter

2.1 Hermitiske matricer

$M = (m_{ij}) \in \mathbb{C}^{n,n}$. M er hermitisk såfremt matricen konjungeret og transponeret er lig sig selv. Dette skrives som $M = M^H$. En hermitisk matrix er det samme som en symmetrisk matrix for det reelle rum, blot for komplekse tal.

Desuden gælder der at egenverdierne af en hermitisk matrix alle er reelle.

2.2 Unitære matricer

En matrix $U \in \mathbb{C}^n$ er en unitær matrix hvis dens søjlevektorer udgør et ortonormalt sæt i \mathbb{C}^n .

En matrix er unitær hvis og kun hvis der gælder at $U^H U = I$.

2.3 Schurs theorem

For enhver $n \times n$ matrix A eksisterer der en unitær $n \times n$ matrix U , således at $U^H A U$ er øvre triangulær.

Vi beviser Schurs vha. induktion i n .

$n = 1$

At det gælder for $n = 1$ er trivielt da en 1×1 matrix pr. definition allerede er triangulær, og det derfor er let at finde en unitær matrix for dette tilfælde.

Induktionshypotese:

Som induktionshypotese antager vi at påstanden gælder for $k \times k$ matricer.

$n = k + 1$

Vi definerer A som en $k + 1 \times k + 1$ matrix, hvor λ_1 er en egen værdi og w_1 den tilhørende egenvektor.

Vha. Gram-Schmidt konstrueres en ortonormal basis for \mathbb{C}^{k+1} bestående af vektorerne $\{w_1, \dots, w_{k+1}\}$.

Hvis W så er en matrix med dette sæt som søjlevektorer, så er W unitær.

Den første søjle i $W^H A W$ er så:

$$W^H A w_1 = \lambda W^H w_1 = \lambda_1 e_1$$

Derved har matrixen $W^H A W$ formen:

$$W^H A W = \begin{bmatrix} [c|ccc]\lambda_1 & x_2 & \cdots & x_{k+1} \\ 0 & & & \\ \vdots & & M & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

Hvor M er en $k \times k$ matrix. Vha. induktionshypotesen ved vi der findes en unitær $k \times k$ matrix V_1 således at $V_1^H M V_1 = T_1$ er øvre triangulær.

Vi kan så danne V :

$$V = \begin{bmatrix} [c|ccc]1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & V_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

Som så vil være unitær g:

$$V^H W^H A W V = \begin{bmatrix} [c|ccc]\lambda_1 & x_2 & \cdots & x_{k+1} \\ 0 & & & \\ \vdots & & V_1^H M V_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [c|ccc]\lambda_1 & x_2 & \cdots & x_{k+1} \\ 0 & & & \\ \vdots & & T_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix} = T$$

T er så øvre triangulær. Vi lader nu $U = W V$. Da er U så unitær siden:

$$U^H U = (W V)^H W V = V^H W^H W V = I$$

Og $U^H A U = T$.

Note: Schur decomposition Faktoriseringen $A = U T U^H$ bliver ofte kaldt dekompositionen af A .

2.4 Spektralsætningen

Hvis A er hermitisk så eksisterer der en unitær matrix U der diagonaliserer A .

Vha. Schurs theorem ved vi at der eksisterer en unitær matrix U således at $U^H A U = T$, hvor T er øvre triangulær. Det følger derfor:

$$T^H = (U^H A U)^H = U^H A^H U = U^H A U = T$$

(Husk at $(ABC)^H = C^H B^H A^H$)

Altså er T hermitisk og må derved også være diagonal.

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & t_{nn} \end{bmatrix}, T^H = \begin{bmatrix} t_{11}^- & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 \\ t_{1n}^- & \cdots & t_{nn}^- \end{bmatrix}$$