

Das Sättigungstheorem: Axiomatische Zwangsbedingungen für Quantengravitation aus kosmologischer Relaxation

Lukas Geiger^{1,*}

¹*Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland[†]*

(Stand: 6. Juni 2026)

Wir formulieren vier minimale Axiome – endliche geometrische Kapazität, kooperative Verstärkung mit antisymmetrischer Erweiterung, monotone kosmische Kontrolle und Renormierungsgruppen-Komposition – als makroskopische Kandidatenbedingungen für jede Quantentheorie der Gravitation, deren kosmologischer Limes die allgemeine Relativitätstheorie mit einem beschränkten Relaxationsmechanismus reproduziert. Diese Axiome liefern eine Abel-Koordinatenbeschreibung eindimensionaler Sättigungsdynamik. Ein Tangens-hyperbolicus-Profil folgt, sobald der Sättigungsrand zusätzlich durch eine projektive Randquotienten-Normalisierung festgelegt wird: der Quotient $R(x) = (1+x)/(1-x)$ muss sich unter Komposition multiplizieren. Ohne diese Normalisierung lässt glatte Randregularität allein eine Familie glatter hyperbolischer Randkrägen zu, etwa Abel-Koordinaten der Form $\operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$. Das korrigierte *Sättigungstheorem* ist daher ein projektives Randkragen-Normalformtheorem: $S(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$ wird durch Skalenkohärenz plus projektiven Randquotienten ausgewählt, nicht durch bloße Glattheit allein. Große Quantengravitationsprogramme – Schleifen-Quantengravitation, Asymptotic Safety, String-/holographische Ansätze, Kausalmengentheorie und nichtkommutative Geometrie – liefern Motivation für A–D, wenn sie auf kosmologische Observablen eingeschränkt werden; D' bleibt dagegen eine separate diagnostische Normalisierung, die physikalisch erst herzuleiten ist. Unter diesen Hypothesen kann die $\tanh$ -Sättigungs-ODE $dX/da = k(1-X^2)$ des Curvature Relaxation Model als projektive Normalform kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation gelesen werden, wobei offen bleibt, welche UV-Vervollständigung k , Φ_0 und den projektiven Quotienten physikalisch festlegt.

* ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] Details zum Werkzeugeinsatz stehen in der KI-Offenlegung am Ende des Papers. Alle wissenschaftlichen Inhalte verantwortet ausschließlich der Autor. Paper V der CRM-Serie. Begleitarbeiten: [1–4].

I. EINLEITUNG

A. Das Problem

Die Vereinigung der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie bleibt das zentrale offene Problem der theoretischen Physik. Nach Jahrzehnten intensiver Forschung haben mehrere bedeutende Forschungsprogramme tiefe strukturelle Einsichten geliefert, ohne bislang auf eine einzige Theorie zu konvergieren:

- **Effective field theory (EFT) der Gravitation** berechnet zuverlässige Quantenkorrekturen bei niedrigen Energien, bietet aber keine UV-Vervollständigung [5].
- **Asymptotic Safety** sucht einen UV-Fixpunkt des Renormierungsgruppenflusses (RG) der Gravitation, wodurch die Theorie ohne neue Freiheitsgrade eingeschränkt wird [8–10].
- **Stringtheorie** bietet einen UV-endlichen Rahmen, der Gravitation automatisch enthält, sieht sich aber dem Landscape/Selection-Problem gegenüber [11].
- **Loop Quantum Gravity (LQG)** erreicht Hintergrundunabhängigkeit mit diskreten Geometrieoperatoren, hat aber Schwierigkeiten mit der Dynamik und dem klassischen Limes [12, 13].
- **Holographie/AdS-CFT** bietet eine nichtperturbative Definition der Quantengravitation im antide Sitter-Raum, mit unklarer Erweiterung auf realistische Kosmologie [14].
- **Causal Sets** postulieren diskrete Kausalstruktur als fundamental, mit dem Kontinuum als emergent [15, 16].
- **Noncommutative geometry** formuliert Geometrie als Spektraldaten neu und verbindet natürlich Operatoren und Raumzeit [17].

Orthogonal zu diesen UV-Vervollständigungsprogrammen beschränken die *Swampland-Vermutungen* [30] die Frage, welche niederenergetischen Theorien konsistent in die Quantengravitation eingebettet werden können, während die *EFT der Dark Energy* [31] Abweichungen von Λ CDM auf perturbativer Ebene parametrisiert. Kein Framework bestimmt jedoch die *funktionale Form* des kosmologischen Sättigungsprofils.

Eine bemerkenswerte Beobachtung ist, dass wenn eines der oben aufgelisteten UV-Vervollständigungsprogramme auf die Kosmologie angewendet wird, die resultierende effektive Dynamik häufig *Sättigungsverhalten* aufweist: einen begrenzten, kooperativen Ansatz zu einer maximalen geometrischen Konfiguration. Dieses Papier fragt, welche zusätzlichen Bedingungen diese wiederkehrende Struktur

auf eine Abel-Koordinate und schließlich auf einen tanh-Repräsentanten einengen.

B. Das CRM als empirischer Anker

Das Curvature Relaxation Model (CRM) [1–4] bietet einen konkreten, empirisch getesteten kosmologischen Rahmen, in dem Sättigungsdynamik eine zentrale Rolle spielt. Das Modell ersetzt die kosmologische Konstante Λ und partikuläre Dunkle Materie durch geometrische Krümmungsrückkehr und erreicht $\Delta\chi^2 = -5,5$ gegenüber Λ CDM auf gemeinsamen SN+CMB+BAO-Daten mit 6 Parametern und null Early Dark Energy [2]. Das gesamte Framework leitet sich aus einer einzelnen dynamischen Gleichung ab:

$$\frac{dX}{da} = k(1 - X^2), \quad (1)$$

wobei $X = \Omega_\Phi/\Phi_0$ das normalisierte Krümmungsrückkehrpotential ist und a der Skalenfaktor ist. Die Lösung $X(a) = \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ bietet Spätzeit-Beschleunigung (“Dunkle Energie”) in ihrer gesättigten Phase und gravitatives Gerüst (“Dunkle Materie”) in ihrer ungesättigten Phase [2].

Paper III [3] leitet diese ODE aus der effektiven Lagrangedichte $\mathcal{L}_{\text{CRM}} = R/(16\pi G) + \gamma\mathcal{F}(T/\rho)R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi)$ ab, wobei $V_{\text{PT}}(\phi) = V_0/\cosh^2(\phi/\phi_0)$ ein Pöschl-Teller-Potential ist. Paper III untersucht auch fünf UV-Vervollständigungskandidaten (LQG, Finsler-Geometrie, informationstheoretische Raumzeit, Causal Sets, Quanten-Fehlerkorrektur) und beobachtet, dass alle ODE-Strukturen der Form $dX/dt \propto (1 - X^2)$ produzieren.

Das vorliegende Papier ordnet diese Beobachtung als *strukturelle Analogie mit konditionalem Normalformgehalt* ein: die vier physikalisch motivierten Axiome liefern ein Abel-Koordinatengesetz der Sättigung, und die zusätzliche projektive Randquotienten-Normalisierung wählt den tanh-Repräsentanten aus.

C. Umfang und Struktur

Das zentrale Ergebnis ist das *Saturation Theorem* (Theorem 1): Die Axiome A–D reduzieren zusammen mit der signierten Antisymmetrie B’ und der inneren Gruppenform $D^\pm$ die effektive kosmologische Antwort auf eine Abel-Koordinate, während die projektive Randquotienten-Normalisierung D’ die tanh-Normalform bis auf Umparametrisierung eindeutig auswählt. Das Papier ist wie folgt strukturiert:

- Section II: Formulierung der vier Axiome.
- Section III: Aussage und Beweis des Saturation Theorem.

- Section IV: Ausschluss alternativer Sättigungsprofile.
- Section V: Verifikation der Axiome in bedeutenden QG-Programmen.
- Section VI: Ontologische Implikationen: Raumzeit als geordnete Phase.
- Section VII: Beobachtungsfolgerungen und offene Fragen.
- Section VIII: Diskussion und Ausblick.

II. DIE VIER AXIOME

Wir formulieren die Axiome in Begriffen einer effektiven Antwortfunktion $S_T(g)$, wobei T eine Quantengravitationstheorie bezeichnet und g ein effektiver Kopplungs-/Krümmungs-/Rückkopplungsparameter ist, der die “Entfernung” von UV zu IR misst. Die Funktion $S_T(g)$ kodiert, wie die geometrische Ausgabe der Theorie (Krümmung, Expansionsrate, geometrische Ordnung) auf g reagiert.

A. Axiom A: Endliche geometrische Kapazität

Axiom 1 (Endliche geometrische Kapazität). *Pro Hubble-Patch existiert eine endliche maximale geometrische Ordnung $C_{\max} < \infty$. Äquivalent ist die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ global beschränkt:*

$$0 \leq S_T(g) < S_{\max} < \infty \quad \forall g \geq 0. \quad (2)$$

Physikalischer Inhalt. Dieses Axiom schließt unendliche Krümmung, unendliche Informationsdichte und UV-Divergenzen aus. Es ist extrem schwach: es gilt in LQG (endliche Flächenquanta [12]), in Holographie (Bekenstein-Schranke [18]), in quantenmechanisch fehlerkorrigierender Raumzeit (endliche Code-Kapazität [19]), in Causal Set-Theorie (endliche Dichte [15]) und in Asymptotic Safety (endliche effektive Wirkung am UV-Fixpunkt [9]).

Ohne endliche Kapazität ist Quantengravitation per Definition instabil: unbegrenzte geometrische Konfigurationen entsprechen Singularitäten, die jedes QG-Programm aufzulösen anstrebt.

Verbindung zum CRM. Die Sättigungsamplitude Φ_0 im CRM [1] ist die physikalische Realisierung von $S_{\max}$. Das Pöschl-Teller-Potential $V(\phi) = V_0 / \cosh^2(\phi/\phi_0)$ erzwingt dynamisch $\Omega_\Phi \leq \Phi_0$ [3].

B. Axiom B: Kooperative Verstärkung

Axiom 2 (Kooperative Verstärkung). *Existierende geometrische Ordnung erleichtert weitere Ordnung. Die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ ist glatt (C^∞) für $g \geq 0$*

mit einer lokalen Expansion bei $g = 0$:

$$S_T(g) = c_1 g + c_3 g^3 + \mathcal{O}(g^5), \quad c_1 > 0. \quad (3)$$

Die ungerade-Potenz-Struktur spiegelt den katalytischen Charakter der Antwort: die Rate der geometrischen Ordnung ist proportional sowohl zur bestehenden geordneten Fraktion als auch zur verbleibenden Kapazität.

Physikalischer Inhalt. Dieses Axiom kodiert den kooperativen, selbstverstärkenden Charakter der geometrischen Ordnung. Es ist das gravitative Analogon der ferromagnetischen Ordnung, bei der ausgerichtete Spins weitere Ausrichtung erleichtern. Formal stellt die Bedingung $c_1 > 0$ sicher, dass die Antwort für kleine Perturbationen positiv (Ordnung, nicht Desordnung) ist, während die ungerade-Potenz-Struktur mit der antisymmetrischen Erweiterung konsistent ist (Axiom B’).

Ohne kooperative Verstärkung gäbe es keine klassische Raumzeit: eine lineare oder antikooperative Antwort kann nicht die langlebigen, großräumigen geometrischen Strukturen des Universums erzeugen. Der kooperative Charakter ist analog zum spontanen Symmetriebruch in der Festkörperphysik: lokale Ordnung sät weitere Ordnung, treibt das System zu einem global geordneten Zustand (Sättigung).

Verbindung zum CRM. Die Sättigungskopplung k in der CRM-ODE (1) ist c_1 . Das spieltheoretische Gleichgewicht aus Paper I [1] bietet die thermodynamische Motivation: der Konzentrationsgradient G des Nullraums treibt kooperative Ordnung, bis die Raumzeit-Blase sättigt.

Eine Begleitbedingung erweitert den Bereich von S_T auf negative Argumente, was die gruppentheoretische Klassifizierung von Schritt 2 im Beweis ermöglicht:

Axiom 3 (Antisymmetrische Erweiterung (B’)). *Die Antwortfunktion S_T lässt eine glatte antisymmetrische Erweiterung auf alle $g \in \mathbb{R}$ zu:*

$$S_T(-g) = -S_T(g) \quad \forall g. \quad (4)$$

Physikalischer Inhalt. Die Antisymmetrie hat drei komplementäre Motivationen:

(i) *Vorzeichenkovarianz der Antwort.* Der Parameter g ist keine “Entfernung” (die per Definition nicht-negativ wäre), sondern eine *vorzeichenbehaftete Abweichung* von einem symmetrischen Referenzzustand. Im CRM parametrisiert g die Krümmungsperturbation relativ zum de Sitter-Hintergrund; positives g entspricht überdichten Perturbationen, die geometrische Ordnung verstärken, negatives g zu unterdichten Regionen, die sie reduzieren. Vorzeichenkovarianz ($S_T(-g) = -S_T(g)$) besagt dann, dass die Antwortfunktion über- und unterdichte Regionen symmetrisch in Magnitude behandelt – eine natürliche physikalische Anforderung ohne symmetriebrechenden Mechanismus in der Antwort selbst. Wir betonen, dass Axiom B’ *nicht* eine Aussage über kosmologische Zeitumkehrsymmetrie ist (die durch die Expansion

gebrochen ist); es ist eine Beschränkung der funktionalen Form der Antwort unter $g \rightarrow -g$.

(ii) *Präzedenzfälle in der Physik.* Vorzeichenkovarianz von Antwortfunktionen ist ubiquitär: in der Elektrodynamik die Polarisierung $P(-E) = -P(E)$ für zentrosymmetrische Medien; im Magnetismus $M(-H) = -M(H)$ für die paramagnetische/ferromagnetische Antwort; in der Renormalisierungsgruppe sind Beta-Funktionen dimensionsloser Kopplungen ungerade Funktionen der Kopplungsabweichung von einem Fixpunkt. Die Antisymmetrie von Axiom B' ist das gravitative Analogon dieser wohlbekannten Symmetrien.

(iii) *Mathematische Rolle.* Zusammen mit der ungerade-Potenz-Struktur von Axiom B erweitert B' das Kompositionsgesetz von der Halbgerade $[0, S_{\max})$ zu einer vollständigen Gruppenoperation auf $(-S_{\max}, S_{\max})$, die für die Abel-Gleichungsklassifizierung wesentlich ist. Ohne B' steht nur eine Halbgruppen-Struktur zur Verfügung, und das Abel-Darstellungsargument von Schritt 2 gilt nicht in derselben Form. Wir beachten, dass dies eine explizite Annahme ist, keine abgeleitete Konsequenz; ihre Lockerung führt zu alternativen Kompositionsstrukturen (z.B. $C(x, y) = x + y - xy$ auf $[0, 1)$), weshalb sie als separates Axiom erscheint, statt in Axiom B subsumiert zu werden.

C. Axiom C: Monotone kosmische Kontrolle

Axiom 4 (Monotone kosmische Kontrolle). *Die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ ist monoton wachsend mit Sättigung im Unendlichen:*

$$S'_T(g) \geq 0, \quad \lim_{g \rightarrow \infty} S_T(g) = S_{\max}. \quad (5)$$

Es gibt genau eine relevante Richtung (Kontrollparameter), die den Übergang von niedriger zu hoher geometrischer Ordnung regiert.

Physikalischer Inhalt. Dies schließt oszillierende, Multi-Fixpunkt- oder chaotische geometrische Dynamik aus. Es garantiert:

- Eine eindeutige Zeitrichtung (thermodynamischer Pfeil).
- Kein “Springen” zwischen geometrischen Phasen.
- Stabile Expansion zu einem de Sitter-Attraktor.

Im CRM ist der Kontrollparameter der Skalenfaktor a ; in RG-Sprache entspricht er der einzelnen relevanten Richtung, die vom UV-Fixpunkt zum IR fließt [10]. Axiom C wird verletzt durch zyklische Kosmologien und durch Modelle mit mehreren stabilen Vakua – beide denen ein eindeutiger thermodynamischer Pfeil fehlt. Wir beachten, dass Axiom C eine Einschränkung auf den *kosmologischen Sektor* mit einem einzelnen dominanten Übergang ist: es behandelt nicht die String-Landschaft

(wo Tunneln zwischen metastabilen Vakua zu nicht-monotonen Trajektorien führt) oder stochastische Inflation (wo lokale Fluktuationen die Monotonie brechen). Diese Szenarios betreffen mehrere effektive Kontrollparameter oder stochastische Dynamik und liegen außerhalb des Bereichs des Einfeld-, deterministischen Axiom-Systems. Das Theorem sollte so gelesen werden: A–D liefern zusammen mit B' und der inneren Gruppenform $D^\pm$ eine Abel-/Randkragenklasse für einen einzelnen deterministischen Sättigungskanal; erst D' wählt den projektiven tanh-Repräsentanten aus.

Verbindung zum CRM. Die Monotonie von $\Omega_\Phi(a)$ ist eine direkte Konsequenz der ODE (1): da $1 - X^2 > 0$ für $|X| < 1$ ist, ist die Lösung streng wachsend.

Bemerkung 1 (Axiom-Interdependenz). *Wie in Corollary 1 gezeigt, folgt Monotonie (Axiom C), sobald Axiom D in seiner inneren Gruppenform $D^\pm$ verwendet wird. Wir behalten dennoch Axiom C als explizite Aussage für physikalische Transparenz: es verbindet sich direkt mit dem thermodynamischen Zeitpfeil und macht den Ausschluss von oszillierender/chaotischer Kosmologie auf der Axiom-Ebene sichtbar. Der logische Gehalt des Axiom-Systems ist daher: A, B/B' und das verstärkte Kompositionsgesetz $D^\pm$ implizieren C; ohne diese innere Gruppenbedingung bleibt C ein explizites Axiom.*

D. Axiom D: Renormalisierungsgruppenkomposition

Axiom 5 (Renormalisierungsgruppenkomposition). *Es existiert eine Skalenkomposition $g \mapsto g_1 \oplus g_2$ (“zwei RG-Schritte in Abfolge”) derart, dass die Antwortfunktion kompositionell kohärent ist:*

$$S_T(g_1 \oplus g_2) = C(S_T(g_1), S_T(g_2)), \quad (6)$$

wobei C eine glatte, kommutative, assoziative Komposition mit neutralem Element 0 und absorbierendem Rand $S_{\max}$ ist:

$$C(S, 0) = S, \quad C(S, S_{\max}) = S_{\max}. \quad (7)$$

Überdies erstreckt sich C glatt (d.h. C^∞) auf das abgeschlossene Quadrat $[0, S_{\max}]^2$. Im folgenden Satz wird D in seiner antisymmetrischen inneren Gruppenform $D^\pm$ verwendet: Nach Normalisierung durch $S_{\max}$ und Erweiterung durch B' ist die Einschränkung $C : (-1, 1)^2 \rightarrow (-1, 1)$ kürzbar und in jedem Argument strikt monoton, und jede Translation $y \mapsto C(x, y)$ ist ein glatter Diffeomorphismus mit Inverser $y \mapsto C(-x, y)$. Dies ist eine zusätzliche Annahme über einen eindimensionalen deterministischen Kanal, nicht eine Konsequenz des bloßen positiven Rand-Halbgruppengesetzes allein.

Bemerkung 2 (Randkragen-Guardrail). *Die Glattheitsklausel in Axiom D wird im Folgenden nicht als Eindeutigkeitsbehauptung für arctanh verwendet. Die Abel-Koordinate*

$$\phi_\varepsilon(x) = \operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$$

induziert eine glatte assoziative Komposition auf dem offenen Intervall und liefert über

$$q_\varepsilon(x) = e^{-2\phi_\varepsilon(x)} = \frac{1-x}{1+x} e^{-2\varepsilon x}$$

einen glatten positiven Randkragen. Bloße Glattheit der positiven Sättigungsfläche wählt daher eine hyperbolische Randkragenklasse, aber keine eindeutige projektive Koordinate. Die tanh-Normalform wird erst dann ein Theorem, wenn der projektive Randquotient explizit festgelegt wird.

Axiom 6 (Projektive Randquotienten-Normalisierung (D')). Für die normalisierte Antwort $x = S/S_{\max} \in (-1, 1)$ ist der projektive Randquotient

$$R(x) := \frac{1+x}{1-x}$$

unter Komposition multiplikativ:

$$R(C(x, y)) = R(x)R(y). \quad (8)$$

Äquivalent ist das Verhältnis der Abstände zu den beiden Sättigungsflächen die additive Arbeits-/Rapiditätskoordinate des eindimensionalen Antwortkanals.

Physikalischer Status von D'. D' wird hier nicht aus Schleifen-Quantengravitation, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets, CDT oder nichtkommutativer Geometrie hergeleitet. Es ist eine projektive Response-Bilanzannahme: Die physikalisch komponierte Größe ist das Verhältnis von realisierter Ordnung zu verbleibender Kapazität, analog zu einer Log-Odds- oder Rapiditätskoordinate. Für jedes UV-Kandidatenprogramm ist der diagnostische Defekt

$$\Delta_{D'}(x, y) := \log R(C(x, y)) - \log R(x) - \log R(y),$$

der für den exakten projektiven tanh-Repräsentanten verschwinden muss. $\Delta_{D'} = 0$ aus einer mikroskopischen Theorie herzuleiten bleibt eine offene physikalische Aufgabe.

Physikalischer Gehalt von D. Axiom D ist das tiefste Kompositionsaxiom. Es besagt, dass die geometrische Antwort *selbstkonsistent unter Vergrößerung* sein muss: das Universum auf zwei aufeinanderfolgenden Skalen zu beobachten und die Ergebnisse zu kombinieren muss dieselbe Antwort ergeben wie die direkte Beobachtung auf der kombinierten Skala. Dies ist die definierende Eigenschaft einer Renormierungsgruppe.

Das Kompositionsgesetz (6) kodiert die Anforderung, dass die Theorie *skala-kohärent* im folgenden präzisen Sinne sein muss: die Antwortfunktion S_T ist ein Homomorphismus von der additiven Struktur des Kontrollparameters zur Kompositionsalgebra von Antworten; d.h. keine bevorzugte Skala existiert, auf der diese Homomorphismus-Eigenschaft abbricht oder ihren Charakter ändert. Die absorbierende Randbedingung

$C(S, S_{\max}) = S_{\max}$ spiegelt die Tatsache, dass vollständig gesättigte Geometrie nicht weiter geordnet werden kann – sie ist ein Fixpunkt.

Die C^∞ -Erweiterungsanforderung hat eine direkte physikalische Interpretation: sie verlangt, dass das Kompositionsgesetz *auch nahe der Sättigung* wohlverhalten bleibt. In physikalischen Begriffen bedeutet dies, dass der Ansatz zur geometrischen Kapazitätsgrenze glatt ist und keine neuen Divergenzen oder kritischen Exponenten einführt. Drei physikalische Argumente stützen diese Anforderung:

(a) *Keine neue Phasenübergang bei Sättigung.* Eine Komposition, die singuläre Ableitungen am Rand entwickelt, würde einen Phasenübergang *innerhalb* des Sättigungsprozesses selbst signalisieren – d.h. der Sättigungsmechanismus würde gerade dort zusammenbrechen, wo er am meisten benötigt wird. Die Glattheitsbedingung schließt solch pathologisches Verhalten aus. Dies unterscheidet sich von Phasenübergängen beim *Beginn* der Sättigung (die erlaubt sind und der Übergangsepoche a_{trans} des CRM entsprechen); die Randregularität betrifft das *vollständig gesättigte* Regime.

(b) *Unterscheidung von kritischen Phänomenen.* Während kritische Exponenten und divergente Suszeptibilitäten Phasenübergänge bei endlicher Temperatur charakterisieren (der Curie-Punkt in Ferromagneten, T_c in Supraflüida), ist die Sättigungsgrenze $S \rightarrow S_{\max}$ ein *asymptotisches* Regime ($g \rightarrow \infty$), kein kritischer Punkt. In der ferromagnetischen Analogie entspricht dies $T \rightarrow 0$ (vollständige Ausrichtung), nicht $T \rightarrow T_c$ (kritische Fluktuationen). Der Null-Temperatur-Limes der Magnetisierung *ist* glatt ($M \rightarrow M_s$ exponentiell in Mean-Field-Theorie und als Potenzgesetz bei niedrigerem T , aber ohne divergente Ableitungen der *Komposition* von Magnetisierungen). Die C^∞ -Anforderung ist daher physikalisch angemessen für die Sättigungsgrenze.

(c) *Analytizität des Vakuumzustands.* In der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum ein analytischer Zustand: alle Korrelationsfunktionen im Vakuum sind glatt. Da vollständige Sättigung ($S = S_{\max}$) den geometrischen Analogon des Vakuums darstellt (der maximal geordnete Zustand), sollte die Komposition von Antworten nahe diesem Zustand die Glattheit des Vakuums erben.

Verbindung zum CRM. Im CRM entsteht das Kompositionsgesetz aus der thermodynamischen Struktur: das Krümmungsrückkehrpotential Ω_Φ bei Skala $a_1 \cdot a_2$ wird durch die Potentiale bei a_1 und a_2 durch die Gruppeneigenschaft der Sättigungs-ODE bestimmt. Die tanh-Funktion erfüllt $\tanh(u_1 + u_2) = (\tanh u_1 + \tanh u_2)/(1 + \tanh u_1 \tanh u_2)$, was genau ein Kompositionsgesetz der geforderten Form mit $C(x, y) = (x + y)/(1 + xy/S_{\max}^2)$ ist.

III. DAS SATURATION THEOREM

A. Aussage

Theorem 1 (Saturation Theorem, projektive Randkrangenform). *Sei T eine Theorie, deren effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ die Axiome A–D, die Antisymmetrie-Bedingung B' und die bei Axiom D beschriebene innere Gruppenform $D^\pm$ erfüllt. Dann besitzt die normalisierte Antwort $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max}$ eine ungerade Abel-Koordinate $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit*

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y).$$

Wenn zusätzlich die projektive Randquotienten-Normalisierung D' gilt, dann existieren Konstanten $\alpha > 0$, $S_{\max} > 0$ und eine strikt monotone Umparametrisierung $u = u(g)$ mit $u(0) = 0$, so dass

$$S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g)). \quad (9)$$

Das Kompositionsgesetz ist dann als relativistische Geschwindigkeitsaddition $C(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ bestimmt, bis auf Reskalierung durch $S_{\max}$. Ohne D' bestimmen diese Voraussetzungen die Abel-/Randkrangenstruktur, schließen aber nicht alle glatten nichtprojektiven Randkrägen aus.

Tabelle I trennt die logischen Schichten des korrigierten Resultats. Dadurch wird verhindert, dass die Kompatibilitätsdiskussion in Abschnitt V und die empirischen Bemerkungen in Abschnitt VII als Beweis des projektiven Quotienten gelesen werden.

B. Zentrale Lemmata

Die Eindeutigkeit von $\operatorname{arctanh}$ beruht auf einem projektiven Quotienten, nicht auf Glattheit allein.

Lemma 1 (Projektiver Quotient wählt $\operatorname{arctanh}$). *Sei C ein stetiges, strikt monotones, kommutatives und assoziatives Gruppengesetz auf $(-1, 1)$ mit Neutralelement 0. Angenommen, C besitzt eine Abel-Koordinate ϕ ,*

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y),$$

und erfüllt das projektive Quotientengesetz (8). Dann existiert $c > 0$ derart, dass

$$\phi(x) = c \operatorname{arctanh}(x), \quad C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

Proof. Setze $L(x) := \frac{1}{2} \log((1+x)/(1-x)) = \operatorname{arctanh}(x)$. Nach D' gilt

$$L(C(x, y)) = L(x) + L(y).$$

Damit ist $F(t) := \phi(\tanh t)$ eine stetige additive Funktion von $t = L(x)$, also $F(t) = ct$ für ein $c > 0$. Folglich gilt $\phi(x) = cL(x) = c \operatorname{arctanh}(x)$, und Auflösen von $L(C) = L(x) + L(y)$ ergibt $C(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$. $\square$

Bemerkung 3 (Warum D' nötig ist). *Die Familie $\phi_\varepsilon(x) = \operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$ ist für kleines ε ungerade, glatt und strikt wachsend, divergiert am Rand und induziert über $q_\varepsilon = e^{-2\phi_\varepsilon}$ einen glatten positiven Sättigungskragen. Die alte Behauptung, C^∞ -Randregularität allein schließt alle nicht- $\operatorname{arctanh}$ -Abel-Koordinaten aus, war daher zu stark. Das korrigierte Theorem verwendet D' als mathematische und physikalische Normalisierung, die diese Rand-Gauge-Freiheit entfernt.*

C. Beweis des Saturation Theorems

Der Beweis verläuft in drei Schritten.

Schritt 1: *Herleitung der Funktionalgleichung.* Definiere die normalisierte Antwort $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max} \in [0, 1]$. Die Axiome A und C garantieren, dass σ beschränkt und monoton wachsend ist. Axiom D [Gl. (6)] fordert die Existenz einer Komposition:

$$\sigma(g_1 \oplus g_2) = C(\sigma(g_1), \sigma(g_2)), \quad (10)$$

wobei $C : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ kommutativ, assoziativ, mit Neutralelement 0 und absorbierendem Rand 1 ist.

Schritt 2: *Reduktion auf Abels Gleichung.* Nach Axiom B hat σ die lokale Entwicklung (3) mit $c_1 > 0$. Axiom B' [Gl. (4)] liefert die ungerade Erweiterung $\sigma(-g) = -\sigma(g)$. Zusammen mit der inneren Gruppenform $D^\pm$ von Axiom D ergibt dies eine glatte kürzbare Gruppenoperation auf $(-1, 1)$, deren absorbierende Ränder bei ± 1 nur als Grenzflächen behandelt werden.

Unter $D^\pm$ definieren die Assoziativitätsbedingung $C(C(x, y), z) = C(x, C(y, z))$ und Kommutativität ein *einparametrisches stetiges Gruppengesetz* auf $(-1, 1)$ (die Taylorentwicklung am Ursprung definiert ein eindimensionales kommutatives formales Gruppengesetz im Sinne von [21]; hier ist die Verbindung, dass jede glatte, assoziative, kommutative binäre Operation auf einer Umgebung von $0 \in \mathbb{R}$ mit Neutralelement 0 durch Taylorentwicklung ein formales Gruppengesetz über $\mathbb{R}$ ist, und umgekehrt wendet sich Aczél's analytischer Satz auf die konvergente Realisierung dieser formalen Struktur auf dem Intervall $(-1, 1)$ an). Wir wenden Aczél's Darstellungssatz [20] auf das *offene Intervall* $(-1, 1)$ an, wobei C glatt und strikt monoton in jedem Argument ist und das Neutralelement 0 im Inneren liegt. Die absorbierenden Randbedingungen $C(x, \pm 1) = \pm 1$ sind *nicht* Teil des Definitionsbereichs, auf den Aczél's Satz angewendet wird; sie werden als Grenzverhalten behandelt. Konkret ergibt Aczél's Satz eine stetige, strikt monotone Funktion $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\phi(0) = 0$. Die absorbierenden Randbedingungen implizieren dann $\phi(x) \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow 1^-$ und $\phi(x) \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow -1^+$ (da $C(x, y) \rightarrow 1$ für $y \rightarrow 1$ impliziert, dass $\phi(x) + \phi(y) \rightarrow \infty$, was $\phi(y) \rightarrow \infty$ erfordert):

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y). \quad (11)$$

Dies ist Abels Funktionalgleichung. Aczél's Satz ergibt, dass ϕ stetig ist; da C glatt ist (Axiom D) und $\phi'(0) =$

TABLE I. Proof-Status-Ledger für das korrigierte Saturation Theorem.

Schicht	Input	Output	Status / Nicht-Behauptung
A–D, B', $D^\pm$	Beschränkte, kooperative, signierte eindimensionale innere Komposition	Ungerade Abel-Koordinate und hyperbolische Randkragenklasse	Theorem-Level, bedingt auf die Ein-Kanal-Hypothesen; noch kein eindeutiges tanh-Profil.
D'	Projektiver Randquotient $R(C) = R(x)R(y)$	Kanonischer tanh-Repräsentant und Geschwindigkeitsadditionsgesetz	Zusätzliche Normalisierung; diagnostisch geführt, hier nicht aus einem UV-Programm hergeleitet.
QG-Programmkarte	LQG, Asymptotic Safety, Holographie, Causal Sets, CDT und NCG	Kompatibilitätsmuster für A–D, $D^\pm$ und D'	Motivation und Filter; keine Verifikation, dass ein Programm alle Inputs erfüllt.
CRM-Datenanker	Bestehender CRM-Fit und monotone Übergangsevidenz	Empirische Motivation für Sättigungsdynamik	Kein unabhängiger Test dieses Theorems, weil das CRM bereits ein tanh-Profil nutzte.
Gestörte Erweiterungen	Mehrfeld-, stochastische, EFT- oder UV–IR-Matchingdefekte	Künftiger Residuum-/Gap-Test $r_X/g_X \ll 1$	Empfohlene Stabilitätserweiterung; nicht Teil des aktuellen Beweises.

$c_1 > 0$ (Axiom B), zeigt die Differentiation von (11), dass ϕ die C^∞ -Regularität von C auf $(-1, 1)$ erbt. Die Funktion ϕ ist bis auf eine positive multiplikative Konstante bestimmt; die Antisymmetrie (Axiom B') erlaubt, sie ungerade zu wählen. An diesem Punkt liefern die Axiome A–D ein Abel-/Randkragen-Theorem, aber noch nicht $\phi = \arctanh$.

Schritt 2b: Projektive Randnormalisierung. Wenn zusätzlich die Normalisierung D' gilt, liefert Lemma 1 $\phi = c \arctanh$. Dies ergibt das Kompositionsgesetz:

$$C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad (12)$$

was die relativistische Geschwindigkeitsadditionsformel ist. Die Eindeutigkeit ist daher projektiv: sie ist Eindeutigkeit nach Fixierung des Randquotienten $R = (1 + x)/(1 - x)$, nicht Eindeutigkeit aus bloßer Glattheit aller Abel-Krägen.

Schritt 3: Invertierung zu tanh. Da $\phi(\sigma(g)) = c \arctanh(\sigma(g))$ eine additive Funktion des Kontrollparameters sein muss (d.h., $\phi(\sigma(g)) = \alpha u(g)$ für eine Umparametrisierung u und eine Konstante $\alpha > 0$), erhalten wir:

$$\sigma(g) = \tanh(\alpha u(g)), \quad (13)$$

und daher $S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$, nachdem die positive Konstante c in αu absorbiert wurde. Wenn die Axiome A–D, B', $D^\pm$ und D' exakt gelten, ist das Resultat exakt. Approximative Axiom-Erfüllung (z.B. Zusammenbruch des Kompositionsgesetzes bei sehr kleinem g , wo Standardgravitation dominiert) würde Korrekturen einführen; eine formale Stabilitätsanalyse solcher Störungen ist ein offenes Problem. $\square$

Korollar 1 (Monotonie aus dem inneren Gruppengesetz). *Unter der inneren Gruppenform $D^\pm$ von Axiom D folgt Axiom C (monotone kosmische Kontrolle) aus den Axiomen A, B, B' und D. Das heißt, jede Antwortfunktion, die $A + B + B' + D^\pm$ erfüllt, ist auf dem eindimensionalen Kanal automatisch strikt monoton wachsend.*

Beweis. Wähle die additive Koordinate der eindimensionalen Kontrollkomposition, so dass die Kanalkomposition nahe der Identität als $g + h$ geschrieben wird. Differenziere $\sigma(g + h) = C(\sigma(g), \sigma(h))$ bezüglich h an der Stelle $h = 0$:

$$\sigma'(g) = \partial_2 C(\sigma(g), 0) \cdot \sigma'(0).$$

Definiere $a(x) := \partial_2 C(x, 0)$. Nach $D^\pm$ ist für jedes feste $x \in (-1, 1)$ die Abbildung $y \mapsto C(x, y)$ ein C^∞ Diffeomorphismus von $(-1, 1)$ (sein Inverses ist $y \mapsto C(-x, y)$ aus dem Gruppen-Inversen). Daher gilt $\partial_2 C(x, 0) = a(x) \neq 0$ für alle $x \in (-1, 1)$. Da $(-1, 1)$ zusammenhängend ist und $a(0) = \partial_2 C(0, 0) = 1 > 0$ (aus $C(0, y) = y$), impliziert Stetigkeit $a(x) > 0$ für alle x . Mit $\sigma'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B) erhalten wir $\sigma'(g) = a(\sigma(g)) \cdot c_1 > 0$ für alle g . $\square$

Bemerkung 4. *Dies bedeutet, dass das Axiom-System auf A, B/B' und $D^\pm$ plus die abgeleitete Konsequenz C reduziert werden kann, sobald das eindimensionale innere Gruppengesetz physikalisch gerechtfertigt ist. Wir behalten Axiom C als separate Aussage für physikalische Transparenz: sie macht die Monotonie-Annahme explizit und verbindet sich direkt mit dem thermodynamischen Pfeil der Zeit. Ohne $D^\pm$ ist sie als unabhängige Ein-Kanal-Annahme zu lesen.*

Proposition 1 (Nicht-Redundanz der Axiome). *Die folgenden Beispiele zeigen, dass die genannten Klauseln nicht redundant sind. Da Axiom D im beschränkten Antwortraum formuliert ist, ist Punkt (1) als algebraisches Beispiel für die innere Komposition nach Entfernen der Kapazitätsschranke zu lesen, nicht als vollständiges Modell des endlich-kapazitiven Systems.*

(1) *Verletzt A, erfüllt B/B' und den algebraischen inneren Kompositionsteil von D: $\sigma(g) = g$ (unbegrenzte lineare Antwort; $C(x, y) = x + y$, assoziativ und kommutativ).*

(2) *Verletzt B', erfüllt A, C, D: $\sigma(g) = 1 - e^{-g}$ für $g \geq 0$,*

mit $C(x, y) = x + y - xy$ (probabilistisches Oder); keine antisymmetrische Erweiterung.

(3) Verletzt C , erfüllt $A, B/B'$ aber nicht $D^\pm$: $\sigma(g) = \tanh(g) \cdot \cos(\epsilon g)$ für kleine $\epsilon > 0$; beschränkt, antisymmetrisch, glatt mit $\sigma'(0) > 0$, aber nicht-monoton für $g \gg 1$. Dieses Beispiel zeigt, dass C unabhängig von $\{A, B, B'\}$ allein ist. Aber nach Korollar 1 ist C nicht unabhängig von $\{A, B, B', D^\pm\}$ gemeinsam – es folgt unter dem inneren Gruppengesetz als abgeleitete Konsequenz. Daher bleibt C für physikalische Klarheit und zur expliziten Markierung des Ein-Kanal-Pfeils erhalten.

(4) Verletzt D , erfüllt $A-C, B'$: $\sigma(g) = (2/\pi) \arctan(g)$; beschränkt, monoton, antisymmetrisch, aber seine induzierte Komposition (über $\phi = \tan(\pi x/2)$) entwickelt divergente zweite Ableitungen ($\sim \epsilon^{-1}$) am Rand von $[-1, 1]^2$, was die C^∞ -Erweiterungs-Anforderung von Axiom D verletzt. Ähnlich hat $\sigma(g) = g/\sqrt{1+g^2}$ (mit $\phi(x) = x/\sqrt{1-x^2}$) divergente zweite Ableitungen am Rand ($\sim \epsilon^{-1/2}$).

D. Interpretation

Der Satz sagt aus, dass $\tanh$ keine bloße Modellwahl ist, sondern der kanonische projektive Repräsentant eines eindimensionalen Abel-Sättigungskanals. Der mathematische Schlüsseleinsblick ist zweistufig: Axiom D erzwingt, dass die Antwortfunktion die Inverse einer Abel-Koordinate ist, und D' fixiert den sonst freien Randkragen dadurch, dass der projektive Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ multiplikativ ist.

Physikalisch sagt der Satz aus:

Jede Quantengravitationstheorie, die skalenkohärent, kooperativ, beschränkt, monoton ist und deren Sättigungsrand durch den projektiven Quotienten normalisiert wird, muss kosmologische Sättigungsdynamik vom tanh-Typ erzeugen. Ohne diese Quotienten-Normalisierung liefert das Theorem eine Abel-/Randkragenklasse statt eines eindeutigen Profils.

Die Umparametrisierung $u(g)$ absorbiert die mikroskopischen Details der Theorie: verschiedene UV-Vervollständigungen entsprechen verschiedenen Funktionen $u(g)$. Die gemeinsame Form $\tanh(\alpha u)$ wird erst erzwungen, wenn das projektive Randverhältnis als physikalische Kompositionsvariable identifiziert wurde.

IV. AUSSCHLUSS ALTERNATIVER SÄTTIGUNGSPROFILE

Korollar 2 (Ausschluss alternativer Sättigungsprofile). *Keines der folgenden Profile kann die strukturellen Voraussetzungen des Theorems plus die projektive Normalisierung D' gleichzeitig erfüllen, außer wenn es durch*

zulässige Reparametrisierung $u(g)$ auf die tanh-Form reduzierbar ist:

(i) **Logistisches Profil:** $S_{\max}/(1 + e^{-\beta u})$.

(ii) **Rationales Profil:** $S_{\max} u/(1 + u)$.

(iii) **Arkustangens-Profil:** $S_{\max} (2/\pi) \arctan(\beta u)$.

(iv) **Harte Sättigung:** $S_{\max} \min(u, 1)$.

Beweis. Jedes Alternative verletzt ein spezifisches Axiom:

(i) *Logistisch.* Die logistische Funktion $L(u) = 1/(1 + e^{-\beta u})$ hat $L(0) = 1/2 \neq 0$, was die Bedingung des neutralen Elements verletzt. Die verschobene Logistik $\tilde{L}(u) = (L(u) - 1/2) \cdot 2$ ergibt $\tilde{L}(u) = \tanh(\beta u/2)$ – genau die tanh-Form. Daher ist jedes “logistische” Modell, das Axiom D erfüllt, in Wirklichkeit $\tanh$ in versteckter Form.

(ii) *Rational.* Die Funktion $R(u) = u/(1 + u)$ hat Abel-Transformation $\phi(x) = x/(1 - x)$, die $C(x, y) = \phi^{-1}(\phi(x) + \phi(y)) = (x + y - 2xy)/(1 - xy)$ ergibt. Für kleine x, y erhält man $C(x, y) \approx x + y - 2xy$. Der quadratische Mischterm $-2xy$ ist unverträglich mit der Antisymmetriebedingung (Axiom B'): Antisymmetrisches σ impliziert, dass die induzierte Komposition $C(-x, -y) = -C(x, y)$ erfüllen muss, aber $(x + y - 2xy)/(1 - xy)$ tut das nicht. Äquivalent: $R(u)$ selbst ist nicht antisymmetrisch, was Axiom B' verletzt.

(iii) *Arkustangens.* Die Funktion $A(u) = (2/\pi) \arctan(\beta u)$ hat Abel-Transformation $\phi(x) = \tan(\pi x/2)$, die $C(x, y) = (2/\pi) \arctan(\tan(\pi x/2) + \tan(\pi y/2))$ ergibt. Während diese Komposition auf dem offenen Quadrat $(-1, 1)^2$ wohldefiniert und glatt ist, kann sie nicht glatt auf das geschlossene Quadrat $[-1, 1]^2$ erweitert werden: die zweiten partiellen Ableitungen $\partial^2 C/\partial x^2$ und $\partial^2 C/\partial x \partial y$ divergieren beide, wenn $(x, y) \rightarrow (1, 1)$ (numerisch $\sim \epsilon^{-1}$ entlang $x = y = 1 - \epsilon$), was die C^∞ -Randregularitätsanforderung von Axiom D verletzt. Diese algebraische (ϵ^{-1}) Divergenz ist charakteristisch für Abel-Funktionen mit Potenzgesetz-Randverhalten. Logarithmische Krägen sind die zulässige Randklasse an dieser Fläche; D' wählt daraus den projektiven logarithmischen Kragen $\operatorname{arctanh}$ aus.

(iv) *Harte Sättigung.* $\min(u, 1)$ ist bei $u = 1$ nicht C^∞ , was die Glattheitsanforderung von Axiom B verletzt. $\square$

Bemerkung 5. *Der logistische Fall (i) ist instruktiv: er scheint eine echte Alternative zu sein, aber Kompositionsgesetz plus projektiver Quotient zwingen ihn, sich auf tanh zu reduzieren. Dies veranschaulicht die Kraft von Skalenkohärenz zusammen mit D' : oberflächliche Freiheit bei der Profilmahl wird auf eine Randkragenwahl reduziert, und der projektive Quotient fixiert den CRM-Rapiditätsrepräsentanten.*

V. DIE AXIOME IN QUANTENGRAVITATIONS-PROGRAMMEN

Wir prüfen nun, wie A–D in jedem großen Quantengravitations-Programm erfüllt sind – oder zumindest natürlicherweise kompatibel sind –, wenn man sich auf kosmologische Observablen beschränkt. Die stärkere innere Form $D^\pm$ und die projektive Normalisierung D' werden separat als offene Diagnostika geführt.

A. Loop Quantum Gravity / Loop Quantum Cosmology

In Loop Quantum Cosmology (LQC) [22, 23] lautet die modifizierte Friedmann-Gleichung:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \quad (14)$$

wobei $\rho_c \sim \rho_{\text{Pl}}$ eine kritische Dichte ist, die durch den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} gesetzt wird. Dies hat genau die Struktur einer Sättigungsgleichung: die Expansionsrate ist begrenzt ($H^2 \leq H_{\text{max}}^2$), und der Bounce bei $\rho = \rho_c$ ersetzt die klassische Singularität.

Axiom A: Die kritische Dichte ρ_c bietet endliche geometrische Kapazität. *Axiom B:* Für $\rho \ll \rho_c$ wird die Standard-Friedmann-Gleichung wiederhergestellt mit $c_1 > 0$. Die Holonomie-Korrekturen sind kooperativ: die Abweichung von GR wächst mit der Krümmung. *Axiom C:* Im expandierenden Bereich ($\dot{a} > 0$) ist die Lösung monoton. *Axiom D:* LQC besitzt kein manifestes RG-Kompositionsgesetz im Sinne von Axiom D; die effektiven Gleichungen erben Diffeomorphismus-Invarianz von der vollen LQG, was strukturelle Kohärenz über Skalen hinweg bietet, aber eine rigorose Ableitung der assoziativen Kompositions-Eigenschaft (6) aus dem LQG-Hilbert-Raum bleibt ein offenes Problem (daher das “?” in Tabelle II).

Mit $X = 1 - 2\rho/\rho_c$ kann die LQC-Friedmann-Gleichung (14) umgeschrieben werden als $H^2 \propto (1 - X^2)$. Der Faktor $(1 - X^2)$ ist dieselbe Nichtlinearität, die auf der rechten Seite der Sättigungs-ODE (1) erscheint; beachte jedoch, dass die LQC-Gleichung H^2 regiert, während die CRM-ODE dX/da regiert – die strukturelle Analogie liegt im Sättigungsmechanismus, nicht einer direkten Identifikation der beiden Gleichungen. Die CRM-Parameter k und Φ_0 würden sich auf die LQG-Mindestfläche Δ (der kleinste Nicht-Null-Eigenwert des Flächenoperators) und den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} abbilden, obwohl diese Abbildung nicht rigoros hergeleitet wurde.

B. Asymptotic Safety

Im Asymptotic Safety-Programm [8–10] hat die gravitationale effektive Wirkung einen UV-Fixpunkt $g^* > 0$,

wo die dimensionslose Newton-Konstante und kosmologische Konstante skalenunabhängig werden. Der RG-Fluss von UV zu IR definiert die effektive Gravitationskopplung G_k und kosmologische “Konstante” Λ_k als Funktionen der RG-Skala k .

Axiom A: Der UV-Fixpunkt bietet eine endliche obere Schranke für die effektive Kopplung. *Axiom B:* Der Fluss weg vom Fixpunkt ist kooperativ: die relevante Richtung hat positiven kritischen Exponenten [10]. *Axiom C:* Der Fluss ist monoton entlang der relevanten Richtung (per Definition von Relevanz). *Axiom D:* Eine Klarstellung ist nötig. Die Wilson-RG-Halbgruppe $R_{k_1} \circ R_{k_2} = R_{k_1 k_2}$ operiert auf dem Raum der Kopplungen (dem “Theorie-Raum”), nicht direkt auf der Antwortfunktion S_T . Um die beiden zu verbinden, muss man den RG-Fluss auf die einzelne relevante Richtung parametrisiert durch g projizieren. Im Asymptotic Safety-Szenario mit UV-Fixpunkt wird der Fluss nahe dem Fixpunkt durch eine endliche Anzahl relevanter Richtungen kontrolliert; in der einfachsten Truncation (Einstein-Hilbert mit G_k, Λ_k) gibt es typischerweise zwei relevante Richtungen. Die Einzelfeld-Annahme von Axiom D entspricht der Beschränkung auf die dominante relevante Richtung, unter welcher die RG-Halbgruppe auf dem Theorie-Raum ein Kompositionsgesetz auf der eindimensionalen Antwort $S_T(g)$ induziert. Diese Projektion ist exakt, wenn eine einzelne relevante Richtung dominiert (wie im kosmologischen Sektor), und näherungsweise ansonsten – eine Limitation, die mit der Einzelfeld-Einschränkung des Theorems geteilt wird (siehe Limitation 4).

Tatsächlich ist Asymptotic Safety das QG-Programm, in dem Axiom D am natürlichsten erfüllt ist, weil es *selbst* eine Renormalisierungs-Gruppen-Aussage ist. Das Asymptotic Safety-Szenario für Kosmologie [24] produziert effektive Friedmann-Gleichungen mit Sättigungsverhalten bei hoher Krümmung, konsistent mit der tanh-Form.

Neuere Berechnungen in zunehmend anspruchsvolleren Truncations bieten wachsende numerische Evidenz für den Reuter-Fixpunkt. Eichhorn und Held [7] zeigen, dass Asymptotic Safety die Top-Quark-Yukawa-Kopplung einschränkt, mit einer Vorhersage von ungefähr 171 GeV für die Top-Quark-Polmasse, konsistent mit dem beobachteten Wert von 172.6 ± 0.3 GeV [29] – eine konkrete Teilchenphysik-Konsequenz des UV-Fixpunkts. Breiter zeigt Eichhorn [6], wie die Fixpunkt-Struktur natürlicherweise die Standard-Modell-Materie-Inhalte ohne zusätzliche Feinabstimmung unterbringt. Diese Resultate stärken den Fall, dass das Asymptotic Safety-Programm die Axiome natürlicherweise realisiert: die Fixpunkt-Existenz (Axiom A), der kooperative Fluss (Axiom B), und die RG-Komposition (Axiom D) sind Eigenschaften, die in hochmodernen funktionalen RG-Berechnungen verifiziert sind.

C. Stringtheorie und Holographie

In der Stringtheorie bietet die UV-Endlichkeit der String-Amplitude Axiom A. Die String-Landschaft führt zwar ein Selektionsproblem ein, verletzt aber die Axiome für kein *spezifisches* Vakuum nicht: innerhalb einer gegebenen Kompaktifizierung hat die Low-Energy-EFT einen eindeutigen RG-Fluss, der die Axiome B–D erfüllt.

Der holographische Zugang (AdS/CFT [14]) bietet besonders starke Unterstützung für Axiom D: die Bulk/Boundary-Korrespondenz *ist* ein Kompositionsgesetz, das geometrische Beschreibungen auf verschiedenen Skalen in Beziehung setzt. Die Ryu-Takayanagi-Formel [25] und ihre Quantenkorrekturen etablieren eine monotone Beziehung zwischen Verschränkungs-Entropie und geometrischer Fläche, was Axiom C erfüllt.

Für kosmologische Anwendungen bietet die de Sitter-Entropie-Schranke $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G) < \infty$ Axiom A, während der holographische RG-Fluss [26] die Kompositions-Struktur bietet.

D. Causal Set Theory

In der Causal Set Theory [15, 16] tritt die kosmologische Konstante als dynamische Größe $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$ auf, wobei N die Anzahl der Causal-Set-Elemente ist. Dies produziert eine kosmologische “Konstante”, die abnimmt, während das Universum wächst, und einen endlichen asymptotischen Wert anstrebt – genau das Sättigungsverhalten von Axiom C.

Axiom A: Die endliche Dichte von Causal-Set-Elementen bietet geometrische Kapazität. *Axiom B:* Während das Poisson-Sprinkling selbst unkorreliert ist, produziert die *Dynamik* der Causal-Set-Entwicklung (sequentielle Wachstums-Modelle [16]) kooperatives Ordnen: neu hinzugefügte Elemente haften vorzugsweise an die bestehende kausale Struktur an, was geometrische Ordnung verstärkt. *Axiom C:* Die $1/\sqrt{N}$ -Skalierung nimmt monoton ab. *Axiom D:* Die sequentielle Wachstums-Dynamik bietet ein natürliches Kompositionsgesetz, obwohl sein genaues Verhältnis zur RG-Komposition von Axiom D weitere Analyse erfordert.

E. Causal Dynamical Triangulations

Causal Dynamical Triangulations (CDT) [32, 33] konstruieren Quantengravitation mittels eines regularisierten Pfadintegrals über kausale Triangulationen. Monte-Carlo-Simulationen enthüllen ein Phasendiagramm mit einer physikalisch relevanten “de Sitter-Phase” (Phase C_{dS}), in der die emergente Geometrie Hausdorff-Dimension $d_H \approx 4$ hat und ein Volumenprofil, das gut durch euklidischen de Sitter-Raum beschrieben wird.

Axiom A: Die Triangulation bietet eine endliche Anzahl von Bausteinen pro Raumzeit-Volumen, erzwingt

also endliche geometrische Kapazität. *Axiom B:* In der de Sitter-Phase wächst das Volumenprofil kooperativ, bevor es sättigt – die geometrische Ordnung verstärkt sich selbst. Die ungeraden-Potenz-Struktur (Axiom B’) ist nicht explizit verifiziert worden. *Axiom C:* Das de Sitter-Volumenprofil ist monoton (im expandierenden Bereich). *Axiom D:* CDT besitzt natürliche Blockierungs-Transformationen (Vergrößerung von Triangulationen), was einen Kandidaten für das Kompositionsgesetz bietet, aber die präzise assoziative Struktur ist nicht rigoros etabliert worden.

F. Nichtkommutative Geometrie

Das Programm von Connes [17] rekonstruiert Geometrie aus spektralen Daten (der Dirac-Operator auf einer nichtkommutativen Algebra). Das Spektral-Wirkungs-Prinzip liefert das Standard-Modell-Lagrangian gekoppelt an Gravitation aus dem Spektrum eines einzelnen Operators.

Axiom A: Die Spektral-Wirkung hat eine natürliche UV-Abschneidung Λ (die Energieskala, bei der die Spektral-Summe ausgewertet wird), was endliche geometrische Kapazität bietet. *Axiom B:* Die Seeley-DeWitt-Koeffizienten $a_0, a_2, a_4, \dots$ der Wärme-Kern-Expansion haben gerade Potenzen von Λ ; die ungeraden-Potenz-Struktur, die Axiom B erfordert, tritt nach Reparametrisierung zu einer geeigneten Kopplungs-Variable auf, aber diese Identifikation erfordert weitere Analyse. *Axiom C:* Der spektrale Fluss ist in der geeigneten Richtung monoton. *Axiom D:* Die Komposition von spektralen Tripeln bietet algebraische Kompositions-Kohärenz.

G. Zusammenfassung: Warum Abel-/Randkragen-Universalität?

Tabelle II fasst die Axiom-Verifikation zusammen. Für kein externes QG-Programm wird hier rigoros bewiesen, dass es A–D, $D^\pm$ und D’ gleichzeitig erfüllt; stattdessen erfüllt jedes Programm eine wesentliche Teilmenge, wobei die restlichen Axiome plausibel, aber noch nicht formal etabliert sind (angedeutet durch (✓) und ? in der Tabelle). D’ ist dabei besonders wichtig: Es ist für die aufgelisteten UV-Programme in diesem Paper nicht verifiziert, sondern wird vom effektiven CRM-Kanal als projektive Response-Normalisierung angenommen. Der Wert des Theorems ist daher zweifach: (i) als *bedingtes* Resultat identifiziert es die präzisen Bedingungen, unter denen tanh-Sättigung folgt, und (ii) als *Diagnostikum* zeigt es auf, welche Eigenschaften jedes QG-Programms weitere Untersuchung erfordern. Die breite Kompatibilität über Programme hinweg erklärt die Abel-/Randkragen-Universalität der Sättigungsdynamik; der exakte tanh-Repräsentant erfordert zusätzlich den projektiven Quotienten.

TABLE II. Axiom-Verifikation über Quantengravitations-Programme. $\checkmark$ = natürlicherweise erfüllt mit expliziter Konstruktion, $(\checkmark)$ = plausibel mit milden Annahmen, $?$ = offene Frage, die weitere Analyse erfordert. Die D'-Spalte notiert, ob der projektive Randquotient hergeleitet oder explizit angenommen wird.

Programm	A	B/B'	C	D	D'
LQG/LQC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$	$?$
Asymptotic Safety	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$
Strings/Holographie	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$
Causal Sets	$\checkmark$	$?$	$\checkmark$	$?$	$?$
CDT	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$	$?$
NCG	$\checkmark$	$?$	$?$	$?$	$?$
CRM (effektiv)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	angenommen

VI. RAUMZEIT ALS GEORDNETE PHASE

Die breite Axiom-Kompatibilität in Tabelle II wirft eine konzeptionelle Frage auf: Falls der projektive $\tanh$ -Repräsentant in einem UV-Programm physikalisch realisiert ist, was bedeutet diese Abel-/Randkragen-Universalität für die Natur der Raumzeit?

A. Die konzeptionelle Verschiebung

Das Saturation Theorem, kombiniert mit dem empirischen Erfolg des CRM, deutet auf eine mögliche interpretive Lesart der Quantengravitation hin:

In dieser Lesart ist Quantengravitation nicht nur die Quantisierung der Metrik, sondern auch die Theorie, wie geometrische Ordnung aus einem vorgemessenen Quantensystem hervorgeht.

Die $\tanh$ -Sättigung ist daher am besten als bedingte Signatur eines kapazitätsbegrenzten kooperativen Ordnungsprozesses zu lesen, sobald das eindimensionale Kompositionsgesetz und D' festgelegt sind. Das ist kein unabhängiger Beleg für eine bestimmte mikroskopische Ontologie; es liefert eine gemeinsame Normalformsprache für Spin-Netzwerk-, String-/holographische, Causal-Set- oder Code-Subspace-Realisierungen, sofern sie die genannten Gates erfüllen.

B. Die ferromagnetische Analogie

Die Analogie zur spontanen Magnetisierung ist auf der Ebene eines Mean-Field-Ginzburg-Landau-Modells nützlich. Die CRM-Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ kann als Bewegungsgleichung für den Ordnungsparameter eines toy-modellhaften Phasenübergangs zweiter Ordnung mit Doppelmulden-Freien-Energie $F(X) = -k(X - X^3/3)$ geschrieben werden. Paper III [3] entwickelt diese Analogie im Detail und identifiziert:

Ferromagnetismus	CRM-Kosmologie
Magnetisierung M	Krümmungsrückkehr Ω_Φ
Inverse Temperatur $J/k_B T$	Skalenfaktor a
Curie-Punkt $(J/k_B T_c)$	Übergang a_{trans}
Spin-Wechselwirkung J	Krümmungskopplung k
Sättigung M_s	Sättigung Φ_0
$\tanh(J/k_B T)$	$\tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$

Das Saturation Theorem liefert eine mathematische Leitplanke für diese Analogie auf der *Mean-Field-Ebene*: beide Systeme erfüllen in der Mean-Field-Approximation eine Abel-artige Kompositionsstruktur, und die übliche Mean-Field-Magnetisierung entspricht dem projektiven $\tanh$ -Repräsentanten. Wir bemerken, dass die exakte Magnetisierung eines d -dimensionalen Ising-Modells von der Mean-Field- $\tanh$ in der Nähe der kritischen Temperatur abweicht ($M \sim (T_c - T)^\beta$ mit nichttrivialem kritischen Exponenten $\beta \neq 1/2$ für $d < 4$). Diese Abweichung entspricht dem Zusammenbruch der eindimensionalen projektiven Randkragen-Approximation in der Nähe des *kritischen Punktes* (dem Beginn der Ordnung), nicht in der Nähe der *Sättigung* ($T \rightarrow 0$). Die Analogie ist daher auf das Sättigungsregime und die Mean-Field-Theorie begrenzt; Fluktuationskorrekturen in der Nähe der Kritikalität erfordern eine Mehrfeld-Erweiterung (siehe Ausblick). Innerhalb dieses Bereichs ist die Relation strukturell und nicht nur metaphorisch.

Nachdem wir das ontologische Rahmenwerk etabliert haben, wenden wir uns nun seinen empirischen Konsequenzen zu.

VII. BEOBACHTUNGSMÄSSIGE KONSEQUENZEN UND OFFENE FRAGEN

A. Was das Theorem vorhersagt

Das Saturation Theorem hat zwei Klassen von Testzielen. Tabelle III trennt theoremnahe Tests von CRM-spezifischer oder UV-abhängiger Evidenz.

Projektive Randkragen-Vorhersagen (nach Annahme von D'):

1. Wenn der projektive Randquotient physikalisch realisiert ist, sollte die kosmologische Expansionsgeschichte mit $\tanh$ -ähnlicher Sättigung verträglich

TABLE III. Beobachtungs- und UV-Evidenzledger. Die Tabelle trennt, was durch das Normalformtheorem geprüft wird, von dem, was zum CRM-Fit oder zu einer künftigen UV-Vervollständigung gehört.

Ziel	Aktuelle Rolle	Claim-Status	Nächstes Gate
Profilfit	Verträglichkeit der Spätzeitexpansion mit einer tanh-artigen Vorlage	Nur diagnostisch; CRM wurde mit tanh-Profil konstruiert und ist kein unabhängiger Theoremtest	Modellunabhängiger Template-Fit ohne CRM-spezifische Priors
Komposition	Direkter Inhalt der projektiven Normalform	Theoremnahes empirisches Ziel nach Annahme von D'	Sättigungsantworten über Rotverschiebungsbins gegen $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ prüfen
D'-Defekt	UV-Auswahl des projektiven Kragens	Offene physikalische Herleitung, nicht durch die QG-Programmtabelle etabliert	$\Delta_{D'} = \log R(C) - \log R(x) - \log R(y)$ in einem UV-Modell berechnen oder begrenzen
Parameterwerte	k, Φ_0, γ und Übergangsschärfe	CRM-/UV-spezifisch, nicht vom Theorem bestimmt	Parameter aus einem mikroskopischen Modell herleiten und gegen CRM-Fits vergleichen
Oszillatorische Residuen	Mögliche UV-sensitive Spätzeit-Residualstruktur	Nur Kandidatensignatur; für sich kein Beweis des Quantenursprungs	Frequenzfenster, Dämpfung, Nullkontrollen und Suchfenster vorregistrieren

sein. Wir betonen, dass das CRM-Ergebnis $\Delta\chi^2 = -5.5$ [2] *keinen* unabhängigen Test des Theorems darstellt, da das CRM mit einem tanh-Profil konstruiert wurde, bevor die Axiome formuliert wurden. Der empirische Gehalt des Theorems ist das *Kompositionsgesetz* $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$, das eine Vorhersage jenseits jeder individuellen Profilanpassung ist. Ein unabhängiger Test würde entweder (a) die Anpassung einer modellunabhängigen tanh-Vorlage an SN+CMB+BAO-Daten ohne CRM-spezifische Priors erfordern, oder (b) das Kompositionsgesetz direkt durch den Vergleich von Sättigungsantworten bei verschiedenen Rotverschiebungsbins verifizieren und die Konsistenz mit der Geschwindigkeitsadditionsregel prüfen.

2. Innerhalb des CRM-Fits wird die laufende Krümmungskopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$ als monotone Übergangsfunktion berichtet ($\beta_{\text{early}} \approx 2.8 \rightarrow \beta_{\text{late}} \approx 2.0$ [2]); theoremnah ist dies ein Konsistenzcheck für Axiom C, keine unabhängige Herleitung.
3. Kein alternatives Relaxationsprofil (logistisch, Potenzgesetz, etc.) kann Unterstützung aus diesem Theorem beanspruchen, sofern es nicht ebenfalls ein skalenkohärentes Kompositionsgesetz realisiert und den projektiven Quotienten erklärt.

UV-abhängige Vorhersagen (zwischen Vervollständigungen diskriminierend):

1. Die spezifischen Werte von k (Sättigungsrate), Φ_0 (Sättigungsamplitude) und γ (Kopplungskonstante) hängen von der UV-Theorie ab.
2. Die Übergangsschärfe (n im sigmoidalen Übergang) würde eine Universalitätsklasse codieren, sofern eine UV-zu-Kosmologie-Abbildung vorliegt.

3. Sub-Planck-Korrekturen zum tanh-Profil sind als UV-theoriespezifische Kandidaten zu behandeln, solange keine passenden Kontrollen definiert sind.

B. Das fehlende Stück: warum *diese* Parameter?

Das Saturation Theorem bestimmt die Abel-/Randkragenstruktur und unter D' die projektive *Form*, aber nicht die *Koeffizienten*. Die verbleibende offene Frage ist:

Warum hat das Universum die spezifischen Werte $k \approx 9.8$, $\Phi_0 \approx 0.43$, $\gamma \sim \mathcal{O}(1) H_0^{-2}$?

Diese Frage ist analog zum Problem der Feinstrukturkonstante: die *Existenz* der elektromagnetischen Kopplung wird durch Eichsymmetrie erzwungen, aber der Wert $\alpha \approx 1/137$ wird nicht allein durch die Symmetrie bestimmt.

Mehrere UV-Vervollständigungen machen spezifische Vorhersagen:

- **LQC:** Φ_0 wird auf den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} abgebildet, der durch Schwarzschild-Entropie eingeschränkt wird [27]. Dies würde einen spezifischen Wert von Φ_0 vorhersagen.
- **Asymptotische Sicherheit:** Die kritischen Exponenten am UV-Fixpunkt bestimmen die Übergangsschärfe n , was eine spezifische Vorhersage für die Form von $\beta_{\text{eff}}(a)$ liefert [9].
- **Holographie:** Die de Sitter-Entropie $S_{\text{ds}} = \pi/(\Lambda G)$ verbindet Φ_0 mit dem Verhältnis von UV- und IR-Skalen.

Ein konkreter Testfall ist die $\sqrt{\pi}$ -Vermutung von Paper II [2]: das CRM sagt einen MOND-ähnlichen

Verstärkungsfaktor $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ voraus, der aus der Gauß-Normalisierung der Sättigungs-Partitionsfunktion hervorgeht. Die Ableitung dieses Wertes aus einer spezifischen UV-Vervollständigung würde direkt die Quantengravitations-Parameter mit der beobachteten Galaxien-Dynamik verbinden.

C. Skalarfeld-Oszillationen als QG-Signatur

Paper III [3] zeigt, dass das Pöschl-Teller-Potential ein diskretes Spektrum von Bindungszuständen unterstützt. Im kosmologischen Kontext entsprechen diese oszillatorischen Korrekturen zur Expansionsrate in späten Zeiten:

$$H^2(a) = H_{\text{smooth}}^2(a) [1 + \epsilon \cdot e^{-\Gamma a} \cos(\omega a + \delta)] , \quad (15)$$

mit $\epsilon \ll 1$. Diese Oszillationen wären eine Kandidatensignatur mikroskopischer Struktur im Sättigungsmechanismus – der Analogie nach verwandt mit diskreten Energieniveaus eines Quantensystems. Eine Detektion in hochpräzisen BAO- oder SN-Daten würde nur dann einen UV-sensitiven Residualkanal stützen, wenn Frequenzfenster, Dämpfungsskala und Nullkontrollen vor der Anpassung festgelegt wurden; sie wäre für sich kein Beweis des Quantenursprungs der CRM-Sättigung.

VIII. DISKUSSION UND AUSBLICK

A. Was wurde erreicht

1. **Eine konditionale Normalform-/No-Go-Aussage:** Jede kosmologische Theorie, die die Axiome A–D, B', $D^\pm$ und die projektive Randquotienten-Normalisierung D' erfüllt, muss eine tanh-artige Sättigung produzieren. Ohne D' liefern dieselben strukturellen Voraussetzungen die Abel-/Randkragenstruktur.
2. **Abel-Universalität eingegrenzt:** Die Beobachtung, dass LQG, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets und Noncommutative Geometry strukturell ähnliche Sättigungsdynamiken nahelegen, ist auf Abel-Strukturebene erklärbar; der konkrete tanh-Repräsentant hängt zusätzlich vom projektiven Randquotienten ab.
3. **CRM kalibriert:** Das CRM's Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ kann unter den genannten Axiomen als projektive Normalform kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation gelesen werden, nicht nur als phänomenologisches Fitting.
4. **Ontologische Interpretation:** In diesem Rahmen kann Quantengravitation nicht nur als

Metrikquantisierung, sondern auch als Theorie geometrischer Ordnung gelesen werden – als Übergang von einem prä-geometrischen Quantensystem zu klassischer Raumzeit.

B. Relation zum CRM-Programm

Dieses Paper vervollständigt den konzeptionellen Bogen der CRM-Serie: spieltheoretische Grundlagen (Paper I [1]), phänomenologisches Fitting mit $\Delta\chi^2 = -5.5$ (Paper II [2]), Lagrangian-Herleitung (Paper III [3]), galaktische Dynamik (Paper IV [4]), und nun axiomatische Grundlegung (diese Arbeit). Der logische Status des CRM ist:

1. Die *Form* der Dynamik (tanh) ist ein mathematisches Theorem, sobald die signierten inneren Kompositionsvoraussetzungen und der projektive Randquotient D' akzeptiert werden; ohne D' beweist das Theorem die Abel-/Randkragenstruktur.
2. Das *Lagrangian* ist hergeleitet (Paper III).
3. Die *Parameter* sind durch Daten eingeschränkt (Papers II, III, IV).
4. Die *UV-Vervollständigung* bleibt offen – und muss erklären, warum der projektive Randquotient und nicht ein anderer glatter Randkragen die physikalische Kompositionsvariable ist.

C. Post-Zookeeper-Roadmap für Stabilitätserweiterungen

Die spätere FST/Zookeeper-Beweissprache liefert eine Roadmap für künftige perturbative Erweiterungen dieses Papers. Sie ist kein zusätzliches Resultat des Saturation Theorem selbst. In dieser Sprache ist eine Stabilitätsaussage am stärksten, wenn sie als Galerkin-kompatible Operatorfamilie

$$A_X^{(N)} = H_X^{(N)} + B_X^{(N)}, \quad \|(I - P_{V_X})k_X\| \leq \frac{r_X}{g_X},$$

geschrieben werden kann, wobei $B_X^{(N)}$ ein Rang-eins- oder endlichdimensionaler Defekt ist, r_X das kombinierte Säkular-/Quasimoden-Residuum bezeichnet und g_X eine koerzive Komplementlücke ist. Für das Saturation Theorem entspricht dies dem idealisierten projektiven Null-Defekt-Fall: Das RG-Kompositionsgesetz ist exakt, die Abel-Koordinate ist eindimensional, D' fixiert den projektiven Kragen, und die hyperbolische Komposition $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ besitzt keine Leckage in Nebenanäle.

Der nützliche Transfer ist daher kein neuer Beweis des Theorems, sondern eine Beweispflicht für seine Störungen. Mehrfeldkorrekturen, stochastische Inflation, EFT-of-Dark-Energy-Perturbationen oder nicht-perturbative UV-IR-Matchingeffekte sollten als Defekte

B_X des eindimensionalen Sättigungskanals behandelt werden. Eine künftige Erweiterung ist nur stark, wenn das durch diese Defekte erzeugte Residuum von einer koerziven Stabilitätslücke dominiert wird. In diesem Sinn macht der Zookeeper-Transfer aus der qualitativen Einschränkung dieses Papers—“bis auf Reparametrisierung und innerhalb eines einzelnen deterministischen Sättigungskanals”—den quantitativen Test $r_X/g_X \ll 1$.

D. Limitationen und Einschränkungen

1. **Axiom D und D' sind stark.** Das Renormalisierungsgruppen-Kompositionsgesetz ist restriktiv, und die projektive Randquotienten-Normalisierung ist eine zusätzliche mathematische und physikalische Wahl. Theorien ohne gut definiertes RG-Fließverhalten (einige diskrete Ansätze, Multiversum-Szenarien) erfüllen möglicherweise D nicht; Theorien mit einem anderen Randkragen können D erfüllen, aber D' verfehlen. Diese Unterscheidung ist wesentlich: D liefert Skalenkohärenz, D' wählt den tanh-Repräsentanten.
2. **Der Beweis ist algebraisch, nicht konstruktiv.** Das Theorem stellt die Abel-Struktur der Antwort und unter D' ihren projektiven tanh-Repräsentanten fest, konstruiert aber die UV-Theorie nicht. Die “Reparametrisierung” $u(g)$ absorbiert mikroskopische Informationen; $u(g)$ aus ersten Prinzipien zu bestimmen erfordert das Lösen der spezifischen QG-Theorie. Ein potentieller Einwand ist, dass jede beschränkte monotone Funktion trivial als $\tanh(\alpha u(g))$ für ein geeignetes $u(g)$ geschrieben werden kann, was die Profilform inhaltsleer macht. Der nichttriviale Inhalt liegt daher im *Kompositionsgesetz* und für die tanh-Auswahl im projektiven Quotientengesetz $R(C) = R(x)R(y)$.
3. **Kosmologische Einschränkung.** Die Axiome sind für kosmologische Observablen formuliert. Ob sie sich auf lokale Physik (Schwarze Löcher, Gravitationswellen) erweitern lässt, erfordert weitere Analyse. Die bestehenden CRM-Vorhersagen für lokale Physik (Chamäleon-Screening, $\alpha_T = 0$, Bullet Cluster-Auflösung [2–4]) sind von dem Lagrangian hergeleitet, nicht von den Axiomen.
4. **Die kontinuierliche Gruppenklassifikation und Einzelfeld-Einschränkung.** Der Beweis beruht auf Aczél’s Darstellungstheorem für kontinuierliche assoziative Operationen [20] und der Klassifikation eindimensionaler formaler Gruppengesetze [21]. Während diese Resultate gut etabliert sind, erfordert die physikalische Anwendbarkeit die Annahme, dass die Komposition *eindimensional* ist – d.h. dass es eine einzige relevante Richtung gibt. Dies ist eine echte Lim-

itation: das CRM selbst (Paper IV [4]) führt einen Vektorsektor neben dem Skalar ein, und realistische modifizierte Gravitationstheorien (z.B. Horndeski, beyond-Horndeski) haben generisch mehrere gekoppelte Freiheitsgrade. Jedoch merken wir an, dass das Theorem auf den *Skalarsektor in Isolation* angewendet wird: der CRM’s Skalar-Sättigungs-Kanal $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ ist eine eindimensionale Antwort, die die Axiome unabhängig vom Vektorsektor erfüllt. Die Mehrfeld-Erweiterung (Klassifikation mehrdimensionaler kommutativer Gruppengesetze, einschließlich elliptischer und Lubin-Tate formaler Gruppen) ist ein offenes mathematisches Problem, das das Theorem verstärken würde, wird aber für das Skalarsektor-Resultat nicht benötigt.

5. **Randkragen-Freiheit.** Glattes Randverhalten allein wählt $\arctanh$ nicht aus. Der Gegen-Kragen $\phi_\varepsilon = \arctanh + \varepsilon x$ erhält einen glatten positiven Randkragen, ändert aber die Abel-Koordinate. Die Eindeutigkeitsauswahl wird daher bewusst auf D' verlagert: Sobald der projektive Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ unter Komposition multiplizieren muss, folgt $\arctanh = \frac{1}{2} \log R$ unmittelbar und bis auf Skalierung eindeutig.

E. Das No-Go-Theorem als Filter

Das Saturation Theorem dient als ein *Filter* für Quantengravitations-Vorschläge:

- Jede vorgeschlagene QG-Theorie, die Axiom A verletzt (unendliche geometrische Ordnung erlaubt), muss das Singularitätsproblem separat adressieren.
- Jede Theorie, die Axiom C verletzt (oszillierende oder Multi-Fixpunkt-Dynamik hat), muss erklären, warum das beobachtete Universum einen eindeutigen thermodynamischen Pfeil hat.
- Jede Theorie, die Axiom D verletzt (fehlende Skalenkohärenz), muss erklären, warum ihre Vorhersagen unempfindlich gegen die Beobachtungsskala sind.
- Jede Theorie, die D erfüllt, aber D' verletzt, muss angeben, welcher nichtprojektive Randkragen die CRM-Rapiditätskoordinate ersetzt.

Theorien, die die Axiome A–D zusammen mit B' und $D^\pm$ erfüllen, sind auf ein Abel-/Randkragen-Sättigungsgesetz eingeschränkt. Theorien, die diese strukturellen Voraussetzungen und D' erfüllen, sind auf tanh-Sättigung eingeschränkt, was eine konkrete, falsifizierbare Vorhersage für ihren kosmologischen Sektor liefert.

F. Relation zu anderen Rahmenwerken

Swampland-Vermutungen. Die de Sitter-Swampland-Vermutung [30] postuliert $|\nabla V|/V \geq c \sim \mathcal{O}(1)$ in jeder Quantengravitations-Landschaft und benachteiligt eine strikte kosmologische Konstante. Das Saturation Theorem ist komplementär: es adressiert nicht die Existenz von de Sitter-Vakua, aber schränkt den *dynamischen Zugang* zum Spätzeitattraktor ein. Eine CRM-artige Sättigung mit $\Phi_0 < \infty$ ist kompatibel mit der Swampland-Schranke, da die effektive Dunkle-Energie-Dichte $\rho_\Phi(a)$ dynamisch anstatt als festes Λ entwickelt.

EFT der Dunklen Energie. Die effektive Feldtheorie der Dunklen Energie [31] parametrisiert Abweichungen vom Λ CDM auf der Ebene der gestörten Wirkung. Das Saturation Theorem operiert auf einer anderen Ebene: es schränkt die *Hintergrund*-Antwortfunktion ein, nicht die perturbative Operatorbasis. Eine zukünftige Aufgabe ist, die tanh-Sättigung in der EFT-of-DE-Sprache auszudrücken und die CRM-Parameter (k, Φ_0, γ) auf die EFT-Operatorkoeffizienten $\{\alpha_i(t)\}$ abzubilden.

G. Ausblick

Drei Richtungen sind unmittelbar:

1. **Parameterherleitung.** Der nächste Schritt ist, k , Φ_0 und γ aus einer spezifischen UV-Vervollständigung herzuleiten. Der vielversprechendste Kandidat ist die LQG/holographische Schnittmenge, wo der Barbero-Immirzi-Parameter und die holographische Entropie-Schranke gemeinsam die Sättigungsparameter fixieren könnten.
2. **Mehrfeld-Erweiterung.** Die Erweiterung des Theorems auf Theorien mit mehreren Sättigungs-Kanälen (z.B. Skalar + Vektor im CRM [4]) erfordert die Klassifikation mehrdimensionaler kommutativer Gruppengesetze (das höherdimensionale Analogon der Abel-Gleichungs-Reduktion). Dies ist mathematisch reichhaltiger und könnte Beschränkungen auf die Vektorsektor-Parameter K_B und $\mathcal{F}$ liefern.
3. **Schwarzloch-Inneres.** Wenn das Saturation Theorem auf Schwarzloch-Innere (mit der Radialkoordinate die Skalenfaktor ersetzend) angewendet wird und der projektive Randquotient dort der richtige innere Kragen ist, sagt es eine tanh-artige Singularitätsauflösung voraus – konsistent mit LQG-Bounce-Modellen [22] und dem Planck-Star-Szenario [28].

IX. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben ein korrigiertes Saturation Theorem bewiesen: endliche geometrische Kapazität, koop-

erative Verstärkung, monotone kosmische Kontrolle und Renormalisierungsgruppen-Komposition reduzieren eindimensionale kosmologische Sättigung auf eine Abel-Koordinaten-/Randkragenstruktur. Das tanh-Profil folgt, wenn der Sättigungsrand zusätzlich durch den projektiven Quotienten $R = (1+x)/(1-x)$ normalisiert wird.

Das Theorem hat drei Konsequenzen:

1. Das CRM's Sättigungs-ODE $dX/da = k(1-X^2)$ kann als *projektive Normalform* von kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation gelesen werden, sobald der Randquotient fixiert ist.
2. Die Beobachtung, dass LQG, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets und Noncommutative Geometry ähnliche Sättigungsstrukturen produzieren, ist auf Abel-/Randkragenebene erklärt; der konkrete tanh-Repräsentant erfordert den projektiven Quotienten.
3. Das Paper bietet einen Interpretationsrahmen, in dem Quantengravitation nicht nur als Metrikquantisierung, sondern auch als Theorie geometrischer Ordnung untersucht wird – als Übergang von einem prä-geometrischen Quantensystem zu klassischer Raumzeit.

Das verbleibende offene Problem – die spezifischen Parameter (k, Φ_0, γ) und den projektiven Randquotienten aus einer UV-Vervollständigung herzuleiten – ist das Analogon zur Ableitung der Feinstrukturkonstante aus einer Theorie der Quantenelektrodynamik. Das Theorem schränkt die *Normalform* jeder Theorie ein, die die genannten Hypothesen erfüllt, sobald der Randquotient fixiert ist.

Das Sättigungsprofil ist durch Skalenkohärenz plus projektiven Randquotienten auf den tanh-Typ eingeschränkt; bloße glatte Randregularität liefert die breitere Abel-Kragenklasse.

KI-OFFENLEGUNG

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Finanzierung durchgeführt. Öffentliche wissenschaftliche Recheninfrastruktur wurde im gesamten CRM-Programm genutzt.

Werkzeugeinsatz. KI-basierte Werkzeuge (Claude von Anthropic; Copilot von Microsoft/GitHub; Gemini von Google DeepMind) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturübersicht, Codeentwicklung und Textgenerierung verwendet. Alle physikalischen Hypothesen, axiomatischen Wahlen, wissenschaftliche Interpretation und Verantwortung für den Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Finanzierungsinformationen. Diese Forschung erhielt keine externe Finanzierung.

Datenverfügbarkeit. Dieses Paper ist rein theoretisch. Das öffentliche CRM-Repository mit Analyseskripten, Datenprodukten und Paper-Quelldateien ist

verfügbar unter <https://github.com/research-line/crm-cosmology>; der Zenodo-Concept-DOI für CRM I–IV ist [10.5281/zenodo.18728935](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728935).

-
- [1] L. Geiger (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Companion paper (Paper I). <https://github.com/research-line/crm-cosmology/tree/main/papers>. doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [2] L. Geiger (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper (Paper II). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [3] L. Geiger (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [4] L. Geiger (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [5] J. F. Donoghue (1994). General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections. *Physical Review D*, 50(6), 3874. DOI: 10.1103/PhysRevD.50.3874. arXiv:gr-qc/9405057.
 - [6] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
 - [7] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.040. arXiv:1707.01107.
 - [8] S. Weinberg (1979). Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation. In S. W. Hawking & W. Israel (Eds.), *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pp. 790–831. Cambridge University Press.
 - [9] M. Reuter (1998). Nonperturbative evolution equation for quantum gravity. *Physical Review D*, 57(2), 971. DOI: 10.1103/PhysRevD.57.971. arXiv:hep-th/9605030.
 - [10] R. Percacci (2017). *An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety*. World Scientific.
 - [11] J. Polchinski (1998). *String Theory*, Vols. 1–2. Cambridge University Press.
 - [12] C. Rovelli (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
 - [13] T. Thiemann (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.
 - [14] J. Maldacena (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231–252. [Reprinted in *Int. J. Theor. Phys.* **38**, 1113–1133 (1999).] DOI: 10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1. arXiv:hep-th/9711200.
 - [15] R. D. Sorkin (2005). Causal sets: Discrete gravity. In *Lectures on Quantum Gravity*, pp. 305–327. Springer. DOI: 10.1007/0-387-24992-3_7. arXiv:gr-qc/0309009.
 - [16] S. Surya (2019). The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22, 5. DOI: 10.1007/s41114-019-0023-1.
 - [17] A. Connes (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
 - [18] J. D. Bekenstein (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287–298. DOI: 10.1103/PhysRevD.23.287.
 - [19] A. Almheiri, X. Dong, & D. Harlow (2015). Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015, 163. DOI: 10.1007/JHEP04(2015)163.
 - [20] J. Aczél (1966). *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York.
 - [21] M. Hazewinkel (1978). *Formal Groups and Applications*. Academic Press.
 - [22] A. Ashtekar, T. Pawłowski, & P. Singh (2006). Quantum nature of the Big Bang. *Physical Review Letters*, 96(14), 141301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.141301. arXiv:gr-qc/0602086.
 - [23] M. Bojowald (2008). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11, 4. DOI: 10.12942/lrr-2008-4.
 - [24] A. Bonanno & M. Reuter (2002). Cosmology of the Planck era from a renormalization group for quantum gravity. *Physical Review D*, 65(4), 043508. DOI: 10.1103/PhysRevD.65.043508. arXiv:hep-th/0106133.
 - [25] S. Ryu & T. Takayanagi (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de Sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18), 181602. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602. arXiv:hep-th/0603001.
 - [26] J. de Boer, E. P. Verlinde, & H. L. Verlinde (2000). On the holographic renormalization group. *Journal of High Energy Physics*, 2000(08), 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2000/08/003. arXiv:hep-th/9912012.
 - [27] K. A. Meissner (2004). Black-hole entropy in Loop Quantum Gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 21(22), 5245. DOI: 10.1088/0264-9381/21/22/015. arXiv:gr-qc/0407052.
 - [28] C. Rovelli & F. Vidotto (2014). Planck stars. *International Journal of Modern Physics D*, 23(12), 1442026. DOI: 10.1142/S0218271814420267. arXiv:1401.6562.
 - [29] S. Navas et al. (Particle Data Group) (2024). Review of Particle Physics. *Physical Review D*, 110, 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
 - [30] G. Obied, H. Ooguri, L. Spodyneiko, & C. Vafa (2018). De Sitter Space and the Swampland. arXiv:1806.08362.
 - [31] G. Gubitosi, F. Piazza, & F. Vernizzi (2013). The Effective Field Theory of Dark Energy. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(02), 032. DOI: 10.1088/1475-7516/2013/02/032. arXiv:1210.0201.
 - [32] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, & R. Loll (2005). The spectral dimension of the universe is scale dependent. *Physical Review Letters*, 95(17), 171301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.171301. arXiv:hep-th/0505113.
 - [33] R. Loll (2020). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002. DOI: 10.1088/1361-6382/ab57c7. arXiv:1905.08669.