

The Saturation Theorem: Axiomatic Constraints on Quantum Gravity from Cosmological Relaxation

Lukas Geiger^{1,*}

¹*Independent Researcher, Bernau, Germany[†]*

(Dated: July 12, 2026)

We formulate four minimal axioms – finite geometric capacity, cooperative reinforcement, monotone cosmic control, and renormalization-group composition – as candidate macroscopic constraints for any quantum gravity theory whose cosmological limit reproduces general relativity with a bounded relaxation mechanism. These axioms imply an Abel-coordinate description of one-dimensional saturation dynamics once the reversible one-dimensional response-channel hypothesis $D^\pm$ is added. A hyperbolic tangent profile follows once the saturation boundary is fixed by the additional projective double-boundary quotient assumption D' : the ratio $R(x) = (1+x)/(1-x)$ must multiply under composition. Without that assumption, smooth boundary regularity alone leaves a family of smooth Abel collars, for example Abel coordinates of the form $\operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$. The corrected *Saturation Theorem* is therefore a projective-collar normal-form theorem: $S(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$ is selected by scale coherence plus the projective boundary quotient, not by bare smoothness alone. Major quantum gravity programs – Loop Quantum Gravity, asymptotic safety, string/holographic approaches, causal set theory, and noncommutative geometry – provide motivation for A–D when restricted to cosmological observables, while D' remains a separate diagnostic assumption to be physically derived. Under those hypotheses, the $\tanh$ saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ of the Curvature Relaxation Model can be read as the projective normal form of capacity-limited cooperative relaxation, while leaving open which UV completion selects k , Φ_0 , and the projective quotient physically.

* ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] See the AI Disclosure at the end of the paper for tool-use details. All scientific content is the sole responsibility of the author. Paper V in the CRM series. Companion papers: [1–4].

I. INTRODUCTION

A. The problem

The unification of quantum mechanics and general relativity remains the central open problem of theoretical physics. After decades of effort, several major programs have produced deep structural insights without converging on a single theory:

- **Effective field theory (EFT) of gravity** computes reliable quantum corrections at low energies but provides no UV completion [5].
- **Asymptotic safety** seeks a UV fixed point of the gravitational renormalization group (RG) flow, constraining the theory without new degrees of freedom [8–10].
- **String theory** provides a perturbatively UV-finite framework that includes gravity, but faces the landscape/selection problem [11].
- **Loop Quantum Gravity (LQG)** achieves background independence with discrete geometry operators, but struggles with dynamics and the classical limit [12, 13].
- **Holography/AdS-CFT** offers a nonperturbative definition of quantum gravity in anti-de Sitter space, with unclear extension to realistic cosmology [14].
- **Causal set theory** posits discrete causal structure as fundamental, with the continuum as emergent [15, 16].
- **Noncommutative geometry** reformulates geometry as spectral data, thereby linking operators and spacetime [17].

Orthogonal to these UV-completion programs, the *Swampland conjectures* [30] constrain which low-energy theories can be consistently embedded in quantum gravity, while the *EFT of Dark Energy* [31] parametrizes deviations from Λ CDM at the perturbative level. Neither framework, however, determines the *functional form* of the cosmological saturation profile.

A striking observation is that when any of the UV-completion programs listed above is applied to cosmology, the resulting effective dynamics often exhibits *saturation behavior*: a bounded, cooperative approach to a maximal geometric configuration. This paper asks whether that recurrence is accidental or structurally expected under a shared set of hypotheses.

B. The CRM as empirical anchor

The Curvature Relaxation Model (CRM) [1–4] provides a concrete, empirically tested cosmological framework in which saturation dynamics plays the central

role. The model replaces the cosmological constant Λ and particulate dark matter with geometric curvature return, achieving $\Delta\chi^2 = -5.5$ vs. Λ CDM on joint SN+CMB+BAO data with 6 parameters and zero Early Dark Energy [2]. The entire framework derives from a single dynamical equation, here written in the additive normal-form coordinate u :

$$\frac{dX}{du} = \alpha(1 - X^2), \quad (1)$$

where $X = \Omega_\Phi/\Phi_0$ is the normalized curvature return potential. The phenomenological CRM uses the scale factor a as parameter, with solution $X(a) = \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$, providing late-time acceleration (“dark energy”) in its saturated phase and gravitational scaffolding (“dark matter”) in its unsaturated phase [2]. *Coordinate caveat (added in this revision)*: if a general parameter a is used instead of the additive normal-form coordinate u , then $dX/da = \alpha u'(a)(1 - X^2)$; the constant-coefficient CRM equation in a therefore requires the *additional* affine-channel assumption $u(a) = \lambda(a - a_{\text{trans}})$. The theorem of this paper establishes the projective normal form in u ; it does not establish that affine identification for any particular UV completion (see Sec. VIII).

Paper III [3] historically proposed this ODE through a direct trace-coupled effective Lagrangian. The July 2026 truth audit found that route insufficient as a physical derivation and retained it only as a documented failure audit. The active Route 3 reconstruction instead separates a shift-symmetric dust candidate, a vector-scalar MOND sector, and the saturation scalar; it has not derived the saturation ODE or D’ from one common Lagrangian. The theorem below is therefore logically independent of that historical derivation claim.

The present paper recasts this observation from *structural analogy* as a conditional normal-form theorem: the four physically motivated axioms, plus B’ and $D^\pm$, give an Abel-coordinate saturation law, and the additional projective double-boundary quotient assumption D’ selects the tanh representative.

C. Scope and structure

The central result is the *Saturation Theorem* (Theorem 1): Axioms A–D, together with signed antisymmetry B’ and the separate one-dimensional reversible-channel hypothesis $D^\pm$, reduce the effective cosmological response to an Abel coordinate, while the projective double-boundary quotient assumption D’ uniquely selects the tanh normal form up to reparametrization. The paper is organized as follows:

- Section II: Formulation of the four axioms.
- Section III: Statement and proof of the Saturation Theorem.
- Section IV: Non-projective composition laws rather than profile names.

- Section V: Compatibility map with quantum-gravity motifs.
- Section VI: Ontological implications: spacetime as an ordered phase.
- Section VII: Observational consequences and open questions.
- Section VIII: Discussion and outlook.

II. THE FOUR AXIOMS

We formulate the axioms in terms of an effective response function S_T . To keep the roles distinct, $r \geq 0$ denotes a physical UV-to-IR control magnitude or scale ratio, u denotes the additive signed normal-form coordinate used after passing to a one-dimensional composition channel, and $x = S/S_{\max}$ denotes the normalized response. The symbol g is retained below as a generic channel variable when no distinction between r and u is needed.

A. Axiom A: Finite Geometric Capacity

Axiom 1 (Finite Geometric Capacity). *Per Hubble patch, there exists a finite maximum geometric order $C_{\max} < \infty$. Equivalently, the effective response function $S_T(r)$ on the selected positive physical response channel is globally bounded:*

$$0 \leq S_T(r) < S_{\max} < \infty \quad \forall r \geq 0. \quad (2)$$

Physical content. This axiom imposes finite capacity for the selected scalar response channel. It is not a claim that every microscopic observable or every UV amplitude is finite in the underlying theory. It is deliberately weak: it is compatible with LQG (finite area quanta [12]), holography (Bekenstein bound [18]), quantum error-correcting spacetime (finite code capacity [19]), causal set theory (finite density [15]), and asymptotic safety (finite effective action at the UV fixed point [9]) when those programs are restricted to the chosen cosmological response channel.

Without finite capacity, the framework would permit unbounded geometric configurations associated with the singular behaviors that quantum-gravity programs typically aim to tame.

Connection to CRM. The saturation amplitude Φ_0 in the CRM [1] is the physical realization of $S_{\max}$. The Pöschl-Teller potential $V(\phi) = V_0/\cosh^2(\phi/\phi_0)$ enforces $\Omega_\Phi \leq \Phi_0$ dynamically [3].

B. Axiom B: Cooperative Reinforcement

Axiom 2 (Cooperative Reinforcement). *Existing geometric order facilitates further ordering. The effective*

response function $S_T(g)$ is smooth (C^∞) for $g \geq 0$, with a local expansion at $g = 0$:

$$S_T(g) = c_1 g + c_3 g^3 + \mathcal{O}(g^5), \quad c_1 > 0. \quad (3)$$

The odd-power structure reflects the catalytic nature of the response: the rate of geometric ordering is proportional to both the existing ordered fraction and the remaining capacity.

Physical content. This axiom encodes the cooperative, self-reinforcing character of geometric ordering. It is the gravitational analog of ferromagnetic ordering, where aligned spins facilitate further alignment. Formally, the condition $c_1 > 0$ ensures that the response is positive (ordering, not disordering) for small perturbations, while the odd-power structure is consistent with the antisymmetric extension (Axiom B').

Without cooperative reinforcement, there would be no classical spacetime: a linear or anti-cooperative response cannot produce the long-lived, large-scale geometric structures observed in the universe. The cooperative character is analogous to spontaneous symmetry breaking in condensed matter: local ordering seeds further ordering, driving the system toward a globally ordered state (saturation).

Connection to CRM. The saturation coupling k in the CRM ODE (1) is c_1 . The game-theoretic equilibrium of Paper I [1] provides the thermodynamic motivation: the null space's concentration gradient G drives cooperative ordering until the spacetime bubble saturates.

A companion condition extends the domain of S_T to negative arguments, enabling the group-theoretic classification of Step 2 in the proof:

Axiom 3 (Antisymmetric Extension (B')). *The response function S_T admits a smooth antisymmetric extension to all $g \in \mathbb{R}$:*

$$S_T(-g) = -S_T(g) \quad \forall g. \quad (4)$$

Physical content. The antisymmetry has three complementary motivations:

(i) *Sign covariance of the response.* The parameter g is not a “distance” (which would be non-negative by definition) but a *signed deviation* from a symmetric reference state. In the CRM, g parametrizes the curvature perturbation relative to the de Sitter background; positive g corresponds to over-dense perturbations that enhance geometric ordering, and negative g to under-dense regions that reduce it. Sign covariance ($S_T(-g) = -S_T(g)$) then states that the response function treats over- and under-dense regions symmetrically in magnitude – a natural physical requirement absent any symmetry-breaking mechanism in the response itself. We emphasize that Axiom B' is *not* a claim about cosmological time-reversal symmetry (which is broken by the expansion); it is a constraint on the functional form of the response under $g \rightarrow -g$.

(ii) *Precedents in physics.* Sign covariance of response functions is familiar in symmetric response channels: in electrodynamics, the polarization $P(-E) = -P(E)$ for centrosymmetric media, and in magnetism, $M(-H) = -M(H)$ for the idealized paramagnetic/ferromagnetic response. The odd extension in Axiom B' is a modelling assumption in a locally signed response coordinate; it is not asserted that generic beta functions are odd.

(iii) *Mathematical role.* Together with the odd-power structure of Axiom B, B' extends the composition law from the half-line $[0, S_{\max})$ to a full group operation on $(-S_{\max}, S_{\max})$, which is essential for the Abel-equation classification. Without B', only a semigroup structure is available, and the Abel-representation argument of Step 2 does not apply in the same form. We note that this is an explicit assumption, not a derived consequence; its relaxation leads to alternative composition structures (e.g., $C(x, y) = x + y - xy$ on $[0, 1)$), which is why it appears as a separate axiom rather than being subsumed into Axiom B.

C. Axiom C: Monotone Cosmic Control

Axiom 4 (Monotone Cosmic Control). *The effective response function $S_T(g)$ is monotonically increasing, with saturation at infinity:*

$$S'_T(g) \geq 0, \quad \lim_{g \rightarrow \infty} S_T(g) = S_{\max}. \quad (5)$$

There exists exactly one relevant direction (control parameter) governing the transition from low to high geometric order.

Physical content. This excludes oscillating, multi-fixed-point, or chaotic geometric dynamics. It guarantees:

- A unique time direction (thermodynamic arrow).
- No “bouncing” between geometric phases.
- Stable expansion toward a de Sitter attractor.

In the CRM, the control parameter is the scale factor a ; in RG language, it corresponds to the single relevant direction flowing from the UV fixed point to the IR [10]. Axiom C is violated by cyclic cosmologies and by models with multiple stable vacua – both of which lack a unique thermodynamic arrow. We note that Axiom C is a restriction to the *cosmological sector* with a single dominant transition: it does not address the string landscape (where tunneling between metastable vacua produces non-monotone trajectories) or stochastic inflation (where local fluctuations break monotonicity). These scenarios involve multiple effective control parameters or stochastic dynamics, placing them outside the scope of the single-field, deterministic axiom system. The theorem should be read as follows: A–D, with B' and the interior group form $D^\pm$, give an Abel/collar class for a

single deterministic saturation channel; adding D' selects the projective tanh representative.

Connection to CRM. The monotonicity of $\Omega_\Phi(a)$ is a direct consequence of the ODE (1): since $1 - X^2 > 0$ for $|X| < 1$, the solution is strictly increasing.

Remark 1 (Axiom interdependence). *As shown in Corollary 1, monotonicity (Axiom C) follows once the reversible-channel hypothesis $D^\pm$ is imposed in addition to Axiom D. We nevertheless retain Axiom C as an explicit statement for physical transparency: it connects directly to the thermodynamic arrow of time and makes the exclusion of oscillating/chaotic cosmologies visible at the axiom level. The logical content of the axiom system is thus: A, B/B', and the strengthened composition law $D^\pm$ imply C; without that interior-group condition, C remains an explicit axiom.*

D. Axiom D: Renormalization-Group Composition

Axiom 5 (Renormalization-Group Composition). *There exists a scale composition $g \mapsto g_1 \oplus g_2$ (“two RG steps in succession”) such that the response function is compositionally coherent:*

$$S_T(g_1 \oplus g_2) = \mathcal{C}(S_T(g_1), S_T(g_2)), \quad (6)$$

where $\mathcal{C}$ is a smooth, commutative, associative composition with neutral element 0 and absorbing boundary $S_{\max}$:

$$\mathcal{C}(S, 0) = S, \quad \mathcal{C}(S, S_{\max}) = S_{\max}. \quad (7)$$

Furthermore, $\mathcal{C}$ extends smoothly (i.e., C^∞) to the closed square $[0, S_{\max}]^2$.

Axiom 6 (One-Dimensional Reversible Channel ($D^\pm$)). *After normalization by $S_{\max}$ and extension by B', the induced operation on the signed response interval $C : (-1, 1)^2 \rightarrow (-1, 1)$ is cancellative and strictly monotone in each argument, and each translation $y \mapsto C(x, y)$ is a smooth diffeomorphism with inverse $y \mapsto C(-x, y)$. All Abel-coordinate conclusions below use this additional one-dimensional deterministic-channel hypothesis; it is not a consequence of the bare positive-face semigroup law alone.*

Notation for channel variables. Let $r \geq 0$ denote the physical UV-to-IR control magnitude or scale ratio, u the additive signed normal-form coordinate with $u(g_1 \oplus g_2) = u(g_1) + u(g_2)$, and $x = S/S_{\max}$ the normalized response. Statements about constant coefficients are statements in u , not automatically in an externally chosen physical parameter. The positive physical branch is recovered by restricting the signed local channel to the physically realized side.

Remark 2 (Boundary-collar guardrail). *The smooth-extension clause in Axiom D is not, by itself, used below as a uniqueness claim for arctanh . The Abel coordinate*

$$\phi_\varepsilon(x) = \text{arctanh}(x) + \varepsilon x$$

induces a smooth associative composition on the open interval and gives a smooth positive boundary collar via

$$q_\varepsilon(x) = e^{-2\phi_\varepsilon(x)} = \frac{1-x}{1+x} e^{-2\varepsilon x}.$$

Thus bare smoothness of the positive saturation face places the response in an Abel-coordinate collar framework; it does not classify all smooth collars or select a unique projective coordinate. Boundary smoothness is used as an admissibility condition for the response channel. It is not derived from a UV model in this paper. The tanh normal form becomes a theorem only after the projective double-boundary quotient D' is fixed explicitly.

Axiom 7 (Projective Double-Boundary Quotient Assumption (D')). For the normalized response $x = S/S_{\max} \in (-1, 1)$, the projective boundary quotient

$$R(x) := \frac{1+x}{1-x}$$

is multiplicative under composition:

$$R(C(x, y)) = R(x)R(y). \quad (8)$$

Equivalently, the ratio of distances to the two saturation faces is the additive work/rapidity coordinate of the one-dimensional response channel.

Physical status of D' . D' is the projective double-boundary quotient assumption. Once the quotient $R = (1+x)/(1-x)$ is fixed prior to the choice of an Abel coordinate, the velocity-addition law follows algebraically. Thus D' is not derived by the A–D hypotheses; it is the additional projective input whose physical derivation is left open. It is a projective response-balance assumption: the physically composed quantity is the ratio of realized order to remaining capacity, analogous to a log-odds or rapidity coordinate. For any candidate UV program, the diagnostic defect is

$$\Delta_{D'}(x, y) := \log R(C(x, y)) - \log R(x) - \log R(y),$$

which must vanish for the exact projective tanh representative. Establishing $\Delta_{D'} = 0$ from a microscopic theory remains an open physical task.

Physical content of D . Axiom D is the deepest composition axiom. It states that the geometric response must be *self-consistent under coarse-graining*: observing the universe at two successive scales and combining the results must give the same answer as observing at the combined scale directly. This is the defining property of a renormalization group.

The composition law (6) encodes the requirement that the theory be *scale-coherent* in the following precise sense: the response function S_T is a homomorphism from the additive structure of the control parameter to the composition algebra of responses; i.e., no preferred scale exists at which this homomorphism property breaks

down or changes character. The absorbing boundary condition $\mathcal{C}(S, S_{\max}) = S_{\max}$ reflects the fact that fully saturated geometry cannot be further ordered – it is a fixed point.

The C^∞ -extension requirement has a direct physical interpretation: it demands that the composition law remains well-behaved *even near saturation*. In physical terms, this means that the approach to the geometric capacity limit is smooth and does not introduce new divergences or critical exponents. Three physical arguments support this requirement:

(a) *No new phase transition at saturation.* A composition that develops singular derivatives at the boundary would signal a phase transition *within* the saturation process itself – i.e., the saturation mechanism would break down precisely where it is needed most. The smoothness condition excludes such pathological behavior. This is distinct from phase transitions at the *onset* of saturation (which are permitted and correspond to the CRM’s transition epoch a_{trans}); the boundary regularity concerns the *fully saturated* regime.

(b) *Distinction from critical phenomena.* While critical exponents and divergent susceptibilities characterize phase transitions at finite temperature (the Curie point in ferromagnets, T_c in superfluids), the saturation boundary $S \rightarrow S_{\max}$ is an *asymptotic* regime ($g \rightarrow \infty$), not a critical point. In the ferromagnetic analogy, it corresponds to $T \rightarrow 0$ (complete alignment), not to $T \rightarrow T_c$ (critical fluctuations). The zero-temperature limit of the magnetization *is* smooth ($M \rightarrow M_s$ exponentially in mean-field theory and as a power law in low T , but without divergent derivatives of the *composition* of magnetizations). The C^∞ requirement is therefore physically appropriate for the saturation boundary.

(c) *Analyticity of the vacuum state.* In quantum field theory, the vacuum is an analytic state: all correlation functions at the vacuum are smooth. Since full saturation ($S = S_{\max}$) represents the geometric analog of the vacuum (the maximally ordered state), the composition of responses near this state should inherit the smoothness of the vacuum.

Connection to CRM. In the CRM, the composition law emerges from the thermodynamic structure: the curvature return potential Ω_Φ at scale $a_1 \cdot a_2$ is determined by the potentials at a_1 and a_2 through the saturation ODE’s group property. The tanh function satisfies $\tanh(u_1 + u_2) = (\tanh u_1 + \tanh u_2)/(1 + \tanh u_1 \tanh u_2)$, which is precisely a composition law of the required form with $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy/S_{\max}^2)$.

III. THE SATURATION THEOREM

A. Statement

Theorem 1 (Saturation Theorem, projective-collar form). *Let T be a theory whose effective response function $S_T(g)$ satisfies Axioms A–D, the antisymmetry con-*

dition B' , and the separate one-dimensional reversible-channel hypothesis $D^\pm$ of Axiom 6. Then the normalized response $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max}$ admits an odd Abel coordinate $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y).$$

If, in addition, the projective double-boundary quotient assumption D' holds, then there exist constants $\alpha > 0$, $S_{\max} > 0$, and a strictly monotone additive normal-form coordinate $u = u(g)$ with $u(0) = 0$, such that

$$S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g)). \quad (9)$$

The composition law is then determined as the relativistic velocity addition $\mathcal{C}(x, y) = (x+y)/(1+xy)$, up to rescaling by $S_{\max}$. Without D' , these hypotheses determine the Abel/collar structure but do not exclude all smooth non-projective collars.

Table I separates the logical layers of the corrected result. This prevents the compatibility discussion in Section V and the empirical remarks in Section VII from being read as proof of the projective quotient.

B. Key Lemmas

The uniqueness of $\operatorname{arctanh}$ rests on a projective quotient, not on smoothness alone.

Lemma 1 (Projective quotient selects $\operatorname{arctanh}$). *Let C be a continuous, strictly monotone, commutative and associative group law on $(-1, 1)$ with neutral element 0. Suppose C has an Abel coordinate ϕ ,*

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y),$$

and satisfies the projective quotient law (8). Then there exists $c > 0$ such that

$$\phi(x) = c \operatorname{arctanh}(x), \quad C(x, y) = \frac{x+y}{1+xy}.$$

Proof. Set $L(x) := \frac{1}{2} \log((1+x)/(1-x)) = \operatorname{arctanh}(x)$. By D' ,

$$L(C(x, y)) = L(x) + L(y).$$

Thus $F(t) := \phi(\tanh t)$ is a continuous additive function of $t = L(x)$, so $F(t) = ct$ for some $c > 0$. Hence $\phi(x) = cL(x) = c \operatorname{arctanh}(x)$, and solving $L(C) = L(x) + L(y)$ gives $C(x, y) = (x+y)/(1+xy)$. $\square$

Remark 3 (Why D' is necessary). *The family $\phi_\varepsilon(x) = \operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$ is odd, smooth and strictly increasing for small ε , diverges at the boundary, and induces a smooth positive saturation collar through $q_\varepsilon = e^{-2\phi_\varepsilon}$. Hence the old claim that C^∞ boundary regularity alone excludes all non- $\operatorname{arctanh}$ Abel coordinates is too strong. The corrected theorem uses D' as the mathematical and physical normalization that removes this boundary-gauge freedom.*

C. Proof of the Saturation Theorem

The proof proceeds in three steps.

Step 1: Derivation of the functional equation. Define the normalized response $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max} \in [0, 1)$. Axioms A and C guarantee that σ is bounded and monotonically increasing. Axiom D [Eq. (6)] requires the existence of a composition:

$$\sigma(g_1 \oplus g_2) = C(\sigma(g_1), \sigma(g_2)), \quad (10)$$

where $C : [0, 1) \times [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ is commutative, associative, has neutral element 0, and absorbing boundary 1.

Step 2: Reduction to Abel's equation. By Axiom B, σ has the local expansion (3) with $c_1 > 0$. Axiom B' [Eq. (4)] provides the odd extension $\sigma(-g) = -\sigma(g)$. Together with the reversible-channel hypothesis $D^\pm$, this gives a smooth cancellative group operation on $(-1, 1)$ with absorbing boundaries at ± 1 treated only as limiting faces.

Under $D^\pm$, the associativity condition $C(C(x, y), z) = C(x, C(y, z))$ and commutativity define a *one-parameter continuous group law* on $(-1, 1)$ (the Taylor expansion at the origin defines a one-dimensional commutative formal group law in the sense of [21]; here the connection is that any smooth, associative, commutative binary operation on a neighborhood of $0 \in \mathbb{R}$ with neutral element 0 is, by Taylor expansion, a formal group law over $\mathbb{R}$, and conversely, Aczél's analytic theorem applies to the convergent realization of this formal structure on the interval $(-1, 1)$). We apply Aczél's representation theorem [20] to the open interval $(-1, 1)$, where C is smooth, strictly monotone in each argument, and the neutral element 0 lies in the interior. The absorbing boundary conditions $C(x, \pm 1) = \pm 1$ are *not* part of the domain on which Aczél's theorem is applied; they are treated as limiting behavior. Specifically, Aczél's theorem yields a continuous, strictly monotone function $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ with $\phi(0) = 0$. The absorbing boundary conditions then imply $\phi(x) \rightarrow +\infty$ as $x \rightarrow 1^-$ and $\phi(x) \rightarrow -\infty$ as $x \rightarrow -1^+$ (since $C(x, y) \rightarrow 1$ as $y \rightarrow 1$ forces $\phi(x) + \phi(y) \rightarrow \infty$, which requires $\phi(y) \rightarrow \infty$):

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y). \quad (11)$$

This is Abel's functional equation. (*Proof step corrected in this revision; an earlier version wrote $\phi'(0) = c_1$ from Axiom B, which was a category error: c_1 is the derivative of the response profile σ at the control-parameter origin, not of the Abel coordinate ϕ at the response origin.*) The clean construction proceeds via the invariant vector field: let $a(x) = \partial_2 C(x, 0)$; under $D^\pm$, translations are orientation-preserving diffeomorphisms, hence $a(x) > 0$ on $(-1, 1)$, and one may define $\phi(x) = \int_0^x dt/a(t)$. The invariance of a under the group law then gives $\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y)$, and ϕ inherits the C^∞ regularity of C on $(-1, 1)$ directly from this integral representation. The function ϕ is determined up to a positive multiplicative constant, and antisymmetry (Axiom B') lets it

TABLE I. Proof-status ledger for the corrected Saturation Theorem.

Layer	Input	Output	Status / non-claim
A–D, B', $D^\pm$	Bounded, cooperative, signed one-dimensional interior composition	Odd Abel coordinate and hyperbolic collar class	Theorem-level, conditional on the single-channel hypotheses; not yet a unique tanh profile.
D'	Projective double-boundary quotient $R(C) = R(x)R(y)$	Canonical tanh representative and velocity-addition law	Additional projective assumption; treated as diagnostic, not derived here from a UV program.
QG program map	LQG, asymptotic safety, holography, causal sets, CDT and NCG	Compatibility pattern for A–D, $D^\pm$ and D'	Motivation and filter; not a verification that any program satisfies all inputs.
CRM data anchor	Existing CRM fit and monotone transition evidence	Empirical motivation for using saturation dynamics	Not an independent test of this theorem, because the CRM already used a tanh profile.
Perturbed extensions	Multi-field, stochastic, EFT or UV–IR matching defects	Future residual/gap test $r_X/g_X \ll 1$	Recommended stability extension; not part of the present proof.

be chosen odd; Axiom B supplies $\sigma'(0) = c_1 > 0$, which enters only through the product $(\phi \circ \sigma)'(0) = \phi'(0) c_1$ fixing the overall positive scale α . At this stage Axioms A–D give an Abel/collar theorem, not yet $\phi = \text{arctanh}$.

Step 2b: Projective double-boundary quotient. If the additional assumption D' holds, Lemma 1 gives $\phi = \text{carctanh}$. D' is the projective double-boundary quotient assumption, not a consequence of A–D: once $R = (1+x)/(1-x)$ is fixed before choosing an Abel coordinate, the velocity-addition law follows algebraically. This yields the composition law:

$$C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad (12)$$

which is the relativistic velocity addition formula. The uniqueness is therefore projective: it is uniqueness after fixing the boundary quotient $R = (1+x)/(1-x)$, not uniqueness from bare smoothness of all Abel collars.

Step 3: Inversion to tanh. Since $\phi(\sigma(g)) = \text{carctanh}(\sigma(g))$ must be an additive function of the control parameter (i.e., $\phi(\sigma(g)) = \alpha u(g)$ for a reparametrization u and constant $\alpha > 0$), we obtain:

$$\sigma(g) = \tanh(\alpha u(g)), \quad (13)$$

and therefore $S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$, after absorbing the positive constant c into αu . When Axioms A–D, B', $D^\pm$, and D' hold exactly, the result is exact. Approximate axiom satisfaction (e.g., breakdown of the composition law at very small g where standard GR dominates) would introduce corrections; a formal stability analysis of such perturbations is an open problem. $\square$

Corollary 1 (Monotonicity from the reversible response channel). *Under the reversible-channel hypothesis $D^\pm$, Axiom C (monotone cosmic control) follows from Axioms A, B, B', and D. That is, any response function satisfying $A+B+B'+D^\pm$ is automatically strictly monotonically increasing on the one-dimensional channel.*

Proof. Choose the additive coordinate for the one-dimensional control composition, so that the channel

composition is written as $g + h$ near the identity. Differentiate $\sigma(g + h) = C(\sigma(g), \sigma(h))$ with respect to h at $h = 0$:

$$\sigma'(g) = \partial_2 C(\sigma(g), 0) \cdot \sigma'(0).$$

Define $a(x) := \partial_2 C(x, 0)$. By $D^\pm$, for each fixed $x \in (-1, 1)$ the map $y \mapsto C(x, y)$ is a C^∞ diffeomorphism of $(-1, 1)$ (its inverse is $y \mapsto C(-x, y)$ from the group inverse). Therefore $\partial_2 C(x, 0) = a(x) \neq 0$ for all $x \in (-1, 1)$. Since $(-1, 1)$ is connected and $a(0) = \partial_2 C(0, 0) = 1 > 0$ (from $C(0, y) = y$), continuity implies $a(x) > 0$ for all x . With $\sigma'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B), we obtain $\sigma'(g) = a(\sigma(g)) \cdot c_1 > 0$ for all g . $\square$

Remark 4. *This means the axiom system can be reduced to A, B/B', and $D^\pm$ plus the derived consequence C whenever the one-dimensional interior group law is physically justified. We retain Axiom C as a separate statement for physical transparency: it makes the monotonicity assumption explicit and connects directly to the thermodynamic arrow of time. Without $D^\pm$, it should be read as an independent single-channel assumption.*

Proposition 1 (Axiom non-redundancy). *The following examples are separation sketches, not a complete independence theorem; full pairwise independence of the axiom set is not claimed. (Two examples corrected in this revision after external review.) Since Axiom D is formulated in the bounded response domain, item (1) should be read as an algebraic interior-composition example after the capacity bound is removed, not as a full model of the finite-capacity axiom system.*

(1) *Violates A, satisfies B/B' and the algebraic interior-composition part of D: $\sigma(g) = g$ (unbounded linear response; $C(x, y) = x + y$, associative and commutative).*

(2) *Violates the local oddness of B/B', satisfies A, C, D: $\sigma(g) = 1 - e^{-g}$ for $g \geq 0$, with $C(x, y) = x + y - xy$ (probabilistic or). Correction: an earlier version listed this as “violates B', satisfies B”; in fact the Taylor expansion*

$1 - e^{-g} = g - g^2/2 + g^3/6 - \dots$ contains a quadratic term, so the example violates the odd local expansion required by Axiom B itself, not only the signed extension B' . It separates $\{B, B'\}$ from $\{A, C, D\}$ but does not separate B from B' .

(3) Violates C (and A on the positive branch), satisfies B/B' locally but not $D^\pm$: $\sigma(g) = \tanh(g) \cdot \cos(\epsilon g)$ for small $\epsilon > 0$. Correction: an earlier version claimed this example “satisfies A ”; in fact, for $g \gg 1$ the factor $\cos(\epsilon g)$ changes sign, so on the positive branch the example also violates the nonnegativity of Axiom A and possesses no saturation limit in the sense of Axiom C. It therefore separates $\{C\}$ (and monotone saturation generally) from local $\{B, B'\}$, but it is not a witness that C is independent of A . A cleaner candidate witness for C -independence – a smooth, odd, bounded profile of the form $\sigma(g) = \tanh(g) + \epsilon \psi(g)$ with ψ a compactly supported odd bump chosen so that $0 \leq \sigma < 1$ on $g \geq 0$ but $\sigma' < 0$ on some interval – should be verified in a separation ledger before being asserted. By Corollary 1, C is in any case not independent of $\{A, B, B', D^\pm\}$ jointly – it follows as a derived consequence under the interior group law. C is retained for physical clarity and to make the single-channel arrow explicit.

(4) Violates D , satisfies $A-C, B'$: $\sigma(g) = (2/\pi) \arctan(g)$; bounded, monotone, antisymmetric, but its induced composition (via $\phi = \tan(\pi x/2)$) develops divergent second derivatives ($\sim \epsilon^{-1}$) at the boundary of $[-1, 1]^2$, failing the C^∞ -extension requirement of Axiom D. Similarly, $\sigma(g) = g/\sqrt{1+g^2}$ (with $\phi(x) = x/\sqrt{1-x^2}$) has divergent second derivatives at the boundary ($\sim \epsilon^{-1/2}$).

D. Interpretation

The theorem states that $\tanh$ is not a mere *model choice*, but the *canonical projective representative* of a one-dimensional Abel saturation channel. The key mathematical insight is two-step: Axiom D forces the response function to be the inverse of an Abel coordinate, and D' fixes the otherwise free boundary collar by making the projective quotient $R = (1+x)/(1-x)$ multiplicative.

Physically, the theorem says:

Any quantum gravity theory that is scale-coherent, cooperative, bounded, monotone, signed, reversible in a one-dimensional response channel, and whose saturation boundary satisfies the projective double-boundary quotient assumption D' must produce cosmological saturation dynamics of the $\tanh$ type. Without that quotient assumption, the theorem gives an Abel/collar class rather than a unique profile.

The reparametrization $u(g)$ absorbs the microscopic details of the theory: different UV completions correspond to different functions $u(g)$. The common $\tanh(\alpha u)$

form is forced only after the projective boundary ratio has been identified as the physical composition variable.

IV. NON-PROJECTIVE COMPOSITION LAWS

Corollary 2 (Non-projective composition laws rather than profile names). *The exclusions below are exclusions of the induced response composition and boundary quotient under the chosen additive coordinate. They are not coordinate-free exclusions of graph shapes under arbitrary monotone reparametrization. None of the following induced laws can simultaneously satisfy the theorem’s structural hypotheses plus the projective quotient assumption D' , except when reducible to the $\tanh$ form via admissible reparametrization $u(g)$:*

(i) **Logistic profile:** $S_{\max}/(1 + e^{-\beta u})$.

(ii) **Rational profile:** $S_{\max} u/(1 + u)$.

(iii) **Arctangent profile:** $S_{\max} (2/\pi) \arctan(\beta u)$.

(iv) **Hard saturation:** $S_{\max} \min(u, 1)$.

Proof. Each alternative fails a specific axiom:

(i) *Logistic.* The logistic function $L(u) = 1/(1 + e^{-\beta u})$ has $L(0) = 1/2 \neq 0$, violating the neutral element condition. The shifted logistic $\tilde{L}(u) = (L(u) - 1/2) \cdot 2$ yields $\tilde{L}(u) = \tanh(\beta u/2)$ – precisely the $\tanh$ form. Therefore, any “logistic” model that satisfies Axiom D is actually $\tanh$ in disguise.

(ii) *Rational.* The function $R(u) = u/(1 + u)$ has Abel transform $\phi(x) = x/(1 - x)$, yielding $C(x, y) = \phi^{-1}(\phi(x) + \phi(y)) = (x + y - 2xy)/(1 - xy)$. For small x, y , this gives $C(x, y) \approx x + y - 2xy$. The quadratic cross-term $-2xy$ is incompatible with the antisymmetry condition (Axiom B'): an antisymmetric σ implies that the induced composition must satisfy $C(-x, -y) = -C(x, y)$, but $(x + y - 2xy)/(1 - xy)$ does not. Equivalently, $R(u)$ itself is not antisymmetric, violating Axiom B' .

(iii) *Arctangent.* The function $A(u) = (2/\pi) \arctan(\beta u)$ has Abel transform $\phi(x) = \tan(\pi x/2)$, yielding $C(x, y) = (2/\pi) \arctan(\tan(\pi x/2) + \tan(\pi y/2))$. While this composition is well-defined and smooth on the open square $(-1, 1)^2$, it cannot be extended smoothly to the closed square $[-1, 1]^2$: the second partial derivatives $\partial^2 C/\partial x^2$ and $\partial^2 C/\partial x \partial y$ both diverge as $(x, y) \rightarrow (1, 1)$ (numerically $\sim \epsilon^{-1}$ along $x = y = 1 - \epsilon$), violating the C^∞ boundary regularity requirement of Axiom D. This algebraic (ϵ^{-1}) divergence is characteristic of Abel functions with power-law boundary behavior. Logarithmic collars are the admissible boundary class at this face; D' then selects the projective logarithmic collar $\operatorname{arctanh}$ from that class.

(iv) *Hard saturation.* $\min(u, 1)$ is not C^∞ at $u = 1$, violating the smoothness requirement of Axiom B. $\square$

Remark 5. *The logistic case (i) is instructive: it appears to be a genuine alternative, but the composition law plus*

the projective quotient force it to reduce to $\tanh$. This illustrates the power of scale coherence together with D' : surface-level freedom in the profile choice is reduced to a boundary-collar choice, and the projective quotient fixes the CRM rapidity representative.

V. COMPATIBILITY MAP WITH QUANTUM-GRAVITY MOTIFS

We now map how A–D are naturally compatible with motifs in major quantum gravity programs when restricted to cosmological observables. The stronger interior form $D^\pm$ and the projective double-boundary quotient assumption D' are tracked separately as open diagnostics.

A. Loop Quantum Gravity / Loop Quantum Cosmology

In Loop Quantum Cosmology (LQC) [22, 23], the modified Friedmann equation reads:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \quad (14)$$

where $\rho_c \sim \rho_{\text{Pl}}$ is a critical density set by the Barbero-Immirzi parameter γ_{BI} . This has exactly the structure of a saturation equation: the expansion rate is bounded ($H^2 \leq H_{\text{max}}^2$), and the bounce at $\rho = \rho_c$ replaces the classical singularity.

Axiom A: The critical density ρ_c provides finite geometric capacity. *Axiom B:* For $\rho \ll \rho_c$, the standard Friedmann equation is recovered with $c_1 > 0$. The holonomy corrections are cooperative: the departure from GR grows with curvature. *Axiom C:* In the expanding branch ($\dot{a} > 0$), the solution is monotone. *Axiom D:* LQC does not possess a manifest RG composition law in the sense of Axiom D; the effective equations inherit diffeomorphism invariance from full LQG, which provides structural coherence across scales, but a rigorous derivation of the associative composition property (6) from the LQG Hilbert space remains an open problem (hence the “?” in Table II).

Defining $X = 1 - 2\rho/\rho_c$, the LQC Friedmann equation (14) can be rewritten as $H^2 \propto (1 - X^2)$. The factor $(1 - X^2)$ is the same nonlinearity that appears on the right-hand side of the saturation ODE (1); note, however, that the LQC equation governs H^2 while the CRM ODE governs dX/da – the structural analogy is in the saturation mechanism, not a direct identification of the two equations. The CRM parameters k and Φ_0 would map to the LQG minimum area gap Δ (the smallest nonzero eigenvalue of the area operator) and the Barbero-Immirzi parameter γ_{BI} , though this mapping has not been rigorously derived.

B. Asymptotic Safety

In the asymptotic safety program [8–10], the gravitational effective action has a UV fixed point $g^* > 0$ where the dimensionless Newton’s constant and cosmological constant become scale-independent. The RG flow from UV to IR defines the effective gravitational coupling G_k and cosmological “constant” Λ_k as functions of the RG scale k .

Axiom A: The UV fixed point provides a finite upper bound on the effective coupling. *Axiom B:* The flow away from the fixed point is cooperative: the relevant direction has positive critical exponent [10]. *Axiom C:* The flow is monotone along the relevant direction (by definition of relevance). *Axiom D:* A clarification is needed. The Wilson RG semigroup $R_{k_1} \circ R_{k_2} = R_{k_1 k_2}$ operates on the space of couplings (the “theory space”), not directly on the response function S_T . To connect the two, one must project the RG flow onto the single relevant direction parametrized by g . In the asymptotic safety scenario with a UV fixed point, the flow near the fixed point is controlled by a finite number of relevant directions; in the simplest truncation (Einstein-Hilbert with G_k, Λ_k), there are typically two relevant directions. The single-field assumption of Axiom D corresponds to restricting attention to the dominant relevant direction, under which the RG semigroup on theory space induces a composition law on the one-dimensional response $S_T(g)$. This projection is exact when a single relevant direction dominates (as in the cosmological sector), and approximate otherwise – a limitation shared with the single-field restriction of the theorem (see Limitation 4).

Asymptotic safety is therefore one of the closest matches to Axiom D, because its central language is renormalization-group evolution.¹ The asymptotic safety scenario for cosmology [24] produces effective Friedmann equations with saturation behavior at high curvature, consistent with the $\tanh$ form.

Recent computations within increasingly sophisticated truncations provide growing numerical evidence for the Reuter fixed point. Eichhorn and Held [7] report that asymptotic safety constrains the top-quark Yukawa cou-

¹ The self-similar, scale-recursive character of Axiom D is not confined to cosmological RG flow; the same motif surfaces in the distribution of the prime numbers. In the primon (Riemann) gas of Julia [35], a system of non-interacting bosonic oscillators with energies $\log p$ over the primes p has the Riemann zeta function as its partition function. Hartnoll and Yang [34] have shown that the Belinsky-Khalatnikov-Lifshitz dynamics of gravity near a spacelike singularity is, upon semiclassical quantisation, a modular-invariant conformal quantum mechanics whose states realise exactly such a prime-labelled oscillator gas, with wavefunctions proportional to automorphic L -functions on the critical axis. This suggests that black-hole singularities may be a further physical setting in which a capacity-limited, self-similar geometric ordering of the type encoded by the axioms arises naturally. We record the connection as a motivating parallel, not as an independent verification of Axioms A–D.

pling, yielding a prediction of approximately 171 GeV for the top-quark pole mass, consistent with the observed value of 172.6 ± 0.3 GeV [29] – a concrete particle-physics consequence of the UV fixed point. More broadly, Eichhorn [6] reviews how the fixed-point structure can accommodate the Standard Model matter content without additional fine-tuning. These results strengthen the case that the asymptotic safety program is a strong candidate realization of the axioms: the fixed-point existence (Axiom A), cooperative flow (Axiom B), and RG composition (Axiom D) are all directly tied to state-of-the-art functional RG computations.

C. String Theory and Holography

In string theory, the UV finiteness of the string amplitude provides Axiom A. The string landscape, while introducing a selection problem, does not violate the axioms for any *specific* vacuum: within a given compactification, the low-energy EFT has a unique RG flow satisfying Axioms B–D.

The holographic approach (AdS/CFT [14]) provides particularly strong support for Axiom D: the bulk/boundary correspondence *is* a composition law relating geometric descriptions at different scales. The Ryu-Takayanagi formula [25] and its quantum corrections establish a monotone relationship between entanglement entropy and geometric area, satisfying Axiom C.

For cosmological applications, the de Sitter entropy bound $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G) < \infty$ provides Axiom A, while the holographic RG flow [26] provides the composition structure.

D. Causal Set Theory

In causal set theory [15, 16], the cosmological constant arises as a dynamical quantity $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$, where N is the number of causal set elements. This produces a cosmological “constant” that decreases as the universe grows, approaching a finite asymptotic value – precisely the saturation behavior of Axiom C.

Axiom A: Finite density of causal set elements provides geometric capacity. *Axiom B:* While the Poisson sprinkling itself is uncorrelated, the *dynamics* of causal set evolution (sequential growth models [16]) produce cooperative ordering: newly added elements preferentially attach to the existing causal structure, enhancing geometric order. *Axiom C:* The $1/\sqrt{N}$ scaling is monotonically decreasing. *Axiom D:* The sequential growth dynamics provide a natural composition law, though its precise relationship to the RG composition of Axiom D requires further analysis.

E. Causal Dynamical Triangulations

Causal Dynamical Triangulations (CDT) [32, 33] construct quantum gravity via a regularized path integral over causal triangulations. Monte Carlo simulations reveal a phase diagram with a physically relevant “de Sitter phase” (phase C_{dS}) in which the emergent geometry has Hausdorff dimension $d_H \approx 4$ and a volume profile well-described by Euclidean de Sitter space.

Axiom A: The triangulation provides a finite number of building blocks per spacetime volume, enforcing finite geometric capacity. *Axiom B:* In the de Sitter phase, the volume profile grows cooperatively before saturating – the geometric ordering is self-reinforcing. The odd-power structure (Axiom B’) remains an open signed-channel derivation. *Axiom C:* The de Sitter volume profile is monotone (in the expanding branch). *Axiom D:* CDT possesses natural blocking transformations (coarse-graining of triangulations), providing a candidate for the composition law, but the precise associative structure has not been rigorously established.

F. Noncommutative Geometry

Connes’ program [17] reconstructs geometry from spectral data (the Dirac operator on a noncommutative algebra). The spectral action principle yields the Standard Model Lagrangian coupled to gravity from the spectrum of a single operator.

Axiom A: The spectral action has a natural UV cutoff Λ (the energy scale at which the spectral sum is evaluated), providing finite geometric capacity. *Axiom B:* The Seeley-DeWitt coefficients $a_0, a_2, a_4, \dots$ of the heat kernel expansion have even powers of Λ ; the odd-power structure required by Axiom B emerges after reparametrization to a suitable coupling variable, but this identification requires further analysis. *Axiom C:* The spectral flow is monotone in the appropriate direction. *Axiom D:* The composition of spectral triples provides algebraic composition coherence.

G. Summary: Why Universality?

Table II summarizes the compatibility map. No single external QG program has been rigorously proven here to satisfy A–D, $D^\pm$, and D' simultaneously; rather, each program supplies compatible motifs for a substantial subset, with the remaining axioms being open derivation tasks. No entry in this table is a proof that a UV programme satisfies D' or $D^\pm$. The table records compatibility signals and open derivation tasks. D' is especially important: it is not verified for the listed UV programs in this paper, but is imposed by the CRM effective channel as a projective double-boundary quotient assumption. The theorem’s value is therefore twofold: (i) as a *conditional* result, it identifies the precise conditions under

which tanh saturation is expected, and (ii) as a *diagnostic*, it pinpoints which properties of each QG program require further investigation. The broad compatibility across programs explains the Abel/collar-level universality of saturation dynamics; the exact tanh representative additionally requires the projective quotient.

VI. SPACETIME AS AN ORDERED PHASE

The broad axiom satisfaction documented in Table II raises a conceptual question: if the projective tanh representative recurs whenever D' is physically realized, what does this universality *mean* for the nature of spacetime?

A. The conceptual shift

The Saturation Theorem, combined with the CRM's empirical success, suggests a possible interpretive reading of quantum gravity:

In this reading, quantum gravity is not merely the quantization of the metric, but also the theory of how geometric order emerges from a pre-geometric quantum system.

The tanh saturation is therefore best read as a conditional signature of a capacity-limited cooperative ordering process, once the one-dimensional composition law and D' are fixed. This does not make it independent evidence for a particular microscopic ontology; it supplies a common normal-form language for spin-network, string/holographic, causal-set, or code-subspace realizations when they satisfy the stated gates.

B. The ferromagnetic analogy

The analogy with spontaneous magnetization is useful at the level of a mean-field Ginzburg-Landau free-energy model. The CRM saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ can be written as the equation of motion for the order parameter of a second-order phase-transition toy model with double-well free energy $F(X) = -k(X - X^3/3)$. Paper III [3] develops this analogy in detail, identifying:

Ferromagnetism	CRM Cosmology
Magnetization M	Curvature return Ω_Φ
Inverse temperature $J/k_B T$	Scale factor a
Curie point $(J/k_B T_c)$	Transition a_{trans}
Spin interaction J	Curvature coupling k
Saturation M_s	Saturation Φ_0
$\tanh(J/k_B T)$	$\tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$

The Saturation Theorem provides a mathematical guardrail for this analogy at the *mean-field level*: both systems satisfy an Abel-type composition structure in the mean-field approximation, and the usual mean-field

magnetization corresponds to the projective tanh representative. We note that the exact magnetization of a d -dimensional Ising model deviates from the mean-field tanh near the critical temperature ($M \sim (T_c - T)^\beta$ with non-trivial critical exponent $\beta \neq 1/2$ for $d < 4$). This deviation corresponds to the breakdown of the one-dimensional projective-collar approximation near the *critical point* (the onset of ordering), not near *saturation* ($T \rightarrow 0$). The analogy is therefore limited to the saturation regime and mean-field theory; fluctuation corrections near criticality require a multi-field extension (see Outlook). Within that domain, the relation is structural rather than a mere metaphor.

Having established the ontological framework, we now turn to its empirical consequences.

VII. OBSERVATIONAL CONSEQUENCES AND OPEN QUESTIONS

A. What the theorem predicts

The Saturation Theorem has two classes of test targets. Table III separates theorem-facing tests from CRM-specific or UV-dependent evidence.

Projective-collar predictions (after D' is imposed):

1. If the projective boundary quotient is physically realized, the cosmological expansion history should be compatible with tanh-type saturation. We emphasize that the CRM's $\Delta\chi^2 = -5.5$ result [2] does *not* constitute an independent test of the theorem, since the CRM was constructed with a tanh profile before the axioms were formulated. The theorem's empirical content is the *composition law* $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$, which is a prediction beyond any individual profile fit. An independent test would require either (a) fitting a model-agnostic tanh-template to SN+CMB+BAO data without CRM-specific priors, or (b) verifying the composition law directly by comparing saturation responses at different redshift bins and checking consistency with the velocity-addition rule.
2. Within the CRM fit, the running curvature coupling $\beta_{\text{eff}}(a)$ is reported as a monotone transition function ($\beta_{\text{early}} \approx 2.8 \rightarrow \beta_{\text{late}} \approx 2.0$ [2]); its theorem-facing status is as a consistency check for Axiom C, not as an independent derivation.
3. No alternative relaxation profile (logistic, power-law, etc.) can claim support from this theorem unless it also realizes a scale-coherent composition law and explains the projective quotient.

UV-dependent predictions (discriminating between completions):

1. The specific values of k (saturation rate), Φ_0 (saturation amplitude), and γ (coupling constant) depend on the UV theory.

TABLE II. Compatibility map with quantum-gravity motifs. $\checkmark$ = compatible motif with explicit construction, $(\checkmark)$ = compatible motif requiring mild assumptions, $?$ = open derivation, no = known obstruction. The D' column records whether the projective double-boundary quotient is derived or explicitly assumed.

Program	A	B/B'	C	D	D'
LQG/LQC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$	$?$
Asymptotic safety	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$
Strings/holography	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$
Causal sets	$\checkmark$	$?$	$\checkmark$	$?$	$?$
CDT	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$	$?$
NCG	$\checkmark$	$?$	$?$	$?$	$?$
CRM (effective)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	assumed

TABLE III. Observational and UV-evidence ledger. The table separates what is tested by the normal-form theorem from what belongs to the CRM fit or to a future UV completion.

Target	Current role	Claim status	Next gate
Profile fit	Compatibility of late-time expansion with a tanh-type template	Diagnostic only; CRM was built with a tanh profile and is not an independent theorem	Model-agnostic template fit without CRM-specific priors
Composition law	Direct content of the projective normal form	Theorem-facing empirical target once D' is assumed	Compare saturation responses across redshift bins against $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$
D' defect	UV selection of the projective collar	Open physical derivation, not established by the QG-program	Compute or bound $\Delta_{D'} = \log R(C) - \log R(x) - \log R(y)$ in a candidate UV model
Parameter values	k, Φ_0, γ and transition sharpness	CRM-/UV-specific, not determined by the theorem	Derive parameters from a microscopic model and compare to CRM fits
Oscillatory residuals	Possible UV-sensitive late-time residual pattern	Candidate signature only; not a proof of quantum origin by itself	Pre-register frequency/window/null controls before interpreting BAO or SN residuals

2. The transition sharpness (n in the sigmoidal transition) would encode a universality class if a UV-to-cosmology map is supplied.
3. Sub-Planckian corrections to the tanh profile should be treated as UV-theory-specific candidates until matched controls are defined.

B. The missing piece: why *these* parameters?

The Saturation Theorem determines the Abel/collar structure and, under D', the projective *form*, but not the *coefficients*. The remaining open question is:

Why does the universe have the specific values $k \approx 9.8$, $\Phi_0 \approx 0.43$, $\gamma \sim \mathcal{O}(1) H_0^{-2}$?

This question is analogous to the fine-structure constant problem: the *existence* of electromagnetic coupling is forced by gauge symmetry, but the *value* $\alpha \approx 1/137$ is not determined by the symmetry alone.

Several UV completions make specific predictions:

- **LQC:** Φ_0 maps to the Barbero-Immirzi parameter γ_{BI} , which is constrained by black hole entropy [27]. This would predict a specific value of Φ_0 .

- **Asymptotic safety:** The critical exponents at the UV fixed point determine the transition sharpness n , providing a specific prediction for the shape of $\beta_{\text{eff}}(a)$ [9].

- **Holography:** The de Sitter entropy $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G)$ relates Φ_0 to the ratio of UV and IR scales.

A concrete test case is the $\sqrt{\pi}$ conjecture of Paper II [2]: the CRM predicts a MOND-like enhancement factor $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ arising from Gaussian normalization of the saturation partition function. Deriving this value from a specific UV completion would directly connect quantum gravity parameters to observed galactic dynamics.

C. Scalar field oscillations as a QG signature

Paper III [3] shows that the Pöschl-Teller potential supports a discrete spectrum of bound states. In the cosmological context, these correspond to oscillatory corrections to the expansion rate at late times:

$$H^2(a) = H_{\text{smooth}}^2(a) \left[1 + \epsilon \cdot e^{-\Gamma a} \cos(\omega a + \delta) \right], \quad (15)$$

with $\epsilon \ll 1$. These oscillations would be a candidate signature of microscopic structure in the saturation mechanism – analogous in spirit to discrete energy levels of a quantum system. Detection in high-precision BAO or SN data would support a UV-sensitive residual channel only if the frequency window, damping scale, and null controls were fixed before fitting; it would not by itself prove the quantum origin of CRM saturation.

VIII. DISCUSSION AND OUTLOOK

A. What has been achieved

1. **A conditional normal-form/no-go statement:** Any cosmological theory satisfying Axioms A–D, B', $D^\pm$, and the projective double-boundary quotient assumption D' must produce tanh-type saturation. Without D', the same structural hypotheses produce the Abel/collar structure.
2. **Universality clarified:** The observation that LQG, asymptotic safety, strings, causal sets, and NCG all produce structurally similar saturation dynamics is no longer mysterious at the Abel-structure level; the precise tanh representative additionally depends on the projective boundary quotient.
3. **CRM calibrated:** Under the stated axioms, the CRM's saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ can be interpreted as the projective normal form of capacity-limited cooperative relaxation rather than only as a phenomenological fit.
4. **Ontological interpretation:** In this framework, quantum gravity may be approached not only as metric quantization, but as a theory of geometric order – a transition from a pre-geometric quantum system to classical spacetime.

B. Relation to the CRM program

This paper supplies the conditional axiomatic layer of the CRM programme, but it does not complete the physical arc of the series. Following the July 2026 truth audit and Route 3 reconstruction, the logical status is:

1. The *form* of the dynamics (tanh) is a mathematical theorem once the signed interior composition hypotheses hold and the projective double-boundary quotient assumption D' is added; without D' the theorem proves the Abel/collar structure.
2. The historical direct trace-coupling route of Paper III is a failure audit; Route 3 is an action-level candidate whose full FLRW, Hamiltonian, PPN, lensing and data gates remain open.

3. The reported fit parameters constrain an effective phenomenological proxy, not yet a validated Route 3 or $f(R)$ realization.
4. The *UV completion* remains open – and must explain why the projective boundary quotient, rather than a different smooth collar, is the physical composition variable.

C. Post-Zookeeper stability-extension roadmap

The Post-Zookeeper programme is the author's proposed future framework for classifying admissible UV response channels; it is not used in the proof of the theorem below.

D. Limitations and caveats

1. **Axiom D and D' are strong.** The renormalization-group composition law is restrictive, and the projective double-boundary quotient assumption is an additional mathematical and physical choice. Theories without a well-defined RG flow (some discrete approaches, multiverse scenarios) may not satisfy D; theories with a different boundary collar may satisfy D but fail D'. This distinction is essential: D gives scale coherence, D' selects the tanh representative.
2. **The proof is algebraic, not constructive.** The theorem establishes the Abel structure of the response and, under D', its projective tanh representative, but it does not construct the UV theory. The “reparametrization” $u(g)$ absorbs microscopic information; determining $u(g)$ from first principles requires solving the specific QG theory. A potential objection is that any bounded monotone function can trivially be written as $\tanh(\alpha u(g))$ for a suitable $u(g)$, making the profile shape contentless. The non-trivial content therefore resides in the *composition law* and, for the tanh selection, in the projective quotient law $R(C) = R(x)R(y)$.
3. **Cosmological restriction and theory drift.** The axioms are formulated for a selected cosmological response channel and do not establish black-hole, gravitational-wave, screening or cluster phenomenology. Earlier chameleon- and Bullet-Cluster claims belong to the superseded route and are not consequences of this theorem. In the active Route 3 reconstruction, $c_T = 1$ has been confirmed only on the transverse-traceless family; scalar Hamiltonian stability, FLRW response, lensing and screening remain separate gates.
4. **The continuous group classification and single-field restriction.** The proof relies on

Aczél’s representation theorem for continuous associative operations [20] and the classification of one-dimensional formal group laws [21]. While these results are well-established, the physical applicability requires the assumption that the composition is *one-dimensional* – i.e., that there is a single relevant direction. This is a genuine limitation: the CRM itself (Paper IV [4]) introduces a vector sector alongside the scalar, and realistic modified gravity theories (e.g., Horndeski, beyond-Horndeski) generically have multiple coupled degrees of freedom. However, we note that the theorem applies to the *scalar sector in isolation*: the CRM’s scalar saturation channel $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ is a one-dimensional response that satisfies the axioms independently of the vector sector. The multi-field extension (classifying multi-dimensional commutative group laws, including elliptic and Lubin-Tate formal groups) is an open mathematical problem that would strengthen the theorem but is not required for the scalar-sector result.

5. **Boundary-collar freedom.** Smooth boundary behavior alone does not select arctanh . The counter-collar $\phi_\varepsilon = \text{arctanh} + \varepsilon x$ preserves a smooth positive boundary collar but changes the Abel coordinate. The uniqueness selection is therefore deliberately moved to D' : once the projective quotient $R = (1+x)/(1-x)$ is required to multiply under composition, $\text{arctanh} = \frac{1}{2} \log R$ follows immediately and uniquely up to scale.

E. The No-Go theorem as a class-internal filter

Within the $A-D+B'+D^\pm$ framework, failure of D' means that the $\tanh$ CRM law is not selected as the projective normal form. Such a failure does not falsify the UV model; it locates it outside the projective CRM subclass or identifies a measurable D' defect. Theories satisfying Axioms A–D together with B' and $D^\pm$ are constrained only to an Abel/collar saturation law. Theories satisfying these structural hypotheses and D' are constrained to $\tanh$ saturation in their cosmological response channel.

F. Relation to other frameworks

Swampland conjectures. The de Sitter swampland conjecture [30] posits $|\nabla V|/V \geq c \sim \mathcal{O}(1)$ in any quantum gravity landscape, disfavoring a strict cosmological constant. The Saturation Theorem is complementary: it does not address the existence of de Sitter vacua, but constrains the *dynamical approach* to the late-time attractor. A CRM-type saturation with $\Phi_0 < \infty$ is compatible with the swampland bound, since the effective dark energy density $\rho_\Phi(a)$ evolves dynamically rather than being

a fixed Λ .

EFT of Dark Energy. The effective field theory of dark energy [31] parametrizes deviations from Λ CDM at the level of the perturbed action. The Saturation Theorem operates at a different level: it constrains the *background* response function, not the perturbative operator basis. A future task is to express the $\tanh$ saturation in the EFT-of-DE language, mapping the CRM parameters (k, Φ_0, γ) to the EFT operator coefficients $\{\alpha_i(t)\}$.

G. Outlook

Three directions are immediate:

1. **Parameter derivation.** The next step is to derive k , Φ_0 , and γ from a specific UV completion. The most promising candidate is the LQG/holographic intersection, where the Barbero-Immirzi parameter and the holographic entropy bound may jointly fix the saturation parameters.
2. **Multi-field extension.** Extending the theorem to theories with multiple saturation channels (e.g., scalar + vector in the CRM [4]) requires the classification of multi-dimensional commutative group laws (the higher-dimensional analog of the Abel-equation reduction). This is mathematically richer and may yield constraints on the vector sector parameters K_B and $\mathcal{F}$.
3. **Black hole interior.** If the Saturation Theorem applies to black hole interiors (with the radial coordinate replacing the scale factor) and the projective boundary quotient is the correct interior collar, it predicts $\tanh$ -type singularity resolution – consistent with LQG bounce models [22] and the Planck star scenario [28].

IX. CONCLUSION

We have proven a corrected Saturation Theorem: finite geometric capacity, cooperative reinforcement, monotone cosmic control, renormalization-group composition, signed response, and the reversible one-dimensional response-channel hypothesis $D^\pm$ reduce one-dimensional cosmological saturation to an Abel-coordinate boundary-collar structure. The $\tanh$ profile follows when the saturation boundary is additionally fixed by the projective double-boundary quotient assumption $R = (1+x)/(1-x)$.

The theorem has three consequences:

1. The CRM’s saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ can be read as the *projective normal form* of capacity-limited cooperative relaxation once the boundary quotient is fixed.

2. The observation that LQG, asymptotic safety, string theory, causal sets, and noncommutative geometry all produce similar saturation structures is explained at the Abel/collar level; the specific tanh representative requires the projective quotient.
3. The paper offers an interpretive framework in which quantum gravity is studied not only as metric quantization, but also as the theory of geometric order – a transition from a pre-geometric quantum system to classical spacetime.

The remaining open problem – deriving the specific parameters (k, Φ_0, γ) and the projective boundary quotient from a UV completion – is the analog of deriving the fine-structure constant from a theory of quantum electrodynamics. The theorem constrains the *normal form* of any theory satisfying the stated hypotheses once the boundary quotient is fixed.

The saturation profile is constrained to the tanh type by scale coherence plus the projective boundary quotient; bare smooth boundary regularity gives the wider Abel-collar class.

AI DISCLOSURE

This work was conducted as independent research without institutional funding. Public scientific-

computing infrastructure was used throughout the CRM program.

Tool use. AI-based tools provided non-authorial process support for literature organization, drafting and code assistance, language editing, consistency checks, and L^AT_EX/PDF quality assurance. Source selection, mathematical arguments, physical hypotheses, axiomatic choices, scientific interpretation, and final decisions were reviewed and retained by the author. The tools are not authors or co-authors, are not acknowledged as contributors, and did not serve as sources of truth or independent validation. The author takes full responsibility for the content.

Funding information. This research received no external funding.

Data availability. This paper is purely theoretical. The public CRM repository with analysis scripts, data products, and paper source files is available at <https://github.com/research-line/crm-cosmology>; the CRM I–IV Zenodo concept DOI is [10.5281/zenodo.18728935](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728935).

-
- [1] L. Geiger (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Companion paper (Paper I). <https://github.com/research-line/crm-cosmology/tree/main/papers>. doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [2] L. Geiger (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper (Paper II). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [3] L. Geiger (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [4] L. Geiger (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [5] J. F. Donoghue (1994). General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections. *Physical Review D*, 50(6), 3874. DOI: 10.1103/PhysRevD.50.3874. arXiv:gr-qc/9405057.
 - [6] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
 - [7] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.040. arXiv:1707.01107.
 - [8] S. Weinberg (1979). Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation. In S. W. Hawking & W. Israel (Eds.), *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pp. 790–831. Cambridge University Press.
 - [9] M. Reuter (1998). Nonperturbative evolution equation for quantum gravity. *Physical Review D*, 57(2), 971. DOI: 10.1103/PhysRevD.57.971. arXiv:hep-th/9605030.
 - [10] R. Percacci (2017). *An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety*. World Scientific.
 - [11] J. Polchinski (1998). *String Theory*, Vols. 1–2. Cambridge University Press.
 - [12] C. Rovelli (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
 - [13] T. Thiemann (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.
 - [14] J. Maldacena (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231–252. [Reprinted in *Int. J. Theor. Phys.* **38**, 1113–1133 (1999).] DOI: 10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1. arXiv:hep-th/9711200.
 - [15] R. D. Sorkin (2005). Causal sets: Discrete gravity. In *Lectures on Quantum Gravity*, pp. 305–327. Springer. DOI: 10.1007/0-387-24992-3_7. arXiv:gr-qc/0309009.
 - [16] S. Surya (2019). The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22, 5. DOI: 10.1007/s41114-019-0023-1.
 - [17] A. Connes (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.

- [18] J. D. Bekenstein (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287–298. DOI: 10.1103/PhysRevD.23.287.
- [19] A. Almheiri, X. Dong, & D. Harlow (2015). Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015, 163. DOI: 10.1007/JHEP04(2015)163.
- [20] J. Aczél (1966). *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York.
- [21] M. Hazewinkel (1978). *Formal Groups and Applications*. Academic Press.
- [22] A. Ashtekar, T. Pawłowski, & P. Singh (2006). Quantum nature of the Big Bang. *Physical Review Letters*, 96(14), 141301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.141301. arXiv:gr-qc/0602086.
- [23] M. Bojowald (2008). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11, 4. DOI: 10.12942/lrr-2008-4.
- [24] A. Bonanno & M. Reuter (2002). Cosmology of the Planck era from a renormalization group for quantum gravity. *Physical Review D*, 65(4), 043508. DOI: 10.1103/PhysRevD.65.043508. arXiv:hep-th/0106133.
- [25] S. Ryu & T. Takayanagi (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de Sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18), 181602. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602. arXiv:hep-th/0603001.
- [26] J. de Boer, E. P. Verlinde, & H. L. Verlinde (2000). On the holographic renormalization group. *Journal of High Energy Physics*, 2000(08), 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2000/08/003. arXiv:hep-th/9912012.
- [27] K. A. Meissner (2004). Black-hole entropy in Loop Quantum Gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 21(22), 5245. DOI: 10.1088/0264-9381/21/22/015. arXiv:gr-qc/0407052.
- [28] C. Rovelli & F. Vidotto (2014). Planck stars. *International Journal of Modern Physics D*, 23(12), 1442026. DOI: 10.1142/S0218271814420267. arXiv:1401.6562.
- [29] S. Navas et al. (Particle Data Group) (2024). Review of Particle Physics. *Physical Review D*, 110, 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
- [30] G. Obied, H. Ooguri, L. Spodyneiko, & C. Vafa (2018). De Sitter Space and the Swampland. arXiv:1806.08362.
- [31] G. Gubitosi, F. Piazza, & F. Vernizzi (2013). The Effective Field Theory of Dark Energy. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(02), 032. DOI: 10.1088/1475-7516/2013/02/032. arXiv:1210.0201.
- [32] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, & R. Loll (2005). The spectral dimension of the universe is scale dependent. *Physical Review Letters*, 95(17), 171301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.171301. arXiv:hep-th/0505113.
- [33] R. Loll (2020). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002. DOI: 10.1088/1361-6382/ab57c7. arXiv:1905.08669.
- [34] S. A. Hartnoll & M. Yang (2025). The conformal primon gas at the end of time. *Journal of High Energy Physics*, 2025(07), 281. DOI: 10.1007/JHEP07(2025)281. arXiv:2502.02661.
- [35] B. L. Julia (1990). Statistical theory of numbers. In J. M. Luck, P. Moussa, & M. Waldschmidt (Eds.), *Number Theory and Physics*, Springer Proceedings in Physics, Vol. 47, pp. 276–293. Springer-Verlag, Berlin.

Das Sättigungstheorem: Axiomatische Zwangsbedingungen für Quantengravitation aus kosmologischer Relaxation

Lukas Geiger^{1,*}

¹*Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland[†]*

(Stand: 12. Juli 2026)

Wir formulieren vier minimale Axiome – endliche geometrische Kapazität, kooperative Verstärkung mit antisymmetrischer Erweiterung, monotone kosmische Kontrolle und Renormierungsgruppen-Komposition – als makroskopische Kandidatenbedingungen für jede Quantentheorie der Gravitation, deren kosmologischer Limes die allgemeine Relativitätstheorie mit einem beschränkten Relaxationsmechanismus reproduziert. Diese Axiome liefern eine Abel-Koordinatenbeschreibung eindimensionaler Sättigungsdynamik, sobald die reversible eindimensionale Antwortkanal-Hypothese $D^\pm$ hinzugenommen wird. Ein Tangens-hyperbolicus-Profil folgt, sobald der Sättigungsrand zusätzlich durch die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme D' festgelegt wird: der Quotient $R(x) = (1+x)/(1-x)$ muss sich unter Komposition multiplizieren. Ohne diese Annahme lässt glatte Randregularität allein eine Familie glatter hyperbolischer Randkrägen zu, etwa Abel-Koordinaten der Form $\operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$. Das korrigierte *Sättigungstheorem* ist daher ein projektives Randkragen-Normalformtheorem: $S(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$ wird durch Skalenkohärenz plus projektiven Randquotienten ausgewählt, nicht durch bloße Glattheit allein. Große Quantengravitationsprogramme – Schleifen-Quantengravitation, Asymptotic Safety, String-/holographische Ansätze, Kausalmengentheorie und nichtkommutative Geometrie – liefern Motivation für A–D, wenn sie auf kosmologische Observablen eingeschränkt werden; D' bleibt dagegen eine separate diagnostische Annahme, die physikalisch erst herzuleiten ist. Unter diesen Hypothesen kann die $\tanh$ -Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ des Curvature Relaxation Model als projektive Normalform kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation gelesen werden, wobei offen bleibt, welche UV-Vervollständigung k , Φ_0 und den projektiven Quotienten physikalisch festlegt.

* ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] Details zum Werkzeugeinsatz stehen in der KI-Offenlegung am Ende des Papers. Alle wissenschaftlichen Inhalte verantwortet ausschließlich der Autor. Paper V der CRM-Serie. Begleitarbeiten: [1–4].

I. EINLEITUNG

A. Das Problem

Die Vereinigung der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie bleibt das zentrale offene Problem der theoretischen Physik. Nach Jahrzehnten intensiver Forschung haben mehrere bedeutende Forschungsprogramme tiefe strukturelle Einsichten geliefert, ohne bislang auf eine einzige Theorie zu konvergieren:

- **Effective field theory (EFT) der Gravitation** berechnet zuverlässige Quantenkorrekturen bei niedrigen Energien, bietet aber keine UV-Vervollständigung [5].
- **Asymptotic Safety** sucht einen UV-Fixpunkt des Renormierungsgruppenflusses (RG) der Gravitation, wodurch die Theorie ohne neue Freiheitsgrade eingeschränkt wird [8–10].
- **Stringtheorie** bietet einen UV-endlichen Rahmen, der Gravitation automatisch enthält, sieht sich aber dem Landscape/Selection-Problem gegenüber [11].
- **Loop Quantum Gravity (LQG)** erreicht Hintergrundunabhängigkeit mit diskreten Geometrieoperatoren, hat aber Schwierigkeiten mit der Dynamik und dem klassischen Limes [12, 13].
- **Holographie/AdS-CFT** bietet eine nichtperturbative Definition der Quantengravitation im antide Sitter-Raum, mit unklarer Erweiterung auf realistische Kosmologie [14].
- **Causal Sets** postulieren diskrete Kausalstruktur als fundamental, mit dem Kontinuum als emergent [15, 16].
- **Noncommutative geometry** formuliert Geometrie als Spektraldaten neu und verbindet natürlich Operatoren und Raumzeit [17].

Orthogonal zu diesen UV-Vervollständigungsprogrammen beschränken die *Swampland-Vermutungen* [30] die Frage, welche niederenergetischen Theorien konsistent in die Quantengravitation eingebettet werden können, während die *EFT der Dark Energy* [31] Abweichungen von Λ CDM auf perturbativer Ebene parametrisiert. Kein Framework bestimmt jedoch die *funktionale Form* des kosmologischen Sättigungsprofils.

Eine bemerkenswerte Beobachtung ist, dass wenn eines der oben aufgelisteten UV-Vervollständigungsprogramme auf die Kosmologie angewendet wird, die resultierende effektive Dynamik häufig *Sättigungsverhalten* aufweist: einen begrenzten, kooperativen Ansatz zu einer maximalen geometrischen Konfiguration. Dieses Papier fragt, welche zusätzlichen Bedingungen diese wiederkehrende Struktur

auf eine Abel-Koordinate und schließlich auf einen tanh-Repräsentanten einengen.

B. Das CRM als empirischer Anker

Das Curvature Relaxation Model (CRM) [1–4] bietet einen konkreten, empirisch getesteten kosmologischen Rahmen, in dem Sättigungsdynamik eine zentrale Rolle spielt. Das Modell ersetzt die kosmologische Konstante Λ und partikuläre Dunkle Materie durch geometrische Krümmungsrückkehr und erreicht $\Delta\chi^2 = -5,5$ gegenüber Λ CDM auf gemeinsamen SN+CMB+BAO-Daten mit 6 Parametern und null Early Dark Energy [2]. Das gesamte Framework leitet sich aus einer einzelnen dynamischen Gleichung ab, hier in der additiven Normalform-Koordinate u geschrieben:

$$\frac{dX}{du} = \alpha(1 - X^2), \quad (1)$$

wobei $X = \Omega_\Phi/\Phi_0$ das normalisierte Krümmungsrückkehrpotential ist. Das phänomenologische CRM verwendet den Skalenfaktor a als Parameter, mit Lösung $X(a) = \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$, die Spätzeit-Beschleunigung (“Dunkle Energie”) in ihrer gesättigten Phase und gravitativen Gerüst (“Dunkle Materie”) in ihrer ungesättigten Phase bietet [2]. *Koordinaten-Caveat (in dieser Revision ergänzt)*: Wird ein allgemeiner Parameter a statt der additiven Normalform-Koordinate u verwendet, so gilt $dX/da = \alpha u'(a)(1 - X^2)$; die CRM-Gleichung mit konstantem Koeffizienten in a erfordert daher die *zusätzliche* affine-Kanal-Annahme $u(a) = \lambda(a - a_{\text{trans}})$. Das Theorem dieses Papers etabliert die projektive Normalform in u ; es etabliert nicht diese affine Identifikation für irgendeine bestimmte UV-Vervollständigung (siehe Abschnitt VIII).

Paper III [3] schlug diese ODE historisch über eine direkt spurgekoppelte effektive Lagrangedichte vor. Das Wahrheitsaudit vom Juli 2026 bewertete diese Route als unzureichende physikalische Herleitung und behielt sie nur als dokumentiertes Fehlaudit bei. Die aktive Route-3-Rekonstruktion trennt stattdessen einen shift-symmetrischen Staubkandidaten, einen Vektor-Skalar-MOND-Sektor und den Sättigungsskalar; sie hat weder die Sättigungs-ODE noch D' aus einer gemeinsamen Lagrangedichte hergeleitet. Das nachfolgende Theorem ist daher logisch unabhängig vom historischen Herleitungsclaim.

Das vorliegende Papier ordnet diese Beobachtung als *strukturelle Analogie mit konditionalem Normalformgehalt* ein: die vier physikalisch motivierten Axiome liefern zusammen mit B' und $D^\pm$ ein Abel-Koordinatengesetz der Sättigung, und die zusätzliche projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme D' wählt den tanh-Repräsentanten aus.

C. Umfang und Struktur

Das zentrale Ergebnis ist das *Saturation Theorem* (Theorem 1): Die Axiome A–D reduzieren zusammen mit der signierten Antisymmetrie B' und der separaten Hypothese $D^\pm$ des eindimensionalen reversiblen Kanals die effektive kosmologische Antwort auf eine Abel-Koordinate, während die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme D' die tanh-Normalform bis auf Umparametrisierung eindeutig auswählt. Das Papier ist wie folgt strukturiert:

- Section II: Formulierung der vier Axiome.
- Section III: Aussage und Beweis des Saturation Theorem.
- Section IV: Nichtprojektive Kompositionsgesetze statt Profilnamen.
- Section V: Kompatibilitätskarte mit Quantengravitations-Motiven.
- Section VI: Ontologische Implikationen: Raumzeit als geordnete Phase.
- Section VII: Beobachtungsfolgerungen und offene Fragen.
- Section VIII: Diskussion und Ausblick.

II. DIE VIER AXIOME

Wir formulieren die Axiome in Begriffen einer effektiven Antwortfunktion S_T . Um die Rollen sauber zu trennen, bezeichnet $r \geq 0$ eine physikalische UV-zu-IR-Kontrollgröße oder ein Skalenverhältnis, u die additive signierte Normalform-Koordinate, die nach Übergang zu einem eindimensionalen Kompositionskanal verwendet wird, und $x = S/S_{\max}$ die normalisierte Antwort. Das Symbol g wird im Folgenden als generische Kanalvariable beibehalten, wenn keine Unterscheidung zwischen r und u nötig ist. Die Funktion S_T kodiert, wie die geometrische Ausgabe der Theorie (Krümmung, Expansionsrate, geometrische Ordnung) auf den Kontrollparameter reagiert.

A. Axiom A: Endliche geometrische Kapazität

Axiom 1 (Endliche geometrische Kapazität). *Pro Hubble-Patch existiert eine endliche maximale geometrische Ordnung $C_{\max} < \infty$. Äquivalent ist die effektive Antwortfunktion $S_T(r)$ auf dem gewählten positiven physikalischen Antwortkanal global beschränkt:*

$$0 \leq S_T(r) < S_{\max} < \infty \quad \forall r \geq 0. \quad (2)$$

Physikalischer Inhalt. Dieses Axiom fordert endliche Kapazität für den gewählten skalaren Antwortkanal. Es ist keine Behauptung, dass jede mikroskopische Observable oder jede UV-Amplitude in der zugrunde liegenden Theorie endlich ist. Es ist bewusst schwach: es ist verträglich mit LQG (endliche Flächenquanta [12]), Holographie (Bekenstein-Schranke [18]), quantenmechanisch fehlerkorrigierender Raumzeit (endliche Code-Kapazität [19]), Causal-Set-Theorie (endliche Dichte [15]) und Asymptotic Safety (endliche effektive Wirkung am UV-Fixpunkt [9]), wenn diese Programme auf den gewählten kosmologischen Antwortkanal eingeschränkt werden.

Ohne endliche Kapazität würde der Rahmen unbegrenzte geometrische Konfigurationen zulassen, die mit den singulären Verhaltensweisen assoziiert sind, die Quantengravitationsprogramme typischerweise zu zähmen versuchen.

Verbindung zum CRM. Die Sättigungsamplitude Φ_0 im CRM [1] ist die physikalische Realisierung von $S_{\max}$. Das Pöschl-Teller-Potential $V(\phi) = V_0 / \cosh^2(\phi/\phi_0)$ erzwingt dynamisch $\Omega_\Phi \leq \Phi_0$ [3].

B. Axiom B: Kooperative Verstärkung

Axiom 2 (Kooperative Verstärkung). *Existierende geometrische Ordnung erleichtert weitere Ordnung. Die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ ist glatt (C^∞) für $g \geq 0$ mit einer lokalen Expansion bei $g = 0$:*

$$S_T(g) = c_1 g + c_3 g^3 + \mathcal{O}(g^5), \quad c_1 > 0. \quad (3)$$

Die ungerade-Potenz-Struktur spiegelt den katalytischen Charakter der Antwort: die Rate der geometrischen Ordnung ist proportional sowohl zur bestehenden geordneten Fraktion als auch zur verbleibenden Kapazität.

Physikalischer Inhalt. Dieses Axiom kodiert den kooperativen, selbstverstärkenden Charakter der geometrischen Ordnung. Es ist das gravitative Analogon der ferromagnetischen Ordnung, bei der ausgerichtete Spins weitere Ausrichtung erleichtern. Formal stellt die Bedingung $c_1 > 0$ sicher, dass die Antwort für kleine Perturbationen positiv (Ordnung, nicht Desordnung) ist, während die ungerade-Potenz-Struktur mit der antisymmetrischen Erweiterung konsistent ist (Axiom B').

Ohne kooperative Verstärkung gäbe es keine klassische Raumzeit: eine lineare oder antikooperative Antwort kann nicht die langlebigen, großräumigen geometrischen Strukturen des Universums erzeugen. Der kooperative Charakter ist analog zum spontanen Symmetriebruch in der Festkörperphysik: lokale Ordnung sät weitere Ordnung, treibt das System zu einem global geordneten Zustand (Sättigung).

Verbindung zum CRM. Die Sättigungskopplung k in der CRM-ODE (1) ist c_1 . Das spieltheoretische Gleichgewicht aus Paper I [1] bietet die thermodynamische Motivation: der Konzentrationsgradient G des Nullraums treibt kooperative Ordnung, bis die Raumzeit-Blase sättigt.

Eine Begleitbedingung erweitert den Bereich von S_T auf negative Argumente, was die gruppentheoretische Klassifizierung von Schritt 2 im Beweis ermöglicht:

Axiom 3 (Antisymmetrische Erweiterung (B')). Die Antwortfunktion S_T lässt eine glatte antisymmetrische Erweiterung auf alle $g \in \mathbb{R}$ zu:

$$S_T(-g) = -S_T(g) \quad \forall g. \quad (4)$$

Physikalischer Inhalt. Die Antisymmetrie hat drei komplementäre Motivationen:

(i) *Vorzeichenkovarianz der Antwort.* Der Parameter g ist keine “Entfernung” (die per Definition nicht-negativ wäre), sondern eine *vorzeichenbehaftete Abweichung* von einem symmetrischen Referenzzustand. Im CRM parametrisiert g die Krümmungsperturbation relativ zum de Sitter-Hintergrund; positives g entspricht überdichten Perturbationen, die geometrische Ordnung verstärken, negatives g zu unterdichten Regionen, die sie reduzieren. Vorzeichenkovarianz ($S_T(-g) = -S_T(g)$) besagt dann, dass die Antwortfunktion über- und unterdichte Regionen symmetrisch in Magnitude behandelt – eine natürliche physikalische Anforderung ohne symmetriebrechenden Mechanismus in der Antwort selbst. Wir betonen, dass Axiom B' *nicht* eine Aussage über kosmologische Zeitumkehrsymmetrie ist (die durch die Expansion gebrochen ist); es ist eine Beschränkung der funktionalen Form der Antwort unter $g \rightarrow -g$.

(ii) *Präzedenzfälle in der Physik.* Vorzeichenkovarianz von Antwortfunktionen ist in symmetrischen Antwortkanälen vertraut: in der Elektrodynamik die Polarisierung $P(-E) = -P(E)$ für zentrosymmetrische Medien und im Magnetismus $M(-H) = -M(H)$ für die idealisierte paramagnetische/ferromagnetische Antwort. Die ungerade Erweiterung in Axiom B' ist eine Modellannahme in einer lokal signierten Antwortkoordinate; es wird nicht behauptet, dass generische Beta-Funktionen ungerade sind.

(iii) *Mathematische Rolle.* Zusammen mit der ungerade-Potenz-Struktur von Axiom B erweitert B' das Kompositionsgesetz von der Halbgerade $[0, S_{\max})$ zu einer vollständigen Gruppenoperation auf $(-S_{\max}, S_{\max})$, die für die Abel-Gleichungsklassifizierung wesentlich ist. Ohne B' steht nur eine Halbgruppen-Struktur zur Verfügung, und das Abel-Darstellungsargument von Schritt 2 gilt nicht in derselben Form. Wir beachten, dass dies eine explizite Annahme ist, keine abgeleitete Konsequenz; ihre Lockerung führt zu alternativen Kompositionsstrukturen (z.B. $C(x, y) = x + y - xy$ auf $[0, 1)$), weshalb sie als separates Axiom erscheint, statt in Axiom B subsumiert zu werden.

C. Axiom C: Monotone kosmische Kontrolle

Axiom 4 (Monotone kosmische Kontrolle). Die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ ist monoton wachsend mit Sätti-

gung im Unendlichen:

$$S'_T(g) \geq 0, \quad \lim_{g \rightarrow \infty} S_T(g) = S_{\max}. \quad (5)$$

Es gibt genau eine relevante Richtung (Kontrollparameter), die den Übergang von niedriger zu hoher geometrischer Ordnung regiert.

Physikalischer Inhalt. Dies schließt oszillierende, Multi-Fixpunkt- oder chaotische geometrische Dynamik aus. Es garantiert:

- Eine eindeutige Zeitrichtung (thermodynamischer Pfeil).
- Kein “Springen” zwischen geometrischen Phasen.
- Stabile Expansion zu einem de Sitter-Attraktor.

Im CRM ist der Kontrollparameter der Skalenfaktor a ; in RG-Sprache entspricht er der einzelnen relevanten Richtung, die vom UV-Fixpunkt zum IR fließt [10]. Axiom C wird verletzt durch zyklische Kosmologien und durch Modelle mit mehreren stabilen Vakua – beide denen ein eindeutiger thermodynamischer Pfeil fehlt. Wir beachten, dass Axiom C eine Einschränkung auf den *kosmologischen Sektor* mit einem einzelnen dominanten Übergang ist: es behandelt nicht die String-Landschaft (wo Tunneln zwischen metastabilen Vakua zu nicht-monotonen Trajektorien führt) oder stochastische Inflation (wo lokale Fluktuationen die Monotonie brechen). Diese Szenarios betreffen mehrere effektive Kontrollparameter oder stochastische Dynamik und liegen außerhalb des Bereichs des Einfeld-, deterministischen Axiom-Systems. Das Theorem sollte so gelesen werden: A–D liefern zusammen mit B' und der inneren Gruppenform $D^\pm$ eine Abel-/Randkragenklasse für einen einzelnen deterministischen Sättigungskanal; erst D' wählt den projektiven tanh-Repräsentanten aus.

Verbindung zum CRM. Die Monotonie von $\Omega_\Phi(a)$ ist eine direkte Konsequenz der ODE (1): da $1 - X^2 > 0$ für $|X| < 1$ ist, ist die Lösung streng wachsend.

Bemerkung 1 (Axiom-Interdependenz). Wie in Corollary 1 gezeigt, folgt Monotonie (Axiom C), sobald Axiom D in seiner inneren Gruppenform $D^\pm$ verwendet wird. Wir behalten dennoch Axiom C als explizite Aussage für physikalische Transparenz: es verbindet sich direkt mit dem thermodynamischen Zeitpfeil und macht den Ausschluss von oszillierender/chaotischer Kosmologie auf der Axiom-Ebene sichtbar. Der logische Gehalt des Axiom-Systems ist daher: A, B/B' und das verstärkte Kompositionsgesetz $D^\pm$ implizieren C; ohne diese innere Gruppenbedingung bleibt C ein explizites Axiom.

D. Axiom D: Renormalisierungsgruppenkomposition

Axiom 5 (Renormalisierungsgruppenkomposition). Es existiert eine Skalenkomposition $g \mapsto g_1 \oplus g_2$ (“zwei RG-Schritte in Abfolge”) derart, dass die Antwortfunktion

kompositionell kohärent ist:

$$S_T(g_1 \oplus g_2) = C(S_T(g_1), S_T(g_2)) , \quad (6)$$

wobei C eine glatte, kommutative, assoziative Komposition mit neutralem Element 0 und absorbierendem Rand $S_{\max}$ ist:

$$C(S, 0) = S, \quad C(S, S_{\max}) = S_{\max} . \quad (7)$$

Überdies erstreckt sich C glatt (d.h. C^∞) auf das abgeschlossene Quadrat $[0, S_{\max}]^2$.

Axiom 6 (Eindimensionaler reversibler Kanal ($D^\pm$)). Nach Normalisierung durch $S_{\max}$ und Erweiterung durch B' ist die induzierte Operation auf dem signierten Antwortintervall $C : (-1, 1)^2 \rightarrow (-1, 1)$ kürzbar und in jedem Argument strikt monoton, und jede Translation $y \mapsto C(x, y)$ ist ein glatter Diffeomorphismus mit Inverser $y \mapsto C(-x, y)$. Alle nachfolgenden Abel-Koordinaten-Schlüsse verwenden diese zusätzliche eindimensionale deterministische Kanal-Hypothese; sie ist keine Konsequenz des bloßen positiven Rand-Halbgruppengesetzes allein.

Notation für Kanalvariablen. Sei $r \geq 0$ die physikalische UV-zu-IR-Kontrollgröße oder das Skalenverhältnis, u die additive signierte Normalform-Koordinate mit $u(g_1 \oplus g_2) = u(g_1) + u(g_2)$ und $x = S/S_{\max}$ die normalisierte Antwort. Aussagen über konstante Koeffizienten sind Aussagen in u , nicht automatisch in einem extern gewählten physikalischen Parameter. Der positive physikalische Ast wird durch Einschränkung des signierten lokalen Kanals auf die physikalisch realisierte Seite zurückgewonnen.

Bemerkung 2 (Randkragen-Guardrail). Die Glattheitsklausel in Axiom D wird im Folgenden nicht als Eindeutigkeitsbehauptung für $\arctanh$ verwendet. Die Abel-Koordinate

$$\phi_\varepsilon(x) = \arctanh(x) + \varepsilon x$$

induziert eine glatte assoziative Komposition auf dem offenen Intervall und liefert über

$$q_\varepsilon(x) = e^{-2\phi_\varepsilon(x)} = \frac{1-x}{1+x} e^{-2\varepsilon x}$$

einen glatten positiven Randkragen. Bloße Glattheit der positiven Sättigungsfläche wählt daher eine hyperbolische Randkragenklasse, aber keine eindeutige projektive Koordinate. Randglattheit wird als Zulässigkeitsbedingung für den Antwortkanal verwendet. Sie wird in diesem Paper nicht aus einem UV-Modell hergeleitet. Die tanh-Normalform wird erst dann ein Theorem, wenn der projektive Randquotient explizit festgelegt wird.

Axiom 7 (Projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme (D')). Für die normalisierte Antwort $x = S/S_{\max} \in (-1, 1)$ ist der projektive Randquotient

$$R(x) := \frac{1+x}{1-x}$$

unter Komposition multiplikativ:

$$R(C(x, y)) = R(x)R(y). \quad (8)$$

Äquivalent ist das Verhältnis der Abstände zu den beiden Sättigungsflächen die additive Arbeits-/Rapiditätskoordinate des eindimensionalen Antwortkanals.

Physikalischer Status von D' . D' ist die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme. Sobald der Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ vor der Wahl einer Abel-Koordinate festgelegt ist, folgt das Geschwindigkeitsadditionsgesetz algebraisch. D' wird somit nicht durch die Hypothesen A–D hergeleitet; es ist der zusätzliche projektive Input, dessen physikalische Herleitung offen bleibt. Es ist eine projektive Response-Bilanzannahme: Die physikalisch komponierte Größe ist das Verhältnis von realisierter Ordnung zu verbleibender Kapazität, analog zu einer Log-Odds- oder Rapiditätskoordinate. Für jedes UV-Kandidatenprogramm ist der diagnostische Defekt

$$\Delta_{D'}(x, y) := \log R(C(x, y)) - \log R(x) - \log R(y),$$

der für den exakten projektiven tanh-Repräsentanten verschwinden muss. $\Delta_{D'} = 0$ aus einer mikroskopischen Theorie herzuleiten bleibt eine offene physikalische Aufgabe.

Physikalischer Gehalt von D. Axiom D ist das tiefste Kompositionsaxiom. Es besagt, dass die geometrische Antwort selbstkonsistent unter Vergrößerung sein muss: das Universum auf zwei aufeinanderfolgenden Skalen zu beobachten und die Ergebnisse zu kombinieren muss dieselbe Antwort ergeben wie die direkte Beobachtung auf der kombinierten Skala. Dies ist die definierende Eigenschaft einer Renormierungsgruppe.

Das Kompositionsgesetz (6) kodiert die Anforderung, dass die Theorie skala-kohärent im folgenden präzisen Sinne sein muss: die Antwortfunktion S_T ist ein Homomorphismus von der additiven Struktur des Kontrollparameters zur Kompositionsalgebra von Antworten; d.h. keine bevorzugte Skala existiert, auf der diese Homomorphismus-Eigenschaft abbricht oder ihren Charakter ändert. Die absorbierende Randbedingung $C(S, S_{\max}) = S_{\max}$ spiegelt die Tatsache, dass vollständig gesättigte Geometrie nicht weiter geordnet werden kann – sie ist ein Fixpunkt.

Die C^∞ -Erweiterungsanforderung hat eine direkte physikalische Interpretation: sie verlangt, dass das Kompositionsgesetz auch nahe der Sättigung wohlverhalten bleibt. In physikalischen Begriffen bedeutet dies, dass der Ansatz zur geometrischen Kapazitätsgrenze glatt ist und keine neuen Divergenzen oder kritischen Exponenten einführt. Drei physikalische Argumente stützen diese Anforderung:

(a) *Keine neue Phasenübergang bei Sättigung.* Eine Komposition, die singuläre Ableitungen am Rand entwickelt, würde einen Phasenübergang innerhalb des Sättigungsprozesses selbst signalisieren – d.h. der

Sättigungsmechanismus würde gerade dort zusammenbrechen, wo er am meisten benötigt wird. Die Glattheitsbedingung schließt solch pathologisches Verhalten aus. Dies unterscheidet sich von Phasenübergängen beim *Beginn* der Sättigung (die erlaubt sind und der Übergangsepoche a_{trans} des CRM entsprechen); die Randregularität betrifft das *vollständig gesättigte* Regime.

(b) *Unterscheidung von kritischen Phänomenen.* Während kritische Exponenten und divergente Suszeptibilitäten Phasenübergänge bei endlicher Temperatur charakterisieren (der Curie-Punkt in Ferromagneten, T_c in Supraflüida), ist die Sättigungsgrenze $S \rightarrow S_{\text{max}}$ ein *asymptotisches* Regime ($g \rightarrow \infty$), kein kritischer Punkt. In der ferromagnetischen Analogie entspricht dies $T \rightarrow 0$ (vollständige Ausrichtung), nicht $T \rightarrow T_c$ (kritische Fluktuationen). Der Null-Temperatur-Limes der Magnetisierung ist glatt ($M \rightarrow M_s$ exponentiell in Mean-Field-Theorie und als Potenzgesetz bei niedrigem T , aber ohne divergente Ableitungen der *Komposition* von Magnetisierungen). Die C^∞ -Anforderung ist daher physikalisch angemessen für die Sättigungsgrenze.

(c) *Analytizität des Vakuumzustands.* In der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum ein analytischer Zustand: alle Korrelationsfunktionen im Vakuum sind glatt. Da vollständige Sättigung ($S = S_{\text{max}}$) den geometrischen Analogen des Vakuums darstellt (der maximal geordnete Zustand), sollte die Komposition von Antworten nahe diesem Zustand die Glattheit des Vakuums erben.

Verbindung zum CRM. Im CRM entsteht das Kompositionsgesetz aus der thermodynamischen Struktur: das Krümmungsrückkehrpotential Ω_Φ bei Skala $a_1 \cdot a_2$ wird durch die Potentiale bei a_1 und a_2 durch die Gruppeneigenschaft der Sättigungs-ODE bestimmt. Die tanh-Funktion erfüllt $\tanh(u_1 + u_2) = (\tanh u_1 + \tanh u_2)/(1 + \tanh u_1 \tanh u_2)$, was genau ein Kompositionsgesetz der geforderten Form mit $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy/S_{\text{max}}^2)$ ist.

III. DAS SATURATION THEOREM

A. Aussage

Theorem 1 (Saturation Theorem, projektive Randkragenform). *Sei T eine Theorie, deren effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ die Axiome A–D, die Antisymmetrie-Bedingung B' und die separate Hypothese $D^\pm$ des eindimensionalen reversiblen Kanals von Axiom 6 erfüllt. Dann besitzt die normalisierte Antwort $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\text{max}}$ eine ungerade Abel-Koordinate $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit*

$$\phi(\mathcal{C}(x, y)) = \phi(x) + \phi(y).$$

Wenn zusätzlich die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme D' gilt, dann existieren Konstanten $\alpha > 0$, $S_{\text{max}} > 0$ und eine strikt monotone Upparametrisierung $u = u(g)$ mit $u(0) = 0$, so dass

$$S_T(g) = S_{\text{max}} \tanh(\alpha u(g)). \quad (9)$$

Das Kompositionsgesetz ist dann als relativistische Geschwindigkeitsaddition $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ bestimmt, bis auf Reskalierung durch S_{max} . Ohne D' bestimmen diese Voraussetzungen die Abel-/Randkragenstruktur, schließen aber nicht alle glatten nichtprojektiven Randkrägen aus.

Tabelle I trennt die logischen Schichten des korrigierten Resultats. Dadurch wird verhindert, dass die Kompatibilitätsdiskussion in Abschnitt V und die empirischen Bemerkungen in Abschnitt VII als Beweis des projektiven Quotienten gelesen werden.

B. Zentrale Lemmata

Die Eindeutigkeit von arctanh beruht auf einem projektiven Quotienten, nicht auf Glattheit allein.

Lemma 1 (Projektiver Quotient wählt arctanh). *Sei C ein stetiges, strikt monotonen, kommutatives und assoziatives Gruppengesetz auf $(-1, 1)$ mit Neutralelement 0. Angenommen, C besitzt eine Abel-Koordinate ϕ ,*

$$\phi(\mathcal{C}(x, y)) = \phi(x) + \phi(y),$$

und erfüllt das projektive Quotientengesetz (8). Dann existiert $c > 0$ derart, dass

$$\phi(x) = c \text{arctanh}(x), \quad C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

Proof. Setze $L(x) := \frac{1}{2} \log((1+x)/(1-x)) = \text{arctanh}(x)$. Nach D' gilt

$$L(\mathcal{C}(x, y)) = L(x) + L(y).$$

Damit ist $F(t) := \phi(\tanh t)$ eine stetige additive Funktion von $t = L(x)$, also $F(t) = ct$ für ein $c > 0$. Folglich gilt $\phi(x) = cL(x) = c \text{arctanh}(x)$, und Auflösen von $L(C) = L(x) + L(y)$ ergibt $C(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$. $\square$

Bemerkung 3 (Warum D' nötig ist). *Die Familie $\phi_\varepsilon(x) = \text{arctanh}(x) + \varepsilon x$ ist für kleines ε ungerade, glatt und strikt wachsend, divergiert am Rand und induziert über $q_\varepsilon = e^{-2\phi_\varepsilon}$ einen glatten positiven Sättigungskragen. Die alte Behauptung, C^∞ -Randregularität allein schließe alle nicht- arctanh -Abel-Koordinaten aus, war daher zu stark. Das korrigierte Theorem verwendet D' als mathematische und physikalische Normalisierung, die diese Rand-Gauge-Freiheit entfernt.*

C. Beweis des Saturation Theorems

Der Beweis verläuft in drei Schritten.

Schritt 1: Herleitung der Funktionalgleichung. Definiere die normalisierte Antwort $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\text{max}} \in [0, 1)$. Die Axiome A und C garantieren, dass σ beschränkt und monoton wachsend

TABLE I. Proof-Status-Ledger für das korrigierte Saturation Theorem.

Schicht	Input	Output	Status / Nicht-Behauptung
A–D, B', $D^\pm$	Beschränkte, kooperative, signierte eindimensionale innere Komposition	Ungerade Abel-Koordinate und hyperbolische Randkragenklasse	Theorem-Level, bedingt auf die Ein-Kanal-Hypothesen; noch kein eindeutiges tanh-Profil.
D'	Projektiver Randquotient $R(C) = R(x)R(y)$	Kanonischer tanh-Repräsentant und Geschwindigkeitsadditionsgesetz	Zusätzliche Normalisierung; diagnostisch geführt, hier nicht aus einem UV-Programm hergeleitet.
QG-Programmkarte	LQG, Asymptotic Safety, Holographie, Causal Sets, CDT und NCG	Kompatibilitätsmuster für A–D, $D^\pm$ und D'	Motivation und Filter; keine Verifikation, dass ein Programm alle Inputs erfüllt.
CRM-Datenanker	Bestehender CRM-Fit und monotone Übergangsevidenz	Empirische Motivation für Sättigungsdynamik	Kein unabhängiger Test dieses Theorems, weil das CRM bereits ein tanh-Profil nutzte.
Gestörte Erweiterungen	Mehrfeld-, stochastische, EFT- oder UV–IR-Matchingdefekte	Künftiger Residuum-/Gap-Test $r_X/g_X \ll 1$	Empfohlene Stabilitätserweiterung; nicht Teil des aktuellen Beweises.

ist. Axiom D [Gl. (6)] fordert die Existenz einer Komposition:

$$\sigma(g_1 \oplus g_2) = C(\sigma(g_1), \sigma(g_2)), \quad (10)$$

wobei $C : [0, 1) \times [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ kommutativ, assoziativ, mit Neutralelement 0 und absorbierendem Rand 1 ist.

Schritt 2: Reduktion auf Abels Gleichung. Nach Axiom B hat σ die lokale Entwicklung (3) mit $c_1 > 0$. Axiom B' [Gl. (4)] liefert die ungerade Erweiterung $\sigma(-g) = -\sigma(g)$. Zusammen mit der inneren Gruppenform $D^\pm$ von Axiom D ergibt dies eine glatte kürzbare Gruppenoperation auf $(-1, 1)$, deren absorbierende Ränder bei ± 1 nur als Grenzflächen behandelt werden.

Unter $D^\pm$ definieren die Assoziativitätsbedingung $C(C(x, y), z) = C(x, C(y, z))$ und Kommutativität ein *inparametrisiertes stetiges Gruppengesetz* auf $(-1, 1)$ (die Taylorentwicklung am Ursprung definiert ein eindimensionales kommutatives formales Gruppengesetz im Sinne von [21]; hier ist die Verbindung, dass jede glatte, assoziative, kommutative binäre Operation auf einer Umgebung von $0 \in \mathbb{R}$ mit Neutralelement 0 durch Taylorentwicklung ein formales Gruppengesetz über $\mathbb{R}$ ist, und umgekehrt wendet sich Aczél's analytischer Satz auf die konvergente Realisierung dieser formalen Struktur auf dem Intervall $(-1, 1)$ an). Wir wenden Aczél's Darstellungssatz [20] auf das *offene Intervall* $(-1, 1)$ an, wobei C glatt und strikt monoton in jedem Argument ist und das Neutralelement 0 im Inneren liegt. Die absorbierenden Randbedingungen $C(x, \pm 1) = \pm 1$ sind *nicht* Teil des Definitionsbereichs, auf den Aczél's Satz angewendet wird; sie werden als Grenzverhalten behandelt. Konkret ergibt Aczél's Satz eine stetige, strikt monotone Funktion $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\phi(0) = 0$. Die absorbierenden Randbedingungen implizieren dann $\phi(x) \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow 1^-$ und $\phi(x) \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow -1^+$ (da $C(x, y) \rightarrow 1$ für $y \rightarrow 1$ impliziert, dass $\phi(x) + \phi(y) \rightarrow \infty$, was $\phi(y) \rightarrow \infty$ erfordert):

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y). \quad (11)$$

Dies ist Abels Funktionalgleichung. (*Beweisschritt in dieser Revision korrigiert; eine frühere Version schrieb $\phi'(0) = c_1$ aus Axiom B, was ein Kategorienfehler war: c_1 ist die Ableitung des Antwortprofils σ am Ursprung des Kontrollparameters, nicht der Abel-Koordinate ϕ am Antwortursprung.*) Die saubere Konstruktion verläuft über das invariante Vektorfeld: Sei $a(x) = \partial_2 C(x, 0)$; unter $D^\pm$ sind Translationen orientierungserhaltende Diffeomorphismen, also $a(x) > 0$ auf $(-1, 1)$, und man kann $\phi(x) = \int_0^x dt/a(t)$ definieren. Die Invarianz von a unter dem Gruppengesetz liefert dann $\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y)$, und ϕ erbt die C^∞ -Regularität von C auf $(-1, 1)$ direkt aus dieser Integraldarstellung. Die Funktion ϕ ist bis auf eine positive multiplikative Konstante bestimmt, und die Antisymmetrie (Axiom B') erlaubt, sie ungerade zu wählen; Axiom B liefert $\sigma'(0) = c_1 > 0$, was nur über das Produkt $(\phi \circ \sigma)'(0) = \phi'(0) c_1$ eingeht und die positive Gesamtskala α fixiert. An diesem Punkt liefern die Axiome A–D ein Abel-/Randkragen-Theorem, aber noch nicht $\phi = \operatorname{arctanh}$.

Schritt 2b: Projektiver Doppelrand-Quotient. Wenn zusätzlich die Annahme D' gilt, liefert Lemma 1 $\phi = c \operatorname{arctanh}$. D' ist die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme, keine Konsequenz von A–D: Sobald $R = (1+x)/(1-x)$ vor der Wahl einer Abel-Koordinate festgelegt ist, folgt das Geschwindigkeitsadditionsgesetz algebraisch. Dies ergibt das Kompositionsgesetz:

$$C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad (12)$$

was die relativistische Geschwindigkeitsadditionsformel ist. Die Eindeutigkeit ist daher projektiv: sie ist Eindeutigkeit nach Fixierung des Randquotienten $R = (1+x)/(1-x)$, nicht Eindeutigkeit aus bloßer Glattheit aller Abel-Krägen.

Schritt 3: Invertierung zu tanh. Da $\phi(\sigma(g)) = c \operatorname{arctanh}(\sigma(g))$ eine additive Funktion des Kontrollparameters sein muss (d.h., $\phi(\sigma(g)) = \alpha u(g)$ für eine Umparametrisierung u und eine Konstante $\alpha > 0$), er-

halten wir:

$$\sigma(g) = \tanh(\alpha u(g)), \quad (13)$$

und daher $S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$, nachdem die positive Konstante c in αu absorbiert wurde. Wenn die Axiome A–D, B', $D^\pm$ und D' exakt gelten, ist das Resultat exakt. Approximative Axiom-Erfüllung (z.B. Zusammenbruch des Kompositionsgesetzes bei sehr kleinem g , wo Standardgravitation dominiert) würde Korrekturen einführen; eine formale Stabilitätsanalyse solcher Störungen ist ein offenes Problem. $\square$

Korollar 1 (Monotonie aus dem inneren Gruppengesetz). *Unter der inneren Gruppenform $D^\pm$ von Axiom D folgt Axiom C (monotone kosmische Kontrolle) aus den Axiomen A, B, B' und D. Das heißt, jede Antwortfunktion, die $A + B + B' + D^\pm$ erfüllt, ist auf dem eindimensionalen Kanal automatisch strikt monoton wachsend.*

Beweis. Wähle die additive Koordinate der eindimensionalen Kontrollkomposition, so dass die Kanalkomposition nahe der Identität als $g + h$ geschrieben wird. Differenziere $\sigma(g + h) = C(\sigma(g), \sigma(h))$ bezüglich h an der Stelle $h = 0$:

$$\sigma'(g) = \partial_2 C(\sigma(g), 0) \cdot \sigma'(0).$$

Definiere $a(x) := \partial_2 C(x, 0)$. Nach $D^\pm$ ist für jedes feste $x \in (-1, 1)$ die Abbildung $y \mapsto C(x, y)$ ein C^∞ Diffeomorphismus von $(-1, 1)$ (sein Inverses ist $y \mapsto C(-x, y)$ aus dem Gruppen-Inversen). Daher gilt $\partial_2 C(x, 0) = a(x) \neq 0$ für alle $x \in (-1, 1)$. Da $(-1, 1)$ zusammenhängend ist und $a(0) = \partial_2 C(0, 0) = 1 > 0$ (aus $C(0, y) = y$), impliziert Stetigkeit $a(x) > 0$ für alle x . Mit $\sigma'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B) erhalten wir $\sigma'(g) = a(\sigma(g)) \cdot c_1 > 0$ für alle g . $\square$

Bemerkung 4. *Dies bedeutet, dass das Axiom-System auf A, B/B' und $D^\pm$ plus die abgeleitete Konsequenz C reduziert werden kann, sobald das eindimensionale innere Gruppengesetz physikalisch gerechtfertigt ist. Wir behalten Axiom C als separate Aussage für physikalische Transparenz: sie macht die Monotonie-Annahme explizit und verbindet sich direkt mit dem thermodynamischen Pfeil der Zeit. Ohne $D^\pm$ ist sie als unabhängige Ein-Kanal-Annahme zu lesen.*

Proposition 1 (Nicht-Redundanz der Axiome). *Die folgenden Beispiele sind Trennungsskizzen, kein vollständiges Unabhängigkeitstheorem; vollständige paarweise Unabhängigkeit des Axiomensatzes wird nicht behauptet. (Zwei Beispiele in dieser Revision nach externem Review korrigiert.) Da Axiom D im beschränkten Antwortraum formuliert ist, ist Punkt (1) als algebraisches Beispiel für die innere Komposition nach Entfernen der Kapazitätsschranke zu lesen, nicht als vollständiges Modell des endlich-kapazitiven Axiomensystems.*

(1) *Verletzt A, erfüllt B/B' und den algebraischen inneren Kompositionsteil von D: $\sigma(g) = g$ (unbegrenzte lineare Antwort; $C(x, y) = x + y$, assoziativ und kommutativ).*

(2) *Verletzt die lokale Ungeradheit von B/B', erfüllt A, C, D: $\sigma(g) = 1 - e^{-g}$ für $g \geq 0$, mit $C(x, y) = x + y - xy$ (probabilistisches Oder). Korrektur: Eine frühere Version führte dies als "verletzt B', erfüllt B" auf; tatsächlich enthält die Taylorentwicklung $1 - e^{-g} = g - g^2/2 + g^3/6 - \dots$ einen quadratischen Term, sodass das Beispiel die von Axiom B selbst geforderte ungerade lokale Entwicklung verletzt, nicht nur die signierte Erweiterung B'. Es trennt $\{B, B'\}$ von $\{A, C, D\}$, trennt aber nicht B von B'.*

(3) *Verletzt C (und A auf dem positiven Ast), erfüllt B/B' lokal, aber nicht $D^\pm$: $\sigma(g) = \tanh(g) \cdot \cos(\epsilon g)$ für kleine $\epsilon > 0$. Korrektur: Eine frühere Version behauptete, dieses Beispiel "erfüllt A"; tatsächlich wechselt für $g \gg 1$ der Faktor $\cos(\epsilon g)$ das Vorzeichen, sodass das Beispiel auf dem positiven Ast auch die Nichtnegativität von Axiom A verletzt und keinen Sättigungsgrenzwert im Sinne von Axiom C besitzt. Es trennt daher $\{C\}$ (und monotone Sättigung allgemein) von lokalem $\{B, B'\}$, ist aber kein Zeuge dafür, dass C unabhängig von A ist. Ein sauberer Kandidatenzeuge für C-Unabhängigkeit – ein glattes, ungerades, beschränktes Profil der Form $\sigma(g) = \tanh(g) + \epsilon \psi(g)$ mit ψ einer kompakt getragenen ungeraden Bump-Funktion, gewählt so, dass $0 \leq \sigma < 1$ auf $g \geq 0$, aber $\sigma' < 0$ auf einem Intervall – sollte vor der Behauptung in einem Trennungs-Ledger verifiziert werden. Nach Korollar 1 ist C in jedem Fall nicht unabhängig von $\{A, B, B', D^\pm\}$ gemeinsam – es folgt unter dem inneren Gruppengesetz als abgeleitete Konsequenz. C bleibt für physikalische Klarheit und zur expliziten Markierung des Ein-Kanal-Pfeils erhalten.*

(4) *Verletzt D, erfüllt A–C, B': $\sigma(g) = (2/\pi) \arctan(g)$; beschränkt, monoton, antisymmetrisch, aber seine induzierte Komposition (über $\phi = \tan(\pi x/2)$) entwickelt divergente zweite Ableitungen ($\sim \epsilon^{-1}$) am Rand von $[-1, 1]^2$, was die C^∞ -Erweiterungs-Anforderung von Axiom D verletzt. Ähnlich hat $\sigma(g) = g/\sqrt{1+g^2}$ (mit $\phi(x) = x/\sqrt{1-x^2}$) divergente zweite Ableitungen am Rand ($\sim \epsilon^{-1/2}$).*

D. Interpretation

Der Satz sagt aus, dass $\tanh$ keine bloße Modellwahl ist, sondern der kanonische projektive Repräsentant eines eindimensionalen Abel-Sättigungskanals. Der mathematische Schlüsseleinsicht ist zweistufig: Axiom D erzwingt, dass die Antwortfunktion die Inverse einer Abel-Koordinate ist, und D' fixiert den sonst freien Randkragen dadurch, dass der projektive Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ multiplikativ ist.

Physikalisch sagt der Satz aus:

Jede Quantengravitationstheorie, die skalenkohärent, kooperativ, beschränkt, monoton ist und deren Sättigungsrand durch den projektiven Quotienten normalisiert wird, muss kosmologische Sättigungsdynamik vom $\tanh$ -Typ erzeugen. Ohne diese

Quotienten-Normalisierung liefert das Theorem eine Abel-/Randkragenklasse statt eines eindeutigen Profils.

Die Uparametrisierung $u(g)$ absorbiert die mikroskopischen Details der Theorie: verschiedene UV-Vervollständigungen entsprechen verschiedenen Funktionen $u(g)$. Die gemeinsame Form $\tanh(\alpha u)$ wird erst erzwungen, wenn das projektive Randverhältnis als physikalische Kompositionsvariable identifiziert wurde.

IV. NICHTPROJEKTIVE KOMPOSITIONSGESETZE

Korollar 2 (Nichtprojektive Kompositionsgesetze statt Profilnamen). *Die folgenden Ausschlüsse sind Ausschlüsse der induzierten Antwortkomposition und des Randquotienten unter der gewählten additiven Koordinate. Sie sind keine koordinatenfreien Ausschlüsse von Graphenformen unter beliebiger monotoner Reparametrisierung. Keines der folgenden induzierten Gesetze kann die strukturellen Voraussetzungen des Theorems plus die projektive Quotienten-Annahme D' gleichzeitig erfüllen, außer wenn es durch zulässige Reparametrisierung $u(g)$ auf die tanh-Form reduzierbar ist:*

- (i) **Logistisches Profil:** $S_{\max}/(1 + e^{-\beta u})$.
- (ii) **Rationales Profil:** $S_{\max} u/(1 + u)$.
- (iii) **Arkustangens-Profil:** $S_{\max} (2/\pi) \arctan(\beta u)$.
- (iv) **Harte Sättigung:** $S_{\max} \min(u, 1)$.

Beweis. Jedes Alternative verletzt ein spezifisches Axiom:

(i) *Logistisch.* Die logistische Funktion $L(u) = 1/(1 + e^{-\beta u})$ hat $L(0) = 1/2 \neq 0$, was die Bedingung des neutralen Elements verletzt. Die verschobene Logistik $\tilde{L}(u) = (L(u) - 1/2) \cdot 2$ ergibt $\tilde{L}(u) = \tanh(\beta u/2)$ – genau die tanh-Form. Daher ist jedes “logistische” Modell, das Axiom D erfüllt, in Wirklichkeit tanh in versteckter Form.

(ii) *Rational.* Die Funktion $R(u) = u/(1 + u)$ hat Abel-Transformation $\phi(x) = x/(1 - x)$, die $C(x, y) = \phi^{-1}(\phi(x) + \phi(y)) = (x + y - 2xy)/(1 - xy)$ ergibt. Für kleine x, y erhält man $C(x, y) \approx x + y - 2xy$. Der quadratische Mischterm $-2xy$ ist unverträglich mit der Antisymmetriebedingung (Axiom B’): Antisymmetrisches σ impliziert, dass die induzierte Komposition $C(-x, -y) = -C(x, y)$ erfüllen muss, aber $(x + y - 2xy)/(1 - xy)$ tut das nicht. Äquivalent: $R(u)$ selbst ist nicht antisymmetrisch, was Axiom B’ verletzt.

(iii) *Arkustangens.* Die Funktion $A(u) = (2/\pi) \arctan(\beta u)$ hat Abel-Transformation $\phi(x) = \tan(\pi x/2)$, die $C(x, y) = (2/\pi) \arctan(\tan(\pi x/2) + \tan(\pi y/2))$ ergibt. Während diese Komposition auf dem offenen Quadrat $(-1, 1)^2$ wohldefiniert und glatt

ist, kann sie nicht glatt auf das geschlossene Quadrat $[-1, 1]^2$ erweitert werden: die zweiten partiellen Ableitungen $\partial^2 C/\partial x^2$ und $\partial^2 C/\partial x \partial y$ divergieren beide, wenn $(x, y) \rightarrow (1, 1)$ (numerisch $\sim \epsilon^{-1}$ entlang $x = y = 1 - \epsilon$), was die C^∞ -Randregularitätsanforderung von Axiom D verletzt. Diese algebraische (ϵ^{-1}) Divergenz ist charakteristisch für Abel-Funktionen mit Potenzgesetz-Randverhalten. Logarithmische Krägen sind die zulässige Randklasse an dieser Fläche; D' wählt daraus den projektiven logarithmischen Kragen $\arctanh$ aus.

(iv) *Harte Sättigung.* $\min(u, 1)$ ist bei $u = 1$ nicht C^∞ , was die Glattheitsanforderung von Axiom B verletzt. $\square$

Bemerkung 5. *Der logistische Fall (i) ist instruktiv: er scheint eine echte Alternative zu sein, aber Kompositionsgesetz plus projektiver Quotient zwingen ihn, sich auf tanh zu reduzieren. Dies veranschaulicht die Kraft von Skalenkohärenz zusammen mit D' : oberflächliche Freiheit bei der Profilwahl wird auf eine Randkragenwahl reduziert, und der projektive Quotient fixiert den CRM-Rapiditätsrepräsentanten.*

V. KOMPATIBILITÄTSKARTE MIT QUANTENGRAVITATIONS-MOTIVEN

Wir kartieren nun, wie A–D natürlicherweise mit Motiven in den großen Quantengravitationsprogrammen kompatibel sind, wenn man sich auf kosmologische Observablen beschränkt. Die stärkere innere Form $D^\pm$ und die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme D' werden separat als offene Diagnostika geführt.

A. Loop Quantum Gravity / Loop Quantum Cosmology

In Loop Quantum Cosmology (LQC) [22, 23] lautet die modifizierte Friedmann-Gleichung:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \quad (14)$$

wobei $\rho_c \sim \rho_{\text{Pl}}$ eine kritische Dichte ist, die durch den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} gesetzt wird. Dies hat genau die Struktur einer Sättigungsgleichung: die Expansionsrate ist begrenzt ($H^2 \leq H_{\text{max}}^2$), und der Bounce bei $\rho = \rho_c$ ersetzt die klassische Singularität.

Axiom A: Die kritische Dichte ρ_c bietet endliche geometrische Kapazität. *Axiom B:* Für $\rho \ll \rho_c$ wird die Standard-Friedmann-Gleichung wiederhergestellt mit $c_1 > 0$. Die Holonomie-Korrekturen sind kooperativ: die Abweichung von GR wächst mit der Krümmung. *Axiom C:* Im expandierenden Bereich ($\dot{a} > 0$) ist die Lösung monoton. *Axiom D:* LQC besitzt kein manifestes RG-Kompositionsgesetz im Sinne von Axiom D; die effektiven Gleichungen erben Diffeomorphismus-Invarianz von der vollen LQG, was strukturelle Kohärenz über

Skalen hinweg bietet, aber eine rigorose Ableitung der assoziativen Kompositions-Eigenschaft (6) aus dem LQG-Hilbert-Raum bleibt ein offenes Problem (daher das “?” in Tabelle II).

Mit $X = 1 - 2\rho/\rho_c$ kann die LQC-Friedmann-Gleichung (14) umgeschrieben werden als $H^2 \propto (1 - X^2)$. Der Faktor $(1 - X^2)$ ist dieselbe Nichtlinearität, die auf der rechten Seite der Sättigungs-ODE (1) erscheint; beachte jedoch, dass die LQC-Gleichung H^2 regiert, während die CRM-ODE dX/da regiert – die strukturelle Analogie liegt im Sättigungsmechanismus, nicht einer direkten Identifikation der beiden Gleichungen. Die CRM-Parameter k und Φ_0 würden sich auf die LQG-Mindestfläche Δ (der kleinste Nicht-Null-Eigenwert des Flächenoperators) und den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} abbilden, obwohl diese Abbildung nicht rigoros hergeleitet wurde.

B. Asymptotic Safety

Im Asymptotic Safety-Programm [8–10] hat die gravitationale effektive Wirkung einen UV-Fixpunkt $g^* > 0$, wo die dimensionslose Newton-Konstante und kosmologische Konstante skalenunabhängig werden. Der RG-Fluss von UV zu IR definiert die effektive Gravitationskopplung G_k und kosmologische “Konstante” Λ_k als Funktionen der RG-Skala k .

Axiom A: Der UV-Fixpunkt bietet eine endliche obere Schranke für die effektive Kopplung. *Axiom B:* Der Fluss weg vom Fixpunkt ist kooperativ: die relevante Richtung hat positiven kritischen Exponenten [10]. *Axiom C:* Der Fluss ist monoton entlang der relevanten Richtung (per Definition von Relevanz). *Axiom D:* Eine Klarstellung ist nötig. Die Wilson-RG-Halbgruppe $R_{k_1} \circ R_{k_2} = R_{k_1 k_2}$ operiert auf dem Raum der Kopplungen (dem “Theorie-Raum”), nicht direkt auf der Antwortfunktion S_T . Um die beiden zu verbinden, muss man den RG-Fluss auf die einzelne relevante Richtung parametrisiert durch g projizieren. Im Asymptotic Safety-Szenario mit UV-Fixpunkt wird der Fluss nahe dem Fixpunkt durch eine endliche Anzahl relevanter Richtungen kontrolliert; in der einfachsten Truncation (Einstein-Hilbert mit G_k, Λ_k) gibt es typischerweise zwei relevante Richtungen. Die Einzelfeld-Annahme von Axiom D entspricht der Beschränkung auf die dominante relevante Richtung, unter welcher die RG-Halbgruppe auf dem Theorie-Raum ein Kompositionsgesetz auf der eindimensionalen Antwort $S_T(g)$ induziert. Diese Projektion ist exakt, wenn eine einzelne relevante Richtung dominiert (wie im kosmologischen Sektor), und näherungsweise ansonsten – eine Limitation, die mit der Einzelfeld-Einschränkung des Theorems geteilt wird (siehe Limitation 4).

Tatsächlich ist Asymptotic Safety das QG-Programm, in dem Axiom D am natürlichsten erfüllt ist, weil

es *selbst* eine Renormalisierungs-Gruppen-Aussage ist.¹ Das Asymptotic Safety-Szenario für Kosmologie [24] produziert effektive Friedmann-Gleichungen mit Sättigungsverhalten bei hoher Krümmung, konsistent mit der tanh-Form.

Neuere Berechnungen in zunehmend anspruchsvolleren Truncations bieten wachsende numerische Evidenz für den Reuter-Fixpunkt. Eichhorn und Held [7] zeigen, dass Asymptotic Safety die Top-Quark-Yukawa-Kopplung einschränkt, mit einer Vorhersage von ungefähr 171 GeV für die Top-Quark-Polmasse, konsistent mit dem beobachteten Wert von 172.6 ± 0.3 GeV [29] – eine konkrete Teilchenphysik-Konsequenz des UV-Fixpunkts. Breiter zeigt Eichhorn [6], wie die Fixpunkt-Struktur natürlicherweise die Standard-Modell-Materie-Inhalte ohne zusätzliche Feinabstimmung unterbringt. Diese Resultate stärken den Fall, dass das Asymptotic Safety-Programm die Axiome natürlicherweise realisiert: die Fixpunkt-Existenz (Axiom A), der kooperative Fluss (Axiom B), und die RG-Komposition (Axiom D) sind Eigenschaften, die in hochmodernen funktionalen RG-Berechnungen verifiziert sind.

C. Stringtheorie und Holographie

In der Stringtheorie bietet die UV-Endlichkeit der String-Amplitude Axiom A. Die String-Landschaft führt zwar ein Selektionsproblem ein, verletzt aber die Axiome für kein *spezifisches* Vakuum nicht: innerhalb einer gegebenen Kompaktifizierung hat die Low-Energy-EFT einen eindeutigen RG-Fluss, der die Axiome B–D erfüllt.

Der holographische Zugang (AdS/CFT [14]) bietet besonders starke Unterstützung für Axiom D: die Bulk/Boundary-Korrespondenz *ist* ein Kompositionsgesetz, das geometrische Beschreibungen auf verschiedenen Skalen in Beziehung setzt. Die Ryu-Takayanagi-Formel [25] und ihre Quantenkorrekturen etablieren eine monotone Beziehung zwischen Verschränkungs-Entropie und geometrischer Fläche, was Axiom C erfüllt.

¹ Der selbstähnliche, skalenrekursive Charakter von Axiom D ist nicht auf den kosmologischen RG-Fluss beschränkt; dasselbe Motiv tritt in der Verteilung der Primzahlen auf. Im Primonen- bzw. Riemann-Gas von Julia [35] besitzt ein System nicht-wechselwirkender bosonischer Oszillatoren mit Energien $\log p$ über den Primzahlen p die Riemannsche Zeta-Funktion als Zustandssumme. Hartnoll und Yang [34] haben gezeigt, dass die Belinsky-Khalatnikov-Lifshitz-Dynamik der Gravitation nahe einer raumartigen Singularität nach semiklassischer Quantisierung eine modulinvariante konforme Quantenmechanik ist, deren Zustände genau ein solches primzahlgelabeltes Oszillatorgas realisieren – mit Wellenfunktionen proportional zu automorphen L -Funktionen auf der kritischen Achse. Dies legt nahe, dass Schwarzsloch-Singularitäten ein weiteres physikalisches System sein könnten, in dem eine kapazitätsbegrenzte, selbstähnliche geometrische Ordnung der durch die Axiome kodierten Art natürlicherweise entsteht. Wir verzeichnen den Zusammenhang als motivierende Parallele, nicht als unabhängige Verifikation der Axiome A–D.

Für kosmologische Anwendungen bietet die de Sitter-Entropie-Schranke $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G) < \infty$ Axiom A, während der holographische RG-Fluss [26] die Kompositions-Struktur bietet.

D. Causal Set Theory

In der Causal Set Theory [15, 16] tritt die kosmologische Konstante als dynamische Größe $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$ auf, wobei N die Anzahl der Causal-Set-Elemente ist. Dies produziert eine kosmologische “Konstante”, die abnimmt, während das Universum wächst, und einen endlichen asymptotischen Wert anstrebt – genau das Sättigungsverhalten von Axiom C.

Axiom A: Die endliche Dichte von Causal-Set-Elementen bietet geometrische Kapazität. *Axiom B:* Während das Poisson-Sprinkling selbst unkorreliert ist, produziert die *Dynamik* der Causal-Set-Entwicklung (sequentielle Wachstums-Modelle [16]) kooperatives Ordnen: neu hinzugefügte Elemente haften vorzugsweise an die bestehende kausale Struktur an, was geometrische Ordnung verstärkt. *Axiom C:* Die $1/\sqrt{N}$ -Skalierung nimmt monoton ab. *Axiom D:* Die sequentielle Wachstums-Dynamik bietet ein natürliches Kompositionsgesetz, obwohl sein genaues Verhältnis zur RG-Komposition von Axiom D weitere Analyse erfordert.

E. Causal Dynamical Triangulations

Causal Dynamical Triangulations (CDT) [32, 33] konstruieren Quantengravitation mittels eines regularisierten Pfadintegrals über kausale Triangulationen. Monte-Carlo-Simulationen enthüllen ein Phasendiagramm mit einer physikalisch relevanten “de Sitter-Phase” (Phase C_{dS}), in der die emergente Geometrie Hausdorff-Dimension $d_H \approx 4$ hat und ein Volumenprofil, das gut durch euklidischen de Sitter-Raum beschrieben wird.

Axiom A: Die Triangulation bietet eine endliche Anzahl von Bausteinen pro Raumzeit-Volumen, erzwingt also endliche geometrische Kapazität. *Axiom B:* In der de Sitter-Phase wächst das Volumenprofil kooperativ, bevor es sättigt – die geometrische Ordnung verstärkt sich selbst. Die ungeraden-Potenz-Struktur (Axiom B’) ist nicht explizit verifiziert worden. *Axiom C:* Das de Sitter-Volumenprofil ist monoton (im expandierenden Bereich). *Axiom D:* CDT besitzt natürliche Blockierungs-Transformationen (Vergrößerung von Triangulationen), was einen Kandidaten für das Kompositionsgesetz bietet, aber die präzise assoziative Struktur ist nicht rigoros etabliert worden.

F. Nichtkommutative Geometrie

Das Programm von Connes [17] rekonstruiert Geometrie aus spektralen Daten (der Dirac-Operator auf einer nichtkommutativen Algebra). Das Spektral-Wirkungs-Prinzip liefert das Standard-Modell-Lagrangian gekoppelt an Gravitation aus dem Spektrum eines einzelnen Operators.

Axiom A: Die Spektral-Wirkung hat eine natürliche UV-Abschneidung Λ (die Energieskala, bei der die Spektral-Summe ausgewertet wird), was endliche geometrische Kapazität bietet. *Axiom B:* Die Seeley-DeWitt-Koeffizienten $a_0, a_2, a_4, \dots$ der Wärme-Kern-Expansion haben gerade Potenzen von Λ ; die ungeraden-Potenz-Struktur, die Axiom B erfordert, tritt nach Reparametrisierung zu einer geeigneten Kopplungs-Variable auf, aber diese Identifikation erfordert weitere Analyse. *Axiom C:* Der spektrale Fluss ist in der geeigneten Richtung monoton. *Axiom D:* Die Komposition von spektralen Tripeln bietet algebraische Kompositions-Kohärenz.

G. Zusammenfassung: Warum Abel-/Randkragen-Universalität?

Tabelle II fasst die Kompatibilitätskarte zusammen. Für kein einzelnes externes QG-Programm wird hier rigoros bewiesen, dass es A–D, $D^\pm$ und D’ gleichzeitig erfüllt; vielmehr liefert jedes Programm kompatible Motive für eine wesentliche Teilmenge, während die verbleibenden Axiome offene Herleitungsaufgaben sind. Kein Eintrag in dieser Tabelle ist ein Beweis, dass ein UV-Programm D’ oder $D^\pm$ erfüllt. Die Tabelle verzeichnet Kompatibilitätssignale und offene Herleitungsaufgaben. D’ ist dabei besonders wichtig: Es ist für die aufgelisteten UV-Programme in diesem Paper nicht verifiziert, sondern wird vom effektiven CRM-Kanal als projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme auferlegt. Der Wert des Theorems ist daher zweifach: (i) als *bedingtes* Resultat identifiziert es die präzisen Bedingungen, unter denen tanh-Sättigung folgt, und (ii) als *Diagnostikum* zeigt es auf, welche Eigenschaften jedes QG-Programms weitere Untersuchung erfordern. Die breite Kompatibilität über Programme hinweg erklärt die Abel-/Randkragen-Universalität der Sättigungsdynamik; der exakte tanh-Repräsentant erfordert zusätzlich den projektiven Quotienten.

VI. RAUMZEIT ALS GEORDNETE PHASE

Die breite Axiom-Kompatibilität in Tabelle II wirft eine konzeptionelle Frage auf: Falls der projektive tanh-Repräsentant in einem UV-Programm physikalisch realisiert ist, was bedeutet diese Abel-/Randkragen-Universalität für die Natur der Raumzeit?

TABLE II. Kompatibilitätskarte mit Quantengravitations-Motiven. $\checkmark$ = kompatibles Motiv mit expliziter Konstruktion, $(\checkmark)$ = kompatibles Motiv mit milden Annahmen, $?$ = offene Herleitung, no = bekannte Obstruktion. Die D'-Spalte notiert, ob der projektive Doppelrand-Quotient hergeleitet oder explizit angenommen wird.

Programm	A	B/B'	C	D	D'
LQG/LQC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$	$?$
Asymptotic Safety	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$
Strings/Holographie	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$
Causal Sets	$\checkmark$	$?$	$\checkmark$	$?$	$?$
CDT	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$	$?$
NCG	$\checkmark$	$?$	$?$	$?$	$?$
CRM (effektiv)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	angenommen

A. Die konzeptionelle Verschiebung

Das Saturation Theorem, kombiniert mit dem empirischen Erfolg des CRM, deutet auf eine mögliche interpretative Lesart der Quantengravitation hin:

In dieser Lesart ist Quantengravitation nicht nur die Quantisierung der Metrik, sondern auch die Theorie, wie geometrische Ordnung aus einem vorgemetrischen Quantensystem hervorgeht.

Die tanh-Sättigung ist daher am besten als bedingte Signatur eines kapazitätsbegrenzten kooperativen Ordnungsprozesses zu lesen, sobald das eindimensionale Kompositionsgesetz und D' festgelegt sind. Das ist kein unabhängiger Beleg für eine bestimmte mikroskopische Ontologie; es liefert eine gemeinsame Normalformsprache für Spin-Netzwerk-, String-/holographische, Causal-Set- oder Code-Subspace-Realisierungen, sofern sie die genannten Gates erfüllen.

B. Die ferromagnetische Analogie

Die Analogie zur spontanen Magnetisierung ist auf der Ebene eines Mean-Field-Ginzburg-Landau-Modells nützlich. Die CRM-Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ kann als Bewegungsgleichung für den Ordnungsparameter eines toy-modellhaften Phasenübergangs zweiter Ordnung mit Doppelmulden-Freien-Energie $F(X) = -k(X - X^3/3)$ geschrieben werden. Paper III [3] entwickelt diese Analogie im Detail und identifiziert:

Ferromagnetismus	CRM-Kosmologie
Magnetisierung M	Krümmungsrückkehr Ω_Φ
Inverse Temperatur $J/k_B T$	Skalenfaktor a
Curie-Punkt $(J/k_B T_c)$	Übergang a_{trans}
Spin-Wechselwirkung J	Krümmungskopplung k
Sättigung M_s	Sättigung Φ_0
$\tanh(J/k_B T)$	$\tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$

Das Saturation Theorem liefert eine mathematische Leitplanke für diese Analogie auf der *Mean-Field-Ebene*: beide Systeme erfüllen in der Mean-Field-Approximation

eine Abel-artige Kompositionsstruktur, und die übliche Mean-Field-Magnetisierung entspricht dem projektiven tanh-Repräsentanten. Wir bemerken, dass die exakte Magnetisierung eines d -dimensionalen Ising-Modells von der Mean-Field-tanh in der Nähe der kritischen Temperatur abweicht ($M \sim (T_c - T)^\beta$ mit nichttrivialem kritischen Exponenten $\beta \neq 1/2$ für $d < 4$). Diese Abweichung entspricht dem Zusammenbruch der eindimensionalen projektiven Randkragen-Approximation in der Nähe des *kritischen Punktes* (dem Beginn der Ordnung), nicht in der Nähe der *Sättigung* ($T \rightarrow 0$). Die Analogie ist daher auf das Sättigungsregime und die Mean-Field-Theorie begrenzt; Fluktuationskorrekturen in der Nähe der Kritikalität erfordern eine Mehrfeld-Erweiterung (siehe Ausblick). Innerhalb dieses Bereichs ist die Relation strukturell und nicht nur metaphorisch.

Nachdem wir das ontologische Rahmenwerk etabliert haben, wenden wir uns nun seinen empirischen Konsequenzen zu.

VII. BEOBACHTUNGSMÄSSIGE KONSEQUENZEN UND OFFENE FRAGEN

A. Was das Theorem vorhersagt

Das Saturation Theorem hat zwei Klassen von Testzielen. Tabelle III trennt theoremnähe Tests von CRM-spezifischer oder UV-abhängiger Evidenz.

Projektive Randkragen-Vorhersagen (nach Annahme von D'):

1. Wenn der projektive Randquotient physikalisch realisiert ist, sollte die kosmologische Expansionsgeschichte mit tanh-ähnlicher Sättigung verträglich sein. Wir betonen, dass das CRM-Ergebnis $\Delta\chi^2 = -5.5$ [2] *keinen* unabhängigen Test des Theorems darstellt, da das CRM mit einem tanh-Profil konstruiert wurde, bevor die Axiome formuliert wurden. Der empirische Gehalt des Theorems ist das *Kompositionsgesetz* $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$, das eine Vorhersage jenseits jeder individuellen Profilanpassung ist. Ein unabhängiger Test würde entweder (a) die Anpassung einer modellunabhängigen tanh-Vorlage an SN+CMB+BAO-

TABLE III. Beobachtungs- und UV-Evidenzledger. Die Tabelle trennt, was durch das Normalformtheorem geprüft wird, von dem, was zum CRM-Fit oder zu einer künftigen UV-Vervollständigung gehört.

Ziel	Aktuelle Rolle	Claim-Status	Nächstes Gate
Profilfit	Verträglichkeit der Spätzeitexpansion mit einer tanh-artigen Vorlage	Nur diagnostisch; CRM wurde mit tanh-Profil konstruiert und ist kein unabhängiger Theoremtest	Modellunabhängiger Template-Fit ohne CRM-spezifische Priors
Komposition	Direkter Inhalt der projektiven Normalform	Theoremnahes empirisches Ziel nach Annahme von D'	Sättigungsantworten über Rotverschiebungsbins gegen $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ prüfen
D'-Defekt	UV-Auswahl des projektiven Kragens	Offene physikalische Herleitung, nicht durch die QG-Programmtabelle etabliert	$\Delta_{D'} = \log R(C) - \log R(x) - \log R(y)$ in einem UV-Modell berechnen oder begrenzen
Parameterwerte	k, Φ_0, γ und Übergangsschärfe	CRM-/UV-spezifisch, nicht vom Theorem bestimmt	Parameter aus einem mikroskopischen Modell herleiten und gegen CRM-Fits vergleichen
Oszillatorische Residuen	Mögliche UV-sensitive Spätzeit-Residualstruktur	Nur Kandidatensignatur; für sich kein Beweis des Quantenursprungs	Frequenzfenster, Dämpfung, Nullkontrollen und Suchfenster vorregistrieren

Daten ohne CRM-spezifische Priors erfordern, oder (b) das Kompositionsgesetz direkt durch den Vergleich von Sättigungsantworten bei verschiedenen Rotverschiebungsbins verifizieren und die Konsistenz mit der Geschwindigkeitsadditionsregel prüfen.

2. Innerhalb des CRM-Fits wird die laufende Krümmungskopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$ als monotone Übergangsfunktion berichtet ($\beta_{\text{early}} \approx 2.8 \rightarrow \beta_{\text{late}} \approx 2.0$ [2]); theoremnah ist dies ein Konsistenzcheck für Axiom C, keine unabhängige Herleitung.
3. Kein alternatives Relaxationsprofil (logistisch, Potenzgesetz, etc.) kann Unterstützung aus diesem Theorem beanspruchen, sofern es nicht ebenfalls ein skalenkohärentes Kompositionsgesetz realisiert und den projektiven Quotienten erklärt.

UV-abhängige Vorhersagen (zwischen Vervollständigungen diskriminierend):

1. Die spezifischen Werte von k (Sättigungsrate), Φ_0 (Sättigungsamplitude) und γ (Kopplungskonstante) hängen von der UV-Theorie ab.
2. Die Übergangsschärfe (n im sigmoidalen Übergang) würde eine Universalitätsklasse codieren, sofern eine UV-zu-Kosmologie-Abbildung vorliegt.
3. Sub-Planck-Korrekturen zum tanh-Profil sind als UV-theoriespezifische Kandidaten zu behandeln, solange keine passenden Kontrollen definiert sind.

B. Das fehlende Stück: warum *diese* Parameter?

Das Saturation Theorem bestimmt die Abel-/Randkragenstruktur und unter D' die projektive

Form, aber nicht die *Koeffizienten*. Die verbleibende offene Frage ist:

Warum hat das Universum die spezifischen Werte $k \approx 9.8, \Phi_0 \approx 0.43, \gamma \sim \mathcal{O}(1) H_0^{-2}$?

Diese Frage ist analog zum Problem der Feinstrukturkonstante: die *Existenz* der elektromagnetischen Kopplung wird durch Eichsymmetrie erzwungen, aber der Wert $\alpha \approx 1/137$ wird nicht allein durch die Symmetrie bestimmt.

Mehrere UV-Vervollständigungen machen spezifische Vorhersagen:

- **LQC:** Φ_0 wird auf den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} abgebildet, der durch Schwarzschild-Entropie eingeschränkt wird [27]. Dies würde einen spezifischen Wert von Φ_0 vorhersagen.
- **Asymptotische Sicherheit:** Die kritischen Exponenten am UV-Fixpunkt bestimmen die Übergangsschärfe n , was eine spezifische Vorhersage für die Form von $\beta_{\text{eff}}(a)$ liefert [9].
- **Holographie:** Die de Sitter-Entropie $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G)$ verbindet Φ_0 mit dem Verhältnis von UV- und IR-Skalen.

Ein konkreter Testfall ist die $\sqrt{\pi}$ -Vermutung von Paper II [2]: das CRM sagt einen MOND-ähnlichen Verstärkungsfaktor $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ voraus, der aus der Gauß-Normalisierung der Sättigungs-Partitionsfunktion hervorgeht. Die Ableitung dieses Wertes aus einer spezifischen UV-Vervollständigung würde direkt die Quantengravitations-Parameter mit der beobachteten Galaxien-Dynamik verbinden.

C. Skalarfeld-Oszillationen als QG-Signatur

Paper III [3] zeigt, dass das Pöschl-Teller-Potential ein diskretes Spektrum von Bindungszuständen unterstützt. Im kosmologischen Kontext entsprechen diese oszillatorischen Korrekturen zur Expansionsrate in späten Zeiten:

$$H^2(a) = H_{\text{smooth}}^2(a) [1 + \epsilon \cdot e^{-\Gamma a} \cos(\omega a + \delta)] , \quad (15)$$

mit $\epsilon \ll 1$. Diese Oszillationen wären eine Kandidatensignatur mikroskopischer Struktur im Sättigungsmechanismus – der Analogie nach verwandt mit diskreten Energieniveaus eines Quantensystems. Eine Detektion in hochpräzisen BAO- oder SN-Daten würde nur dann einen UV-sensitiven Residualkanal stützen, wenn Frequenzfenster, Dämpfungsskala und Nullkontrollen vor der Anpassung festgelegt wurden; sie wäre für sich kein Beweis des Quantenursprungs der CRM-Sättigung.

VIII. DISKUSSION UND AUSBLICK

A. Was wurde erreicht

1. **Eine konditionale Normalform-/No-Go-Aussage:** Jede kosmologische Theorie, die die Axiome A–D, B', $D^\pm$ und die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme D' erfüllt, muss eine tanh-artige Sättigung produzieren. Ohne D' liefern dieselben strukturellen Voraussetzungen die Abel-/Randkragenstruktur.
2. **Abel-Universalität eingegrenzt:** Die Beobachtung, dass LQG, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets und Noncommutative Geometry strukturell ähnliche Sättigungsdynamiken nahelegen, ist auf Abel-Strukturebene erklärbar; der konkrete tanh-Repräsentant hängt zusätzlich vom projektiven Randquotienten ab.
3. **CRM kalibriert:** Das CRM's Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ kann unter den genannten Axiomen als projektive Normalform kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation gelesen werden, nicht nur als phänomenologisches Fitting.
4. **Ontologische Interpretation:** In diesem Rahmen kann Quantengravitation nicht nur als Metrikquantisierung, sondern auch als Theorie geometrischer Ordnung gelesen werden – als Übergang von einem prä-geometrischen Quantensystem zu klassischer Raumzeit.

B. Relation zum CRM-Programm

Dieses Paper liefert die bedingte axiomatische Schicht des CRM-Programms, vervollständigt aber nicht dessen

physikalischen Bogen. Nach dem Wahrheitsaudit und der Route-3-Rekonstruktion vom Juli 2026 gilt folgender logischer Status:

1. Die *Form* der Dynamik (tanh) ist ein mathematisches Theorem, sobald die signierten inneren Kompositionsvoraussetzungen und der projektive Randquotient D' akzeptiert werden; ohne D' beweist das Theorem die Abel-/Randkragenstruktur.
2. Die historische direkte Spurkopplungsrouten aus Paper III ist ein Fehlaudit; Route 3 ist ein Wirkungskandidat, dessen vollständige FLRW-, Hamilton-, PPN-, Lensing- und Datengates offen bleiben.
3. Die berichteten Fitparameter beschränken einen effektiven phänomenologischen Proxy, noch keine validierte Route-3- oder $f(R)$ -Realisierung.
4. Die *UV-Vervollständigung* bleibt offen – und muss erklären, warum der projektive Randquotient und nicht ein anderer glatter Randkragen die physikalische Kompositionsvariable ist.

C. Post-Zookeeper-Roadmap für Stabilitätserweiterungen

Das Post-Zookeeper-Programm ist der vom Autor vorgeschlagene künftige Rahmen zur Klassifikation zulässiger UV-Antwortkanäle; es wird im Beweis des Theorems nicht verwendet.

D. Limitationen und Einschränkungen

1. **Axiom D und D' sind stark.** Das Renormalisierungsgruppen-Kompositionsgesetz ist restriktiv, und die projektive Doppelrand-Quotienten-Annahme ist eine zusätzliche mathematische und physikalische Wahl. Theorien ohne gut definiertes RG-Fließverhalten (einige diskrete Ansätze, Multiversum-Szenarien) erfüllen möglicherweise D nicht; Theorien mit einem anderen Randkragen können D erfüllen, aber D' verfehlen. Diese Unterscheidung ist wesentlich: D liefert Skalenkohärenz, D' wählt den tanh-Repräsentanten.
2. **Der Beweis ist algebraisch, nicht konstruktiv.** Das Theorem stellt die Abel-Struktur der Antwort und unter D' ihren projektiven tanh-Repräsentanten fest, konstruiert aber die UV-Theorie nicht. Die "Reparametrisierung" $u(g)$ absorbiert mikroskopische Informationen; $u(g)$ aus ersten Prinzipien zu bestimmen erfordert das Lösen der spezifischen QG-Theorie. Ein potentieller Einwand ist, dass jede beschränkte monotone Funktion trivial als $\tanh(\alpha u(g))$ für ein geeignetes $u(g)$

geschrieben werden kann, was die Profilform inhaltsleer macht. Der nichttriviale Inhalt liegt daher im *Kompositionsgesetz* und für die tanh-Auswahl im projektiven Quotientengesetz $R(C) = R(x)R(y)$.

3. **Kosmologische Einschränkung und Theoriedrift.** Die Axiome sind für einen ausgewählten kosmologischen Antwortkanal formuliert und begründen keine Physik Schwarzer Löcher, Gravitationswellen, Screening- oder Clusterphänomenologie. Frühere Chamäleon- und Bullet-Cluster-Claims gehören zur abgelösten Route und folgen nicht aus diesem Theorem. In der aktiven Route-3-Rekonstruktion ist $c_T = 1$ nur auf der transversal-spurlosen Familie bestätigt; Skalar-Hamiltonstabilität, FLRW-Antwort, Lensing und Screening bleiben getrennte Gates.
4. **Die kontinuierliche Gruppenklassifikation und Einzelfeld-Einschränkung.** Der Beweis beruht auf Aczél's Darstellungstheorem für kontinuierliche assoziative Operationen [20] und der Klassifikation eindimensionaler formaler Gruppengesetze [21]. Während diese Resultate gut etabliert sind, erfordert die physikalische Anwendbarkeit die Annahme, dass die Komposition *eindimensional* ist – d.h. dass es eine einzige relevante Richtung gibt. Dies ist eine echte Limitation: das CRM selbst (Paper IV [4]) führt einen Vektorsektor neben dem Skalar ein, und realistische modifizierte Gravitationstheorien (z.B. Horndeski, beyond-Horndeski) haben generisch mehrere gekoppelte Freiheitsgrade. Jedoch merken wir an, dass das Theorem auf den *Skalarsektor in Isolation* angewendet wird: der CRM's Skalar-Sättigungs-Kanal $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ ist eine eindimensionale Antwort, die die Axiome unabhängig vom Vektorsektor erfüllt. Die Mehrfeld-Erweiterung (Klassifikation mehrdimensionaler kommutativer Gruppengesetze, einschließlich elliptischer und Lubin-Tate formaler Gruppen) ist ein offenes mathematisches Problem, das das Theorem verstärken würde, wird aber für das Skalarsektor-Resultat nicht benötigt.
5. **Randkragen-Freiheit.** Glattes Randverhalten allein wählt $\arctanh$ nicht aus. Der Gegen-Kragen $\phi_\varepsilon = \arctanh + \varepsilon x$ erhält einen glatten positiven Randkragen, ändert aber die Abel-Koordinate. Die Eindeutigkeitsauswahl wird daher bewusst auf D' verlagert: Sobald der projektive Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ unter Komposition multiplizieren muss, folgt $\arctanh = \frac{1}{2} \log R$ unmittelbar und bis auf Skalierung eindeutig.

E. Das No-Go-Theorem als klasseninterner Filter

Innerhalb des Rahmens $A-D+B'+D^\pm$ bedeutet ein Versagen von D' , dass das tanh-CRM-Gesetz nicht als projektive Normalform ausgewählt wird. Ein solches Versagen falsifiziert das UV-Modell nicht; es verortet es außerhalb der projektiven CRM-Unterklasse oder identifiziert einen messbaren D' -Defekt. Theorien, die die Axiome $A-D$ zusammen mit B' und $D^\pm$ erfüllen, sind nur auf ein Abel-/Randkragen-Sättigungsgesetz eingeschränkt. Theorien, die diese strukturellen Voraussetzungen und D' erfüllen, sind auf tanh-Sättigung in ihrem kosmologischen Antwortkanal eingeschränkt.

F. Relation zu anderen Rahmenwerken

Swampland-Vermutungen. Die de Sitter-Swampland-Vermutung [30] postuliert $|\nabla V|/V \geq c \sim \mathcal{O}(1)$ in jeder Quantengravitations-Landschaft und benachteiligt eine strikte kosmologische Konstante. Das Saturation Theorem ist komplementär: es adressiert nicht die Existenz von de Sitter-Vakua, aber schränkt den *dynamischen Zugang* zum Spätzeitattraktor ein. Eine CRM-artige Sättigung mit $\Phi_0 < \infty$ ist kompatibel mit der Swampland-Schranke, da die effektive Dunkle-Energie-Dichte $\rho_\Phi(a)$ dynamisch anstatt als festes Λ entwickelt.

EFT der Dunklen Energie. Die effektive Feldtheorie der Dunklen Energie [31] parametrisiert Abweichungen vom Λ CDM auf der Ebene der gestörten Wirkung. Das Saturation Theorem operiert auf einer anderen Ebene: es schränkt die *Hintergrund*-Antwortfunktion ein, nicht die perturbative Operatorbasis. Eine zukünftige Aufgabe ist, die tanh-Sättigung in der EFT-of-DE-Sprache auszudrücken und die CRM-Parameter (k, Φ_0, γ) auf die EFT-Operatorkoeffizienten $\{\alpha_i(t)\}$ abzubilden.

G. Ausblick

Drei Richtungen sind unmittelbar:

1. **Parameterherleitung.** Der nächste Schritt ist, k , Φ_0 und γ aus einer spezifischen UV-Vervollständigung herzuleiten. Der vielversprechendste Kandidat ist die LQG/holographische Schnittmenge, wo der Barbero-Immirzi-Parameter und die holographische Entropie-Schranke gemeinsam die Sättigungsparameter fixieren könnten.
2. **Mehrfeld-Erweiterung.** Die Erweiterung des Theorems auf Theorien mit mehreren Sättigungs-Kanälen (z.B. Skalar + Vektor im CRM [4]) erfordert die Klassifikation mehrdimensionaler kommutativer Gruppengesetze (das höherdimensionale Analogon der Abel-Gleichungs-Reduktion). Dies ist mathematisch reichhaltiger und könnte Beschränkungen auf die Vektorsektor-Parameter K_B und $\mathcal{F}$ liefern.

3. **Schwarzloch-Inneres.** Wenn das Saturation Theorem auf Schwarzloch-Innere (mit der Radialkoordinate die Skalenfaktor ersetzend) angewendet wird und der projektive Randquotient dort der richtige innere Kragen ist, sagt es eine tanh-artige Singularitätsauflösung voraus – konsistent mit LQG-Bounce-Modellen [22] und dem Planck-Star-Szenario [28].

IX. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben ein korrigiertes Saturation Theorem bewiesen: endliche geometrische Kapazität, kooperative Verstärkung, monotone kosmische Kontrolle und Renormalisierungsgruppen-Komposition reduzieren eindimensionale kosmologische Sättigung auf eine Abel-Koordinaten-/Randkragenstruktur. Das tanh-Profil folgt, wenn der Sättigungsrand zusätzlich durch den projektiven Quotienten $R = (1 + x)/(1 - x)$ normalisiert wird.

Das Theorem hat drei Konsequenzen:

1. Das CRM's Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ kann als *projektive Normalform* von kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation gelesen werden, sobald der Randquotient fixiert ist.
2. Die Beobachtung, dass LQG, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets und Noncommutative Geometry ähnliche Sättigungsstrukturen produzieren, ist auf Abel-/Randkragenebene erklärt; der konkrete tanh-Repräsentant erfordert den projektiven Quotienten.
3. Das Paper bietet einen Interpretationsrahmen, in dem Quantengravitation nicht nur als Metrikquantisierung, sondern auch als Theorie geometrischer Ordnung untersucht wird – als Übergang von einem prä-geometrischen Quantensystem zu klassischer Raumzeit.

Das verbleibende offene Problem – die spezifischen Parameter (k, Φ_0, γ) und den projektiven Randquotien-

ten aus einer UV-Vervollständigung herzuleiten – ist das Analogon zur Ableitung der Feinstrukturkonstante aus einer Theorie der Quantenelektrodynamik. Das Theorem schränkt die *Normalform* jeder Theorie ein, die die genannten Hypothesen erfüllt, sobald der Randquotient fixiert ist.

Das Sättigungsprofil ist durch Skalenkohärenz plus projektiven Randquotienten auf den tanh-Typ eingeschränkt; bloße glatte Randregularität liefert die breitere Abel-Kragenklasse.

KI-OFFENLEGUNG

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Finanzierung durchgeführt. Öffentliche wissenschaftliche Recheninfrastruktur wurde im gesamten CRM-Programm genutzt.

Werkzeugeinsatz. KI-basierte Werkzeuge unterstützen den Arbeitsprozess nicht-autorschaftlich bei Literaturorganisation, Entwurfs- und Codeassistenz, sprachlicher Überarbeitung, Konsistenzprüfungen sowie der L^AT_EX-/PDF-Qualitätssicherung. Quellenauswahl, mathematische Argumente, physikalische Hypothesen, axiomatische Entscheidungen, wissenschaftliche Interpretation und finale Entscheidungen wurden vom Autor geprüft und verantwortet. Die Werkzeuge sind weder Autoren noch Koautoren, werden nicht als Beitragende gewürdigt und dienen weder als Wahrheitsquelle noch als unabhängige Validierungsinstanz. Der Autor trägt die volle Verantwortung für den Inhalt.

Finanzierungsinformationen. Diese Forschung erhielt keine externe Finanzierung.

Datenverfügbarkeit. Dieses Paper ist rein theoretisch. Das öffentliche CRM-Repository mit Analyseskripten, Datenprodukten und Paper-Quelldateien ist verfügbar unter <https://github.com/research-line/crm-cosmology>; der Zenodo-Concept-DOI für CRM I–IV ist [10.5281/zenodo.18728935](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728935).

-
- [1] L. Geiger (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Companion paper (Paper I). <https://github.com/research-line/crm-cosmology/tree/main/papers>. doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [2] L. Geiger (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper (Paper II). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [3] L. Geiger (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [4] L. Geiger (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [5] J. F. Donoghue (1994). General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections. *Physical Review D*, 50(6), 3874. DOI: 10.1103/PhysRevD.50.3874. arXiv:gr-qc/9405057.
 - [6] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
 - [7] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymp-*

- totic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.040. arXiv:1707.01107.
- [8] S. Weinberg (1979). Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation. In S. W. Hawking & W. Israel (Eds.), *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pp. 790–831. Cambridge University Press.
- [9] M. Reuter (1998). Nonperturbative evolution equation for quantum gravity. *Physical Review D*, 57(2), 971. DOI: 10.1103/PhysRevD.57.971. arXiv:hep-th/9605030.
- [10] R. Percacci (2017). *An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety*. World Scientific.
- [11] J. Polchinski (1998). *String Theory*, Vols. 1–2. Cambridge University Press.
- [12] C. Rovelli (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
- [13] T. Thiemann (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.
- [14] J. Maldacena (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231–252. [Reprinted in *Int. J. Theor. Phys.* **38**, 1113–1133 (1999).] DOI: 10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1. arXiv:hep-th/9711200.
- [15] R. D. Sorkin (2005). Causal sets: Discrete gravity. In *Lectures on Quantum Gravity*, pp. 305–327. Springer. DOI: 10.1007/0-387-24992-3_7. arXiv:gr-qc/0309009.
- [16] S. Surya (2019). The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22, 5. DOI: 10.1007/s41114-019-0023-1.
- [17] A. Connes (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
- [18] J. D. Bekenstein (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287–298. DOI: 10.1103/PhysRevD.23.287.
- [19] A. Almheiri, X. Dong, & D. Harlow (2015). Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015, 163. DOI: 10.1007/JHEP04(2015)163.
- [20] J. Aczél (1966). *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York.
- [21] M. Hazewinkel (1978). *Formal Groups and Applications*. Academic Press.
- [22] A. Ashtekar, T. Pawłowski, & P. Singh (2006). Quantum nature of the Big Bang. *Physical Review Letters*, 96(14), 141301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.141301. arXiv:gr-qc/0602086.
- [23] M. Bojowald (2008). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11, 4. DOI: 10.12942/lrr-2008-4.
- [24] A. Bonanno & M. Reuter (2002). Cosmology of the Planck era from a renormalization group for quantum gravity. *Physical Review D*, 65(4), 043508. DOI: 10.1103/PhysRevD.65.043508. arXiv:hep-th/0106133.
- [25] S. Ryu & T. Takayanagi (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de Sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18), 181602. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602. arXiv:hep-th/0603001.
- [26] J. de Boer, E. P. Verlinde, & H. L. Verlinde (2000). On the holographic renormalization group. *Journal of High Energy Physics*, 2000(08), 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2000/08/003. arXiv:hep-th/9912012.
- [27] K. A. Meissner (2004). Black-hole entropy in Loop Quantum Gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 21(22), 5245. DOI: 10.1088/0264-9381/21/22/015. arXiv:gr-qc/0407052.
- [28] C. Rovelli & F. Vidotto (2014). Planck stars. *International Journal of Modern Physics D*, 23(12), 1442026. DOI: 10.1142/S0218271814420267. arXiv:1401.6562.
- [29] S. Navas et al. (Particle Data Group) (2024). Review of Particle Physics. *Physical Review D*, 110, 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
- [30] G. Obied, H. Ooguri, L. Spodyneiko, & C. Vafa (2018). De Sitter Space and the Swampland. arXiv:1806.08362.
- [31] G. Gubitosi, F. Piazza, & F. Vernizzi (2013). The Effective Field Theory of Dark Energy. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(02), 032. DOI: 10.1088/1475-7516/2013/02/032. arXiv:1210.0201.
- [32] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, & R. Loll (2005). The spectral dimension of the universe is scale dependent. *Physical Review Letters*, 95(17), 171301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.171301. arXiv:hep-th/0505113.
- [33] R. Loll (2020). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002. DOI: 10.1088/1361-6382/ab57c7. arXiv:1905.08669.
- [34] S. A. Hartnoll & M. Yang (2025). The conformal primon gas at the end of time. *Journal of High Energy Physics*, 2025(07), 281. DOI: 10.1007/JHEP07(2025)281. arXiv:2502.02661.
- [35] B. L. Julia (1990). Statistical theory of numbers. In J. M. Luck, P. Moussa, & M. Waldschmidt (Eds.), *Number Theory and Physics*, Springer Proceedings in Physics, Vol. 47, pp. 276–293. Springer-Verlag, Berlin.