

# Teoría de Números

## Práctica 1

Lucio Santi

lsanti@dc.uba.ar

10 de septiembre de 2017

**Ejercicio.** Asumiendo que el anillo  $\mathbb{Z}[\alpha = \frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$  es DFU, probar que  $(x, y) = (\pm 18, 7)$  son las únicas soluciones enteras de la ecuación

$$x^2 + 19 = y^3$$

*Resolución.* Si factorizamos  $x^2 + 19$  en  $\mathbb{Z}[\alpha]$ , tenemos

$$\begin{aligned} x^2 + 19 &= (x + \sqrt{-19})(x - \sqrt{-19}) \\ &= ((x-1) + 2\alpha)((x+1) - 2\alpha) \\ &= \beta\gamma \end{aligned}$$

Consideremos un  $\delta = a + b\alpha \in \mathbb{Z}[\alpha]$  tal que  $\delta|\beta$  y  $\delta|\gamma$ . Luego, se tiene que

$$\delta | ((x-1) + 2\alpha) - ((x+1) - 2\alpha) = -2 + 4\alpha = 2(-1 + 2\alpha) = \eta$$

Puesto que  $\mathbb{Z}[\alpha]$  es un dominio de factorización única,  $\eta$  es expresable como producto de primos de forma única (salvo asociados). Por ende, supongamos que  $\delta$  es un divisor primo de  $\eta$ . De esta forma,  $\delta|2$  o bien  $\delta|-1 + 2\alpha$ , de lo que sigue que  $N(\delta)|N(2) = 4$  o bien  $N(\delta)|N(-1 + 2\alpha) = 19$ , siendo  $N(u + v\alpha) = u^2 + uv + 5v^2$  la norma de  $\mathbb{Z}[\alpha]$ . Observemos que, como función de  $u$ ,  $f(u) = N(u + v_0\alpha) = u^2 + uv_0 + 5v_0^2$  es decreciente hasta  $u = -v_0/2$ , donde alcanza su mínimo, y luego creciente. De esta forma,

$$N(u + v\alpha) = u^2 + uv + 5v^2 \geq (-v/2)^2 + (-v/2)v + 5v^2 = 19/4 v^2$$

Además, si buscamos que  $\delta|2$  o que  $\delta|-1 + 2\alpha$ , necesariamente debe ocurrir que  $b \neq 0$  si nos proponemos encontrar divisores no triviales. Así,  $N(\delta) \geq 19/4 > 4$ , por lo que  $\delta|2$  sólo si  $\delta$  es una unidad de  $\mathbb{Z}[\alpha]$ . Por otro lado, siempre que  $|b| > 2$ ,  $N(\delta) > 19$ , de manera que  $b = \pm 2$  si buscamos un divisor no unidad de  $-1 + 2\alpha$ . No obstante, en tales casos los únicos valores de  $\delta$  posibles son precisamente  $-1 + 2\alpha$  y  $1 - 2\alpha$ . En consecuencia, puesto que  $\delta = \pm(-1 + 2\alpha)$  no puede ser divisor simultáneo de  $\beta$  y de  $\gamma$ , se tiene que  $\beta$  y  $\gamma$  son coprimos en  $\mathbb{Z}[\alpha]$  o bien el único divisor primo que comparten es 2. En el primer caso, deben ser  $\beta$  y  $\gamma$  cubos simultáneamente de forma tal de satisfacer la ecuación deseada. En particular, deben existir ciertos  $c, d \in \mathbb{Z}$  tales que

$$\begin{aligned} \beta = (x-1) + 2\alpha &= (c + d\alpha)^3 \\ &= (c^3 - 5d^3 - 15cd^2) + (3c^2d - 4d^3 + 3cd^2)\alpha \end{aligned}$$

de lo que, por unicidad de escritura, sigue que

$$d(3c^2 - 4d^2 + 3cd) = 2$$

y esto vale si y sólo si  $d = 1$  y  $c \in \{1, -2\}$ . De esta forma,

$$x = 1 + c^3 - 5d^3 - 15cd^2 \in \{-18, 18\}$$

lo cual permite concluir que, en cualquier caso,  $y = 7$  reemplazando en la ecuación original.

Finalmente, si  $\beta$  y  $\gamma$  comparten a 2 como único divisor común primo, es posible considerar  $\beta' = 2\beta$  y  $\gamma' = \frac{\gamma}{2}$  siendo así  $\beta'$  y  $\gamma'$  coprimos en  $\mathbb{Z}[\alpha]$  (notar que  $\gamma' = \frac{x+1}{2} - \alpha$  no es divisible por 2). A través de un razonamiento similar al anterior, puede arribarse a la conclusión de que no existe una forma de expresar como cubo en  $\mathbb{Z}[\alpha]$  a  $\gamma'$ . Por ende, esto termina de probar que las únicas soluciones posibles a la ecuación planteada son las descriptas anteriormente.  $\square$

**Ejercicio.** Caracterizaremos los primos que son suma de dos cuadrados. Probaremos que, si  $p$  es un primo impar, entonces  $p = x^2 + y^2$  si y sólo si  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

- I. Sea  $p$  primo impar tal que  $p$  se escribe como suma de dos cuadrados. Probar que  $-1$  es un cuadrado módulo  $p$ . Concluir que  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .
- II. Sea  $p$  primo impar,  $p \equiv 1 \pmod{4}$ . Tomar  $n \in \mathbb{Z}$  tal que  $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$ . Como  $p|n^2 + 1$  en  $\mathbb{Z}$ , tenemos que  $p|(n+i)(n-i)$  en  $\mathbb{Z}[i]$ . Probar que  $p$  no es primo de  $\mathbb{Z}[i]$  y, por lo tanto, es reducible.
- III. Sabiendo que  $p = \alpha\bar{\alpha}$ ,  $\alpha, \bar{\alpha} \in \mathbb{Z}[i]$  no unidades, concluir que  $p$  es suma de dos cuadrados.

Resolución. TBD  $\square$

**Ejercicio.** Caracterización de los irreducibles de  $\mathbb{Z}[i]$ .

- I. Probar que  $2 = (-i)(1+i)^2$  y que  $1+i$  es irreducible.
- II. Sea  $p \equiv 3 \pmod{4}$ . Probar que  $p = x^2 + y^2$  no tiene soluciones en  $\mathbb{Z}$ . Concluir que  $p$  es irreducible en  $\mathbb{Z}[i]$ .
- III. Utilizar el ejercicio anterior para probar que, si  $p \equiv 1 \pmod{4}$ , entonces  $p$  se factoriza en  $\mathbb{Z}[i]$  como producto de dos irreducibles no asociados.
- IV. Probar que, si  $\pi$  es un irreducible de  $\mathbb{Z}[i]$ , entonces  $\pi$  es asociado a alguno de los irreducibles mencionados en los ítems anteriores (sug.: si  $\pi$  es irreducible, existe un primo  $p \in \mathbb{Z}$  tal que  $p|N(\pi) = \pi\bar{\pi}$  y usar factorización única).

Resolución. TBD  $\square$

**Ejercicio.** Factorizar como producto de irreducibles los elementos  $7 + 4i$  y  $23 + 14i$  en  $\mathbb{Z}[i]$ .

Resolución. Inmediato usando SageMath ☺:

```
sage: K.<i> = QuadraticField(-1)
sage: factor(7 - 4*i)
(i) * (-i - 2) * (2*i + 3)
sage: factor(23+14*i)
(-i - 2)^2 * (-2*i + 5)
```

$\square$