

Department of Statistics, National Taipei University
Instructor: Yi-Ting Hwang

本研究目的在探討經皮穴位神經電刺激介入對於改善大腸激躁症患者排便症狀與生活品質之成效，變數與其類別定義：

- 組別：試驗組 (1) 與對照組 (0)
- 性別：男 (1) 與女 (0)
- 婚姻：未婚 (0)、已婚 (1)、離婚 (2)、同居 (3)、分居 (4)、喪偶 (5)
- 教育程度：不識字 (0)、小學 (1)、國(初)中 (2)、高中 (3)、專科 (4)、大學 (5)、研究所(含)以上 (6)
- 宗教：無 (0) 與 有 (1)
- 家中是否有大腸激躁症的病史：無 (0)、父母 (1)、兄弟姐妹 (2)、其他 (3)
- 慢性病史與慢性病：無 (0) 與 有 (1)
- 大腸激躁症罹病時間：6個月 (0)、6個月-1年 (1)、1年 - 2年 (2)、'2年 - 3年' (3)、'3年 - 5年' (4)、'5年 - 10年' (5)、'>10年' (6)
- 排便情況：便秘型 (0)、腹瀉型 (1)、混和型 (2)、未分類型 (3)
- 治療方式：無 (0) 與 有 (1)
- 有接受治療：中醫 (0)、西醫 (1)、中西醫合併 (2)、其他 (3)
- 台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷 WHO1-WHO28
 - 生理：3, 4, 10, 15, 16, 17, 18
 - 心理：5, 6, 7, 11, 19, 26
 - 社會：20, 21, 22, 27
 - 環境：8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 28
 - 整體：1 – 28

計算分項平均值。

每個個案有四筆資料，分別是介入前、第二週、第四週與第八週。

執行工作：

1. 將婚姻狀況變成兩類，未婚與已婚。
2. 將教育程度變成兩類，高中（含）以下與專科（含）以上。
3. 將家中是否有大腸激躁症的病史變成一個變數。
4. 將慢性病變成一個變數。

5. 將大腸激躁症罹病時間變成兩類，10 年以下與超過 10 年。
6. 將排便情況變成兩類，便秘型與其他。
7. 有接受治療為複選，將其分開為獨立選項。
8. 除計算 WHO 變數與編號，計算該樣本基本變數（未合併）的敘述統計，其中，大腸激躁症與慢性病彙整成一個變數，並使用處理後有接受治療的變數，利用 PROC REPORT 輸出表格。
9. 分組別，計算兩類婚姻、教育程度、罹病時間與排便情況的敘述統計，並提供組別與基本變數的顯著性，利用 PROC REPORT 輸出表格，利用 ACROSS，將列為變數，分組的資料設定為欄，最後一欄為顯著性。
10. 分組別與周別，計算五個面向的生活品質的敘述統計以及關聯性，利用 PROC REPORT 輸出表格，利用 ACROSS，將列為變數，分組的資料設定為欄，最後一欄為顯著性。
11. 畫出五個面向四個時間的矩陣散布圖。

將程式及結果 8-10. 分別存成 sp_hw12_id.sas 與 sp_hw12_id.doc.