

설명편차에서 R^2 까지 · 평균 예측과 회귀 예측 비교

회귀분석의 이해 · W05A 별도 보강자료 · 2026년 9월 28일

이 자료의 목표는 공식을 외우는 것이 아니라, 세 제공함이 무엇을 비교하는지 말로 설명하는 것입니다. 지난 단순회귀에서 배운 내용을 다시 연결합니다. 먼저 1~5절을 읽고, 계산을 확인할 때 6~8절로 돌아오세요. 마지막 선택 보충은 증명이 궁금할 때 읽습니다.

[온라인 R 실습](#) · [Colab A: 편차와 \$R^2\$](#) · [직접 조작하는 웹 앱](#) · [본 강의노트](#)

1. 출발점: 설명변수 없이 예측한다면?

네 관측값이 2, 4, 4, 6이라고 합시다. 아직 x 를 사용할 수 없다면 모든 관측을 같은 숫자로 예측해야 합니다. 제곱오차의 합을 가장 작게 만드는 일정한 숫자는 표본평균 4입니다. 이 평균 예측을 앞으로 비교의 **기준선**으로 사용합니다.

여기서 '변동이 크다'는 것은 관측값들이 기준인 평균에서 멀리 흩어져 있다는 뜻입니다. 평균이 4라는 사실만으로 네 관측을 정확히 맞히지는 못합니다. 실제값이 2인 점과 6인 점에는 각각 2만큼의 거리가 남습니다.




그림 B1. 점은 바꾸지 않고 예측 규칙만 정합니다. 회색 선은 네 점 모두에 같은 예측값 4를 줍니다. 회색 세로 선은 실제값과 평균 예측 사이의 차이입니다. 수업용 합성 자료로 직접 계산·제작했습니다.

관측 번호	x	실제 y	평균으로 예측	실제 - 평균
1	1	2	4	-2
2	2	4	4	0
3	3	4	4	0
4	4	6	4	2

차이를 그냥 더하면 $-2+0+0+2=0$ 이 되어, 틀린 예측들이 서로 상쇄됩니다. 따라서 이 수업에서는 차이를 **제곱해서 더한 값을** 예측 규칙의 손실로 사용합니다. 절댓값도 다른 손실이 될 수 있지만, 최소제곱 회귀의 기준은 제곱입니다.

$$(-2)^2 + 0^2 + 0^2 + 2^2 = 8.$$

B1 · 말로 확인: 평균 예측의 오차를 그냥 더한 값이 0이면, 네 점을 모두 맞혔다고 할 수 있을까요? 상쇄되는 두 관측을 짝지어 설명하세요.

2. x를 알면 예측값을 다르게 줄 수 있다

이제 $x=1,2,3,4$ 를 함께 사용합니다. 이 네 점에 최소제곱으로 적합한 직선은 다음과 같습니다.

$$\hat{y} = 1 + 1.2x.$$

평균 예측은 모든 사람에게 같은 숫자 4를 주지만, 회귀 예측은 x 에 따라 2.2, 3.4, 4.6, 5.8을 줍니다. 실제 관측은 그대로입니다. **바뀐 것은 예측 규칙**입니다.




그림 B2. 왼쪽과 오른쪽의 관측점과 축 범위는 같습니다. 오른쪽의 청록 선이 회귀 예측이고, 붉은 세로선이 예측 후 남은 잔차입니다. 그림을 비교할 때 먼저 ‘점이 바뀌었는가, 예측이 바뀌었는가’를 확인하세요.

관측	실제 y	회귀 예측	잔차: 실제 - 예측	잔차의 제곱
1	2	2.2	-0.2	0.04
2	4	3.4	0.6	0.36
3	4	4.6	-0.6	0.36
4	6	5.8	0.2	0.04
합			0	0.8

평균 예측의 제곱오차 합은 8, 회귀 예측의 제곱오차 합은 0.8입니다. 전체 손실은 줄었습니다. 그러나 두 번째 점은 평균으로 정확히 맞혔는데, 회귀식으로 예측하면 0.6만큼 틀립니다. **전체적으로 좋아지는 것과 모든 점이 좋아지는 것은 다릅니다.**

3. 설명편차는 '모형이 평균에서 움직인 양'이다

세 위치를 먼저 구별합니다. 평균은 비교 기준, 적합값은 모형의 예측, 관측값은 실제 결과입니다. 어떤 편차인지 알려면 **어디에서 어디로 가는지**를 말해야 합니다.

이름	출발 → 도착	식	말로 읽기
총편차	평균 → 실제	$y_i - \bar{y}$	평균 예측에서 실제값까지의 차이
설명편차	평균 → 회귀 예측	$\hat{y}_i - \bar{y}$	x를 써서 예측을 평균에서 이동시킨 양
잔차	회귀 예측 → 실제	$y_i - \hat{y}_i$	예측한 뒤에도 남은 차이

'설명했다'는 말은 이 모형의 예측이 평균 기준 변동을 얼마나 반영하는지에 관한 표현입니다. 원인을 밝혔다는 뜻은 아닙니다. 설명편차는 양수일 수도, 음수일 수도, 0일 수도 있습니다.




그림 B3. 관측4에서는 평균4 → 예측5.8 → 실제6으로 이동합니다. 관측2에서는 평균4 → 예측3.4로 내려갔다가 실제4로 올라옵니다. 두 경우 모두 화살표의 **부호 있는 이동량**이 더해집니다. 색뿐 아니라 출발·도착과 수치도 함께 읽으세요.

관측4는 다음처럼 읽습니다.

$$6 - 4 = (5.8 - 4) + (6 - 5.8), \quad 2 = 1.8 + 0.2.$$

관측2는 다음과 같습니다.

$$4 - 4 = (3.4 - 4) + (4 - 3.4), \quad 0 = -0.6 + 0.6.$$

설명편차 -0.6 은 '오차를 0.6 줄였다'는 뜻이 아닙니다. **예측값을 평균보다 0.6 낮게 잡았다**는 뜻입니다. 이 점에서는 오히려 평균 예측보다 오차가 커졌습니다.

B2 · 그림 설명: 관측2의 설명편차와 잔차는 왜 서로 반대 부호일까요? '평균', '예측', '실제' 세 단어를 모두 사용하세요.

4. 교재 그림으로 돌아가기




그림 B4. 『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』 3.9절, p.119, 그림3.7 원본 발췌. 교수자 지시에 따라 필요한 그림을 직접 사용했습니다. 먼저 아래 평균선, 다음 회귀직선 위의 적합값, 마지막 위쪽 관측점을 찾으세요. 교재의 기울기가 음수라는 사실과 이 관측점의 잔차가 양수라는 사실은 서로 다른 이야기입니다.

읽는 순서는 **평균에서 예측으로**, 그다음 **예측에서 실제로**입니다. 어느 방향으로 움직이는지를 구별하면 기호의 뺄셈 순서를 외울 필요가 줄어듭니다. 교재 그림은 한 점의 관계를 보여 주고, 앞의 네 점 예제는 이를 모든 관측에 적용한 것입니다.

$$\underbrace{y_i - \bar{y}}_{\text{총편차}} = \underbrace{\hat{y}_i - \bar{y}}_{\text{설명편차}} + \underbrace{y_i - \hat{y}_i}_{\text{잔차}}$$

이 등식은 단순한 이동 경로의 합입니다. 이를 각 점에서 제공하면 교차항이 생깁니다. 아직 세 제공의 합이 같다고 말하면 안 됩니다.

5. 세 제공합에 이름 붙이기

이제 이미 계산한 양에 SST, SSE라는 이름을 붙입니다. SSR은 설명편차들의 제공합입니다. 여기서 R은 회귀(regression), E는 오차(error)를 나타냅니다. 다른 자료에서 약어가 다르게 쓰이면 반드시 정의를 확인하세요.

$$SST = \sum_i (y_i - \bar{y})^2, \quad SSE = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad SSR = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2.$$

양	이 예제	비교하는 것
SST	8	평균 예측에서 출발한 전체 제공오차
SSE	0.8	회귀 예측 뒤에도 남은 제공오차
SSR	7.2	모형의 예측이 평균에서 달라진 정도의 제공합




그림 B5. 위쪽은 각 점의 평균 제공오차와 회귀 제공오차입니다. 2,3번에서는 회귀 쪽이 더 큼니다. 아래쪽은 전체 합으로, 8에서 0.8로 줄어듭니다. 따라서 개선은 각 점을 따로 평가한 결과와 전체 합을 구별해야 합니다.

같은 자료에 **절편을 포함한 비가중 최소제곱 회귀**를 적합하면 다음 관계가 성립합니다.

$$SST = SSR + SSE, \quad 8 = 7.2 + 0.8.$$

이 조건에서는 SSR이 전체 제공오차의 감소량 $SST - SSE$ 와 같습니다. 설명편차 자체가 각 점의 오차 감소량이라는 뜻은 아닙니다. 정규분포 가정은 이 대수적 분해 자체에 필요하지 않습니다.

6. 네 점을 한 번에 검산하기

i	총편차	설명편차	잔차	총편차 ²	설명편차 ²	잔차 ²
1	-2	-1.8	-0.2	4	3.24	0.04
2	0	-0.6	0.6	0	0.36	0.36
3	0	0.6	-0.6	0	0.36	0.36
4	2	1.8	0.2	4	3.24	0.04
합	0	0	0	8	7.2	0.8

각 행에서는 총편차=설명편차+잔차입니다. 그러나 첫 행의 제곱은 4이고, 오른쪽 제곱 둘을 더하면 3.28입니다. **행별 제곱 분해는 성립하지 않습니다.** 제곱합의 분해는 모든 행을 합친 뒤 성립합니다.

수계산과 같은 의미를 R로 옮기면 다음과 같습니다. fitted()는 이미 적합된 모형의 예측값을 읽고, residuals()는 실제값에서 그 예측값을 뺀 잔차를 읽습니다.

```
d <- data.frame(x=1:4, y=c(2,4,4,6))
fit <- lm(y ~ x, data=d)
SST <- sum((d$y - mean(d$y))^2)
SSE <- sum(residuals(fit)^2)
SSR <- sum((fitted(fit) - mean(d$y))^2)
c(SST=SST, SSR=SSR, SSE=SSE)
```

B3 · 계산 점검: 관측2 한 행에서 '총편차²=설명편차²+잔차²'를 계산해 보세요. 왜 전체 합이 관계와 혼동하면 안 될까요?

7. R²는 평균 예측 대비 얼마나 줄었는가?

8만큼 있던 제곱오차 중 7.2가 줄고 0.8이 남았습니다. 감소량을 원래 값으로 나누면 0.9입니다.

$$R^2 = \frac{SST - SSE}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} = \frac{SSR}{SST} = 0.9.$$




그림 B6. 막대 하나의 전체 길이가 평균 예측의 손실8입니다. 회귀 예측은 그중 0.8을 남겼습니다. 이 그림은 **총합 수준의 분해**이며 각 관측에서 같은 비율로 오차가 감소했다는 뜻은 아닙니다.

이 예제의 올바른 설명은 다음과 같습니다.

이 네 관측을 적합하는 데 사용한 절편 포함 회귀모형은 평균만으로 예측했을 때보다 총 제곱오차를 90% 줄였습니다.

'네 관측 중 90%를 정확히 맞췄다', '각 점의 오차를 90% 줄였다', 'x가 y의 원인 중 90%를 차지한다', '새 자료도 90% 맞힌다'는 설명은 모두 다른 주장입니다.

SST가 0이면 모든 y가 같으므로 이 비율의 분모가 0입니다. 이때 이 정의의 R²는 정의되지 않습니다. 절편 없는 회귀의 R 기본 출력은 0 기준 분모를 사용할 수 있으므로 평균 기준 R²와 그대로 비교하지 않습니다.

8. 크기보다 기준을 먼저 확인하기

상황	확인할 것
평균만 사용하는 모형	평균 기준 $SSE=SST$ 이므로 $R^2=0$
같은 관측을 완벽하게 적합	$SSE=0$ 이고 $SST>0$ 이면 $R^2=1$
아무렇게나 정한 예측값	SSE 가 SST 보다 크면 평균 기준 점수는 음수 가능
다른 표본·시험 자료	학습 표본에서의 분해 성질을 그대로 전용하지 않기
설명변수를 추가한 중첩 모형	같은 행·같은 y -절편 포함 OLS라면 학습 SSE 는 증가하지 않음

높은 R^2 하나로 선형성·잔차 구조·자료 범위·인과성을 판단할 수 없습니다. 다음 강의에서는 변수 두 개로 예측값을 만들더라도 **평균과 비교한다는 기준은 그대로** 유지됩니다.

B4 · 해석 점검: “ $R^2=0.9$ 이므로 앞으로 나올 관측 10개 중 9개를 정확히 맞힌다.”에서 틀린 부분을 고치세요. 표본과 손실의 기준을 모두 포함하세요.

9. 웹 앱에서 직접 확인하기

[누적 앱 편집기](#)를 열고 **편차와 R^2** 탭을 선택합니다.

1. 관측4를 선택해 평균4 → 예측5.8 → 실제6의 순서로 읽습니다.
2. 관측2로 바꾸어 설명편차와 잔차의 부호를 비교합니다.
3. 평균 예측과 회귀 예측의 화면을 바꾸어 점은 같은지 확인합니다.
4. 후보 절편·기울기를 바꾸어 SSE 를 관찰한 뒤 최소제곱 값으로 되돌립니다.

B5 · 앱 기록: 평균 예측보다 개별 오차가 커진 점 하나를 찾고, 그럼에도 전체 SSE 가 줄어든 이유를 두 문장으로 적으세요. 자세한 코드 수정 활동은 온라인 R 실습에 있습니다.

선택 보충: 교차항은 왜 합치면 사라질까?

이 부분은 앞의 그림과 해석을 이해한 뒤 읽어도 됩니다. $a_i = \hat{y}_i - \bar{y}$, $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 라고 쓰면 다음과 같습니다.

$$\sum_i (a_i + e_i)^2 = \sum_i a_i^2 + \sum_i e_i^2 + 2 \sum_i a_i e_i.$$

절편 포함 최소제곱의 잔차는 설계행렬의 각 열과 직교합니다. 따라서 잔차합은 0이고, 적합값과 잔차의 내적도 0입니다. 그래서 $\sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})e_i = 0$ 이 됩니다. 임의로 그린 직선에는 이 성질이 보장되지 않습니다.

네 점의 교차항은 0.72, -0.72, -0.72, 0.72로 합이 0입니다. 한 점의 등식에서 교차항을 지우는 것이 아니라 **합에서 상쇄됨을 확인**하는 것입니다.

참고와 자료 구분

- 주교재 3.9, pp.117–121, 식3.44–3.47 및 그림3.7을 기준으로 용어와 관계를 설명했습니다. 그림3.7은 원본 발췌, 나머지는 독립 제작입니다.

- [R 공식 summary.lm](#): R^2 의 기준과 잔차분산. [lm](#): 최소제곱 적합과 절편. 2026-09-28 확인.
- 네 점은 수업용 합성 자료입니다. 실제 조사 자료나 새로운 실험 결과로 해석하지 않습니다. 방향 화살표·단계적 비교·오해 점검은 수업을 위해 추가한 설명입니다.