

W06A A · 좋은 적합과 믿을 만한 모형은 어떻게 다른가?

회귀분석의 이해 · 2026년 10월 5일 · 6주차 1차시

주교재 『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』 §5.1–5.2, §5.4(pp.188–191, 194–197). 이번 수업 전체 범위는 §5.1–5.6입니다.

[온라인 R](#) · [B: 다양한 잔차](#) · [C: 그래프 선택](#) · [비교 기록지](#)

1. 오늘의 질문: 회귀식이 놓친 것은 무엇인가?

지난 시간에는 회귀계수로 조건부 차이를 읽고, 표준오차와 t/F 통계량으로 불확실성을 설명했습니다. 오늘은 그 계산을 믿기 위해 무엇을 확인해야 하는가를 묻습니다. 진단은 모형에 합격 도장을 찍는 과정이 아닙니다. 관측된 자료와 우리가 가정한 자료 생성 방식 사이의 불일치를 찾아, 다음 확인을 정하는 과정입니다.

세 용어부터 연결합니다. 관측값은 실제 자료에 적힌 값, 적합값은 추정된 회귀식이 그 조건에서 내놓는 값, 잔차는 둘의 차이입니다. 계수의 표준오차는 계수 추정의 흔들림이고, 잔차는 한 관측에서 남은 차이입니다. 서로 대체할 수 없습니다.

$$e_i = y_i - \hat{y}_i.$$

R^2 는 평균만 예측하는 기준과 비교해 표본의 제곱합을 얼마나 줄였는지 요약합니다. 높은 R^2 가 평균함수의 형태, 오차의 일정한 분산, 독립성, 관측의 신뢰성까지 모두 보증하지는 않습니다. 작은 p값도 모형 가정을 대신 점검해 주지 않습니다.

2. 숫자를 먼저, 그림을 나중에: Anscombe

다음은 R 내장 Anscombe 네 자료에 직선을 적합한 결과입니다. 설명을 위해 구성된 자료이며 네 개의 실제 조사 사례가 아닙니다.

자료	절편(약)	기울기(약)	R^2 (약)
1	3.000	0.500	0.66654
2	3.001	0.500	0.66624
3	3.002	0.500	0.66632
4	3.002	0.500	0.66671

표의 값은 매우 비슷합니다. 반올림된 데이터라서 컴퓨터 출력의 마지막 자리까지 완전히 같지는 않습니다. 이제 네 그림의 축 범위를 같게 두고 점의 배치를 봅니다.







그림 A1 · 보는 순서. 먼저 2번에서 직선 위·아래로 점이 바뀌는 곡선을 보세요. 다음으로 3번에서 대부분의 점과 다른 한 점, 4번에서 X가 같은 위치에 몰린 점들을 보세요. 요약통계는 비슷하지만 모형을 검토할 이유가 서로 다릅니다. 1번도 그림 한 장만으로 모든 가정이 확인된 것은 아닙니다.




그림 5.1 최소제곱적합선과 산점도: Ancombe's Quartet

교재 연결. 주교재 그림5.1, p.195의 선별 그림입니다. 위 재현 그림은 비교를 위해 네 패널의 축을 동일하게 맞췄습니다. 그림을 보는 목적은 '이상한 점을 지우기'가 아니라 데이터 구조와 직선 모형의 관계를 질문하는 것입니다.

E1 · 설명하기. " R^2 가 같으므로 네 자료에 같은 해석을 해도 된다"는 주장에 그림의 구체적인 근거 두 가지로 답하세요.

3. 가정의 대상부터 구별하기

주교재의 가정은 모형, 오차, 예측변수, 관측개체에 대한 조건으로 나누어 읽을 수 있습니다. 무엇이 정규분포여야 하는지, 무엇이 독립이어야 하는지를 먼저 명시해야 합니다.




그림 A2. 왼쪽 위는 평균을 설명하는 식, 오른쪽 위는 그 평균 주위의 오차, 왼쪽 아래는 설명변수 정보, 오른쪽 아래는 자료가 만들어진 과정을 뜻합니다. 서로 다른 상자에 대한 주장을 혼합하지 마세요.

$$Y = X\beta + \varepsilon, \quad E(\varepsilon | X) = 0.$$

이 식은 X 가 주어졌을 때 Y 의 평균이 $X\beta$ 라는 뜻입니다. 여기서 ‘선형’은 **모수 β 에 대해 선형**이라는 뜻입니다. 예를 들어 x^2 를 별도의 설명변수로 넣은 평균함수도 β 에 대해서는 선형일 수 있습니다. 다만 이번 핵심 실습은 기존의 두 변수 직선 평균모형을 진단하는 데 돕니다.

대상	확인할 조건	잘못 바꾸어 읽기 쉬운 주장
평균함수	설명변수 조건에 따른 평균을 적절하게 표현하는가?	점들이 완벽한 직선 위에 있어야 한다
오차 평균	각 X 조건에서 평균 오차가 0인가?	전체 잔차 평균이 0이면 충분하다
오차 분산	X 조건이 달라도 오차 규모가 일정한가?	Y 전체의 분산이 작아야 한다
오차 의존	서로 다른 관측의 오차가 의존하지 않는가?	적합 후 잔차들이 정확히 독립이다
오차 정규성	주어진 X 에서 오차의 정규분포 가정이 적절한가?	X 또는 Y 자체가 정규분포여야 한다
설계와 측정	완전한 선형종속이 없는가, X 의 측정은 신뢰할 만한가?	설명변수끼리 조금이라도 상관되면 안 된다
관측 단위	한 행의 의미, 수집·누락·반복 측정은 무엇인가?	행번호가 곧 시간 순서이다

X 를 주어진 것으로 다루는 조건부 설명은 매번 X 가 실험자가 정한 상수라는 뜻만은 아닙니다. 관측 자료에서도 X 를 조건으로 추정 성질을 기술할 수 있습니다. X 의 측정오차나 선택 방식이 조건부 오차 평균과 연결되면 별도의 문제가 생길 수 있으므로 자료 수집 맥락을 함께 읽습니다.

4. 어느 가정이 어느 결과를 지탱하는가?

모든 가정을 한 묶음으로 외우면 ‘정규성이 없으니 회귀계수는 무조건 틀렸다’와 같은 오해가 생깁니다. 이번에는 결과를 세 단계로 구별합니다.

알고 싶은 결과	이 수업에서 사용하는 주요 조건	가정을 위반하면 검토할 것
OLS 계수의 조건부 불편성	올바른 선형 평균, $E(\epsilon X)=0$, X의 완전 열계수	빠진 평균 구조, 내생성, 측정·선택 과정
선형 불편추정량 중 최소분산 (BLUE)	위 조건에 $Cov(\epsilon X)=\sigma^2 I$ 추가	등분산·무상관 조건과 효율성
통상적 소표본 t/F의 정확한 분포	위 조건에 조건부 정규오차 추가	표준오차·검정·구간의 근거

등분산 위반만으로 계수의 편향을 단정할 수 없습니다. 반대로 계수의 불편성이 성립한다고 해서 통상적인 표준오차와 검정이 그대로 적절하다는 뜻도 아닙니다. ‘계수’, ‘표준오차’, ‘정확한 분포’가 각각 어떤 근거를 쓰는지 구별하세요.

E2 · 분류하기. “등분산을 의심할 패턴이 보이면 OLS 계수는 반드시 편향된다”는 주장에 답하세요. 무엇이 유 지될 수 있고 무엇이 재검토해야 하나요?

5. 오차와 잔차를 같은 것으로 보지 않기

오차는 관측값과 알 수 없는 참 조건부 평균 사이의 차이입니다. 잔차는 관측값과 자료로 추정한 평균 사이의 차이입니다. 같은 관측값을 출발점으로 삼아도 기준선이 다릅니다.

$$\epsilon_i = y_i - x_i^T \beta, \quad e_i = y_i - x_i^T \hat{\beta}.$$

Error: unknown true mean | Residual: fitted mean




그림 A3. 파란 선은 모의실험에서만 알고 있는 참 평균, 회색 점선은 이 여섯 점으로 적합한 평균입니다. 강조한 점에서 어느 선까지 내려가는지 보세요. 실제 attitude 자료에서는 참 평균선을 알 수 없기 때문에 오차 대신 잔차를 단서로 사용합니다.

절편을 포함한 비가중 OLS에서는 잔차합이 0이 됩니다. 이것은 최소제곱이 만족시키는 대수적 조건입니다. **계산 결과 잔차합이 0인 것과, 자료 생성 과정에서 $E(\epsilon|X)=0$ 인 것은 다른 주장입니다.** B에서 곡선 관계를 직선으로 잘못 적합해도 잔차합이 0임을 직접 확인합니다.

E3 · 구별하기. 실제 자료에서 오차를 직접 구할 수 없는 이유와, 잔차합0을 가정 충족의 증거로 사용할 수 없는 이유를 각각 한 문장으로 쓰세요.

6. 진단의 순서




그림 A4. 먼저 단위·분포·관계를 읽고, 어떤 모형을 적합했는지 밝힌 뒤, 남은 차이를 관찰합니다. 이상 패턴이 보이면 자료의 정의와 수집 과정으로 돌아갈 수 있습니다. 이 순서는 'R²를 최대화할 때까지 임의로 바꾸기'와 다릅니다.

오늘의 세 자료는 역할이 다릅니다. Anscombe는 요약과 그림의 차이, Hamilton은 쌍별 관계와 결합 관계의 차이, attitude는 같은 부서의 여러 잔차 정의를 보여줍니다. 이후 본문 B에서 한 부서의 숫자를 끝까지 계산합니다.

자료 근거: 주교재 §5.1–5.2·5.4. [R Anscombe 공식 설명](#), [R attitude 공식 설명](#). 가정과 추정 성질을 연결한 표·모의 도식은 이해를 위한 추가 설명입니다.