

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

湖南大学课程考试试卷

课程名称：线性代数 A；课程编码：GE03003；试卷编号：A；考试时间：120 分钟

姓名：_____；学号：_____；专业班级：_____。

1. (8 分) 设 $f(x) = x^2 - x - 1$ ，对于 n 阶方阵 A ，定义 $f(A) = A^2 - A - E$ ，其中

E 为 n 阶单位矩阵，若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ，求 $f(A)$ 。

解

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 8 & 9 & 6 \\ 12 & 14 & 8 \\ 12 & 15 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ 10 & 11 & 6 \\ 9 & 12 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. (8 分) 求下列行列式的值：

$$D_5 = \begin{vmatrix} a^4 & (a-1)^4 & (a-2)^4 & (a-3)^4 & (a-4)^4 \\ a^3 & (a-1)^3 & (a-2)^3 & (a-3)^3 & (a-4)^3 \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & (a-3)^2 & (a-4)^2 \\ a & a-1 & a-2 & a-3 & a-4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

解 先 1, 5 两行互换, 2, 4 两行互换, 再 1, 5 两列互换, 2, 4 两列互换:

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a-1 & a-2 & a-3 & a-4 \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & (a-3)^2 & (a-4)^2 \\ a^3 & (a-1)^3 & (a-2)^4 & (a-3)^3 & (a-4)^3 \\ a^4 & (a-1)^4 & (a-2)^4 & (a-3)^4 & (a-4)^4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a-4 & a-3 & a-2 & a-1 & a \\ (a-4)^2 & (a-3)^2 & (a-2)^2 & (a-1)^2 & a^2 \\ (a-4)^3 & (a-3)^3 & (a-2)^4 & (a-1)^3 & a^3 \\ (a-4)^4 & (a-3)^4 & (a-2)^4 & (a-1)^4 & a^4 \end{vmatrix}$$

$$= 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! = 288.$$

注: 也可只换行, 不换列, 再直接用范德蒙行列式的结论, 答案对即可.

3. (10 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -2 \\ -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 6 & -4 \\ -5 & 3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$, 且 $AX = B$, 求矩阵 X .

解 相当于解两个方程组 $AX_1 = b_1, AX_2 = b_2$.

$$(A, B) = \left(\begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \\ 3 & -1 & 9 & -5 \end{pmatrix} \right) \rightarrow \cdots \rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right),$$

所以
$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. (10 分) 设有分块矩阵 $P = \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$, 其中 A, B 皆为可逆矩阵, 求 P^{-1} .

解法 1 设 $P^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$,

由 $PP^{-1} = \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$

得 $AX_3 = E, BX_1 + CX_3 = O, AX_4 = O, BX_2 + CX_4 = E,$

则 $X_1 = -B^{-1}CA^{-1}, X_2 = B^{-1}, X_3 = A^{-1}, X_4 = O.$

故 $P^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$

法 2 $(P \mid E) = \left(\begin{array}{cc|cc} O & A & E & O \\ B & C & O & E \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} B & C & O & E \\ O & A & E & O \end{array} \right)$
 $\rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} E & B^{-1}C & O & B^{-1} \\ O & E & A^{-1} & O \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} E & O & -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ O & E & A^{-1} & O \end{array} \right),$

故 $P^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$

5. (10 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (0, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (3, 0, 1, 2)^T, \alpha_3 = (2, 3, 0, 1)^T,$

$\alpha_4 = (2, 1, 1, 2)^T, \alpha_5 = (0, -2, 1, 1)^T$, 求该向量组的秩并求一个极大无关组.

解 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -6 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

故该向量组的秩为 3, 极大无关组可取为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

6. (12 分) 已知 R^2 的两组基 α_1, α_2 与 e_1, e_2 , 求一个非零向量 $\beta \in R^2$, 使得 β 关于这两组基有相同的坐标, 并求 β 关于第三组基 ξ_1, ξ_2 的坐标, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}; e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解 设 β 关于两组基 α_1, α_2 与 e_1, e_2 的坐标为 $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$,

则
$$\beta = A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix},$$

于是
$$(A - E) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

而
$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故
$$\beta = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5k \\ k \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}, k \in R.$$

设从基 e_1, e_2 到基 ξ_1, ξ_2 的过渡矩阵为 C , 则

$$(\xi_1, \xi_2) = (e_1, e_2)C \Rightarrow C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 β 关于第三组基 ξ_1, ξ_2 的坐标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot k \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} = k \cdot \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

7. (12 分) p, t 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t \end{cases}$$
 无解、有唯一解

或有无穷多解? 并在有无穷多解时写出方程组的通解.

$$\text{解 } (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & p & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & t \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & p+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t+2 \end{pmatrix},$$

若 $t+2 \neq 0$ 即 $t \neq -2$ 时, $r(A, b) \neq r(A)$, 原方程组无解;

若 $t+2=0$ 且 $p+8=0$ 即 $t=-2, p=-8$ 时, $r(A, b) = r(A) = 2 < 4$, 此时方程组有无穷多解, x_3, x_4 为自由未知量, 通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in R;$$

若 $t+2=0$ 且 $p+8 \neq 0$ 即 $t=-2, p \neq -8$ 时, $r(A, b) = r(A) = 3 < 4$, 且

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & p & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & t \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时方程组有无穷多解, x_4 为自由未知量, 通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k \in R.$$

8. (10 分) 设矩阵 A, B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$

(1) 求 x, y 的值; (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解 (1) 因为矩阵 A, B 相似, 则 A, B 有相同的特征多项式, 即

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B| \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda+2 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda-x & -2 \\ -3 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-y \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \cdots \Rightarrow x=0, y=-2.$$

(2) 由(1)知 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 且 A 的特征值分别为

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2.$$

对于特征值 $\lambda_1 = -1$, 解方程组 $(\lambda_1 E - A)x = 0$ 得特征向量

$$\alpha_1 = (0, 2, -1)^T;$$

对于特征值 $\lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$, 分别得特征向量

$$\alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, -1)^T.$$

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = B$.

9. (12 分) 已知二次型 $f = x^T Ax = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 其中 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(1) 求 a, b 的值; (2) 求正交变换 $x = Py$, 将二次型 f 化为标准形.

解 (1) 因 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $\text{tr}A = a + 2 - 2 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \Rightarrow a = 1$.

又 $|A| = \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -12 \Rightarrow b^2 = 4$. 再由 $b > 0$ 得 $b = 2$.

(2) 因为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 令 $|\lambda E - A| = 0$ 得 A 的 3 个特征值分别为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -3.$$

对于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 得特征向量 $\alpha_1 = (2, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$,

正交化单位化得 $\varepsilon_1 = (\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}})^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$.

对于特征值 $\lambda_3 = -3$, 得特征向量 $\alpha_3 = (1, 0, -2)^T$, 单位化得 $\varepsilon_3 = (\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{5}})^T$.

令 $P = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 则正交变换 $x = Py$ 将二次型 f 化为标准形

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2.$$

10. (8 分) 设 A 为 n 阶实方阵, 利用二次型证明

(1) $A^T A$ 是半正定矩阵; (2) 若 A 可逆, 则 $A^T A$ 是正定矩阵.

证 (1) 显然 $A^T A$ 是对称矩阵.

对任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in R$, 二次型

$$f = x^T (A^T A) x = (Ax)^T (Ax) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \geq 0,$$

故二次型对应的矩阵 $A^T A$ 是半正定矩阵.

(2) 若 A 可逆, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有唯一解: 零解, 所以对任意非零向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $y = Ax = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \neq 0$,

则 $f = x^T (A^T A) x = (Ax)^T (Ax) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 > 0$,

故此时二次型对应的矩阵 $A^T A$ 是正定矩阵.