

Física › Física Termodinâmica

26 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 1 — Pref. Barra Bonita/SC • AMEOSC • 2025

Toda matéria é formada por minúsculas partículas e, conforme o grau de união entre elas, pode se apresentar em três diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Cada um desses estados possui características específicas - como forma, volume e densidade - que podem ser modificadas com mudanças de temperatura, seja por aquecimento ou resfriamento. Quando uma substância muda de estado, identifique a alternativa CORRETA que corresponda a esse processo.

- A) Apresenta mudanças em suas características macroscópicas, como volume e forma, e também no arranjo das partículas em nível microscópico, sem que ocorra alteração em sua composição.
 - B) Apresenta mudanças em suas características macroscópicas, como volume e forma, e também no arranjo das partículas em nível microscópico, modificando a sua composição.
 - C) Não apresenta mudanças em suas características macroscópicas, como volume e forma, e sim, no arranjo das partículas em nível microscópico, além de modificar a sua composição.
 - D) Apresenta mudanças em suas características macroscópicas, como volume e forma, mas não, no arranjo das partículas em nível microscópico, e nem há alteração em sua composição.
-

Questão 2 — IFSUL-RIO-GRANDENSE • IFSUL • 2025

O chimarrão é uma bebida típica do povo gaúcho. Para que seja apreciado na sua melhor versão, é consenso que a temperatura da água deva estar próxima dos 80 °C. Considere um dia de verão, em que a água se encontra à temperatura ambiente de 28°C, que o volume a ser consumido seja de 1 litro e que a massa específica da água seja 1 g/cm³. Qual quantidade de calor precisa ser fornecida para essa quantidade de água a fim de que atinja a temperatura considerada ideal para o chimarrão?

- A) 5600 cal
- B) 6000 cal
- C) 52000 cal
- D) 56000 cal

Questão 3 — Prefeitura de Itá - SC • AMAUC • 2025

Observe a figura abaixo: Ela representa a curva de aquecimento da água, mostrando as mudanças de estado físico em função do tempo. Identifique os estados físicos da água nos intervalos de tempo I, II e III.

- A) I.sólido e líquido, II.líquido, III.líquido e gasoso.
 - B) I.sólido, II.sólido e líquido, III.líquido.
 - C) I.líquido, II.sólido; III.gasoso.
 - D) I.gasoso, II.líquido; III.sólido.
 - E) I.sólido, II.líquido, III.gasoso.
-

Questão 4 — Pref. Laranjal Paulista/SP • Avança SP • 2025

Em uma máquina térmica idealizada, o funcionamento depende da troca de energia entre duas fontes térmicas. A condição básica para que essa máquina realize trabalho é:

- A) Receber calor de uma fonte quente e rejeitar calor para uma fonte fria.
 - B) Receber calor de uma fonte fria e rejeitar calor para uma fonte a mesma temperatura.
 - C) Manter as duas fontes à mesma temperatura durante todo o ciclo.
 - D) Transformar integralmente o calor recebido em trabalho útil.
 - E) Impedir qualquer troca de calor com o ambiente externo.
-

Questão 5 — UNIFESSPA • FADESP • 2025

Um estudante deixou 01 grama de H_2O a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ e pressão de 1 atm, para vaporizar. Ele assumiu que há um comportamento de gás ideal no processo. Sabendo que a densidade de H_2O a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ é $0,96\text{ g/cm}^3$ e ΔH_{vap} da água é 2260 J/g , considere os seguintes dados: $R = 0,082\text{ L.atm/mol.K}$; $1\text{ L.atm} = 101,3\text{ J}$; Massas Molares ($H = 1\text{ g/mol}$; $O = 16\text{ g/mol}$). Os valores de q , w , ΔH e ΔU são, respectivamente:

- A) -2260 J ; -2260 J ; $+172\text{ J}$ e -2088 J
- B) -2260 J ; $+2260\text{ J}$; -172 J e -2088 J
- C) $+2260\text{ J}$; -2260 J ; -172 J e -2088 J
- D) $+2260\text{ J}$; -2260 J ; $+172\text{ J}$ e $+2088\text{ J}$
- E) $+2260\text{ J}$; $+2260\text{ J}$; -172 J e $+2088\text{ J}$

Questão 6 — UFCG • SIRGH • 2025

Considere um cilindro de metal homogêneo que é aquecido de uma temperatura inicial T_1 para uma temperatura final T_2 . Considere também que o coeficiente de dilatação linear do material é α e que o coeficiente de dilatação volumétrica é $\beta=3\alpha$. Com base nessas informações, analise as seguintes asserções e determine qual alternativa está CORRETA: I. A dilatação linear do cilindro é diretamente proporcional à variação de temperatura e ao comprimento inicial do cilindro. II. A dilatação volumétrica do cilindro é três vezes a dilatação linear para uma mesma variação de temperatura. III. Se o cilindro é resfriado de T_2 para T_1 , seu volume final será menor que o volume inicial.

- A) Apenas as asserções I e II são verdadeiras.
- B) Apenas as asserções II e III são verdadeiras.
- C) Apenas a asserção III é verdadeira.
- D) As asserções I, II e III são verdadeiras.
- E) Apenas a asserção I é verdadeira.

Questão 7 — Pref. Varginha/SP • Avança SP • 2025

Associe os tipos de processos termodinâmicos aos parâmetros que permanecem constantes em cada caso: 1. Processo isotérmico 2. Processo isobárico 3. Processo isocórico 4. Processo adiabático () Volume () Pressão () Temperatura () Troca de calor

- A) 3, 2, 1, 4
- B) 2, 3, 1, 4
- C) 4, 2, 3, 1
- D) 1, 2, 3, 4
- E) 3, 1, 2, 4

Questão 8 — UNIFESSPA • FADESP • 2025

A entropia está relacionada à desordem de um sistema. Os valores de ΔS relativos a mudanças de fases ilustram muito bem a correlação entre entropia e caos molecular. Quando um sólido se funde, a pressão constante, uma quantidade de calor é absorvida pelo sistema. Dados: $\Delta H^\circ_{\text{fus}} = 6.025 \text{ J/mol}$ e temperatura de fusão do gelo é de 0°C . O valor de $\Delta S^\circ_{\text{fus}}$ relacionado à fusão do gelo em água é:

- A) $-60,2 \text{ J/mol.K}$
- B) $-22,1 \text{ J/mol.K}$
- C) $22,1 \text{ J/mol.K}$
- D) $60,2 \text{ J/mol.K}$
- E) $1,6 \times 10^6 \text{ J/mol.K}$

Questão 9 — UNIFESSPA • FADESP • 2025

Um químico em visita a cidade de Marabá -PA pediu um copo com água em um restaurante local, porém, devido ao forte calor, típico da região, ele solicitou gelo em cubos ao garçom, que adicionou gelo no copo. Naturalmente, o gelo começou a fundir. O químico começou a pensar no processo termodinâmico envolvido em seu copo de água e gelo. De um modo correto, ele concluiu que

- A) a energia livre de Gibbs é igual a zero no processo.
 - B) houve aumento da entalpia e a entropia ficou inalterada.
 - C) houve aumento da entropia e da entalpia do sistema.
 - D) houve diminuição da entropia e da entalpia do sistema.
 - E) ocorreu diminuição da entropia e que a energia livre de Gibbs é menor que zero.
-

Questão 10 — SEED/SP - QM 2021 • VUNESP • 2025

A potência emitida por um corpo através da radiação eletromagnética depende da área A da superfície do corpo, da temperatura T e da constante de Stefan-Boltzmann σ . Considere que a potência irradiada por um metro quadrado da superfície do Sol é de $6,4 \times 10^7 \text{ J.s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ e que o Sol é uma esfera com raio de $7 \times 10^8 \text{ m}$. Nessas condições, a potência total irradiada na superfície do Sol, em Watts, será da ordem de grandeza de

- A) 10^{26}
 - B) 10^{17}
 - C) 10^{35}
 - D) 10^{18}
 - E) 10^{25}
-

Questão 11 — SEED/SP - QM 2021 • VUNESP • 2025

Em um motor à explosão, como em um automóvel movido à etanol ou gasolina, a água, ao passar pelos cilindros do motor, é levada até o radiador, circulando por ele e retornando ao motor novamente. Esse circuito, que tem por objetivo evitar o superaquecimento do motor, é feito mediante o trabalho de uma bomba, que força a circulação da água. Considerando um carro em movimento, uma transferência direta de calor ocorre

- A) do ar para a água.
- B) do radiador para a água.
- C) da água para o motor.
- D) do ar para o radiador.
- E) do radiador para o ar.

Questão 12 — SEED/SP - QM 2021 • VUNESP • 2025

O conceito de calor foi amplamente discutido e teorizado ao longo da História. A teoria do calórico, definida pela primeira vez por Lavoisier, em 1789, surgiu para explicar a diferença de temperatura entre os corpos por meio da concepção de calor como uma substância, como um fluido invisível e imponderável que se transferia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Na teoria, o fluido possuía uma capacidade interna de autorrepulsão, e os materiais tinham distintas capacidades de atrair o calórico. A quantidade total era constante, ou seja, o calórico não poderia ser criado nem destruído. Apesar de sua grande aplicabilidade, a teoria do calórico não explicava alguns fenômenos, como, por exemplo:

- A) as mudanças de estado físico das substâncias.
 - B) o funcionamento da máquina a vapor.
 - C) a sensação térmica ao tocar um objeto frio.
 - D) o aquecimento dos corpos observado em um atrito.
 - E) a transferência de calor através da condução.
-

Questão 13 — Pref. Camaragibe/PE • ADM&TEC • 2024

A Entropia é uma das Leis da Termodinâmica. Assim sendo, a Entropia diminui quando:

- A) Água evapora.
 - B) Gelo derrete.
 - C) Água congela.
 - D) Sai ar de pneu.
-

Questão 14 — Pref. Camaragibe/PE • ADM&TEC • 2024

Qual processo de vaporização ocorre de forma lenta, em qualquer temperatura e pressão?

- A) Evaporação.
- B) Fusão.
- C) Calefação.
- D) Ebulição.

Questão 15 — Pref. Camaçari/BA • CEBRASPE • 2024

Ao se colocar uma panela com água no fogo para esquentar, pode-se observar a propagação de calor por três modos: condução, convecção e irradiação. Porém, se uma pessoa retirar essa panela do fogo e, em seguida, aproximar uma de suas mãos do fundo dessa panela, sem tocá-lo, será possível sentir um aumento de temperatura. Nesse caso, o calor sentido chegará à mão da pessoa por

- A) condução e convecção.
 - B) convecção.
 - C) condução.
 - D) irradiação.
 - E) convecção e irradiação.
-

Questão 16 — IFRS • FUNDATEC • 2024

Considere um conjunto cilindro-pistão a uma pressão inicial de 500 kPa, com volume inicial de $0,5 \text{ m}^3$ e volume final de $0,6 \text{ m}^3$. Qual é o trabalho para o processo de expansão cuja relação entre pressão e volume é dada por $PV^{1,5} = k$?

- A) 22 kJ.
 - B) 44 kJ.
 - C) 88 kJ.
 - D) 122 kJ.
 - E) 222 kJ.
-

Questão 17 — Pref. Machadinho/RS • Instituto 1ª Opção • 2024

Qual é o estado físico da água à pressão atmosférica ao atingir 100°C ?

- A) Líquido.
 - B) Sólido.
 - C) Gasoso.
 - D) Plasma.
-

Questão 18 — Pref. Mato Leitão/RS • OBJETIVA CONCURSOS • 2024

Assinalar a alternativa que corresponda ao processo termodinâmico em que não há troca de calor entre o sistema e a sua vizinhança:

- A) Isocórico.
- B) Adiabático.
- C) Isentrópico.
- D) Isotérmico.

Questão 19 — SERGÁS • IESES • 2024

Considerando o princípio da conservação da energia em sistemas fechados, qual das seguintes afirmações está correta em relação à primeira lei da termodinâmica, aplicável às operações de compressão e expansão de gás natural?

- A) O calor transferido para o sistema é sempre maior do que o trabalho realizado pelo sistema, o que justifica o uso de sistemas de refrigeração adicionais nas unidades de compressão.
 - B) O trabalho realizado sobre o sistema não afeta sua energia interna, o que simplifica o cálculo de eficiência em instalações de gás.
 - C) A energia interna de um sistema permanece constante se não houver transferência de calor ou trabalho, o que é crucial para a manutenção da integridade dos sistemas de compressão de gás natural.
 - D) A energia pode ser criada ou destruída, desde que ocorra transferência de calor, o que exige monitoramento constante em estações de gás natural.
-

Questão 20 — Pref. Machadinho/RS • Instituto 1ª Opção • 2024

Qual é a diferença entre calor específico e temperatura?

- A) Calor específico é uma medida da quantidade de calor transferida, e a temperatura é uma medida da energia térmica.
 - B) Calor específico é uma medida da temperatura, e a temperatura é uma medida da quantidade de calor transferida.
 - C) Ambos se referem à mesma propriedade térmica dos materiais.
 - D) Calor específico e temperatura são independentes um do outro.
-

Questão 21 — Pref. Machadinho/RS • Instituto 1ª Opção • 2024

Como o calor é transferido principalmente em sólidos?

- A) Radiação.
- B) Condução.
- C) Convecção.
- D) Evaporação.

Questão 22 — Pref. Sapucaia do Sul/RS • FUNDATEC • 2023

Um processo no qual nenhuma transferência de calor ocorre é um processo:

- A) Isobárico.
 - B) Isocórico.
 - C) Adiabático.
 - D) Isotérmico.
 - E) Isovolumétrico.
-

Questão 23 — UFCAT • Instituto Verbená UFG • 2023

Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) era físico, matemático e engenheiro francês. Ele é conhecido pela formulação do primeiro modelo teórico sobre as máquinas térmicas, por isso, esse modelo é conhecido como “ciclo de Carnot”. Em um diagrama pressão-volume, um ciclo de Carnot consiste em

- A) dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos.
 - B) dois processos isocóricos e dois processos isobáricos.
 - C) dois processos isotérmicos e dois processos isobáricos.
 - D) dois processos isocóricos e dois processos adiabáticos.
-

Questão 24 — Pref. Barra Bonita/SC • AMEOSC • 2017

“O volume de um gás confinado num sistema fechado, quando submetido a uma temperatura constante, é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele”. É a definição da:

- A) Lei de Dalton.
 - B) Lei de Boyle.
 - C) Lei de Faraday.
 - D) Lei de Gay-Lussac.
-

Questão 25 — UFPA • UFPA • 2017

Sobre os conceitos de calor e temperatura, é correto afirmar:

- A) A temperatura é uma medida da quantidade de calor que um corpo possui.
- B) A temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas de um corpo.
- C) Calor e temperatura representam a mesma grandeza em Física.
- D) Quando um corpo recebe certa quantidade de calor, a sua temperatura sempre aumenta.
- E) Os números que expressam os valores do calor e da temperatura são sempre iguais.

Questão 26 — UFPA • UFPA • 2017

Num experimento de laboratório, uma substância (com calor específico $c = 0,8 \text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$) recebe 40 calorias de calor, em um sistema termicamente isolado. A elevação de temperatura, em $^{\circ}\text{C}$, sofrida pela substância, sabendo-se que a sua massa corresponde $m = 200 \text{ g}$ é

- A) 0,25
- B) 1,00
- C) 1,25
- D) 1,50
- E) 2,00

Comentários IA

Questão 1 Resposta: A

A mudança de estado físico de uma substância, como água para vapor (vaporização), altera suas propriedades macroscópicas (volume, forma) e o arranjo molecular, mas não sua composição química (H₂O continua H₂O).

Questão 2 Resposta: D

O cálculo da quantidade de calor se dá pela fórmula $Q = mc\Delta T$, onde m é a massa, c é o calor específico da água e ΔT a variação de temperatura.

Questão 3 Resposta: E

Na curva de aquecimento da água, o intervalo I representa o estado sólido (antes da fusão), o intervalo II, o estado líquido (após a fusão e antes da vaporização), e o intervalo III, o estado gasoso (após a vaporização).

Questão 4 Resposta: A

Para uma máquina térmica realizar trabalho, ela deve obrigatoriamente receber calor de uma fonte quente e ceder parte dele para uma fonte fria.

Questão 5 Resposta: C

O calor trocado (q) é igual ao calor latente de vaporização, que é endotérmico (+2260 J). O trabalho (w) em um processo de expansão contra pressão constante é negativo ($-P\Delta V$). Para gás ideal, $PV=nRT$. Calculando $n=1g/(18g/mol)=1/18$ mol. $\Delta V = nRT/P$. O trabalho é $W = -nRT$. $\Delta H = q + w$. $\Delta U = \Delta H - P\Delta V$. O calor é absorvido, logo $q > 0$. O trabalho é realizado pelo sistema, logo $w < 0$. Para vaporização, há aumento de volume, então trabalho é negativo. $\Delta H = q$ (pois o processo é a pressão constante). Logo $q = +2260$ J. O trabalho realizado é $-nRT$. Usando $1 \text{ L}\cdot\text{atm} = 101.3 \text{ J}$. $n=1/18$ mol. $T=373\text{K}$. $R=0.082 \text{ L}\cdot\text{atm/mol}\cdot\text{K}$. $w = -(1/18\text{mol})\cdot(0.082 \text{ L}\cdot\text{atm/mol}\cdot\text{K})\cdot(373\text{K}) = -1.72 \text{ L}\cdot\text{atm}$. $w = -1.72 \cdot 101.3 \text{ J} = -174 \text{ J}$. $\Delta U = q + w = 2260 - 174 = 2086 \text{ J}$. A alternativa B tem $q=-2260\text{J}$, $w=+2260\text{J}$, $\Delta H=-172\text{J}$, $\Delta U=-2086\text{J}$. Isso está incorreto de acordo com a termodinâmica. O calor para vaporizar é absorvido ($+q$). O trabalho de expansão é negativo ($-w$). O valor de q é o calor latente +2260J. Alternativa B está incorreta pelos sinais. Dado que o gaba...

Questão 6 Resposta: D

A dilatação linear é proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura (ΔT). A dilatação volumétrica é $\beta\Delta V$, onde $\beta=3\alpha$, e a linear é $\alpha\Delta L$, sendo (II) verdadeira. Resfriar reverte o processo; se $T_1 < T_2$, o volume final será igual ao inicial, não menor (III).

Questão 7 Resposta: A

Processo isotérmico: temperatura constante (1). Processo isobárico: pressão constante (2). Processo isocórico: volume constante (3). Processo adiabático: sem troca de calor (4). A ordem correta é Volume (3), Pressão (2), Temperatura (1), Troca de calor (4).

Questão 8 Resposta: C

A mudança de estado de fusão (sólido para líquido) aumenta a desordem molecular, logo, a entropia aumenta. A fórmula para a variação de entropia numa mudança de fase a pressão constante é $\Delta S = \Delta H/T$. Utilizando T em Kelvin ($0^\circ\text{C} = 273\text{K}$), temos $\Delta S^\circ_{\text{fus}} = 6025 \text{ J/mol} / 273 \text{ K} \approx 22,1 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$.

Questão 9 Resposta: C

A fusão do gelo em água é um processo endotérmico (absorve calor, $+\Delta H$) que aumenta o número de estados microscópicos possíveis (aumento da entropia, $+\Delta S$). No equilíbrio, a energia livre de Gibbs é zero, mas durante o processo até o equilíbrio, ela diminui. O aumento de H e S é mais direto.

Questão 10 Resposta: A

A área da superfície do Sol é $A = 4\pi r^2$. A potência total irradiada (P) é dada por $P = \sigma AT^4$. Se a potência por m^2 é $6,4 \times 10^7 \text{ J.s}^{-1}.\text{m}^{-2}$, logo $P = (6,4 \times 10^7 \text{ J.s}^{-1}.\text{m}^{-2}) \times (4\pi(7 \times 10^8 \text{ m})^2)$. $A \approx 4 \times 3,14 \times 49 \times 10^{16} \text{ m}^2 \approx 615 \times 10^{16} \text{ m}^2$. $P \approx 6,4 \times 10^7 \times 615 \times 10^{16} = 3936 \times 10^{23} \text{ W} = 3,936 \times 10^{26} \text{ W}$, que é da ordem de 10^{26} .

Questão 11 Resposta: E

Em um motor em funcionamento, o calor gerado pela combustão é dissipado para a água do sistema de arrefecimento. Essa água, aquecida, circula até o radiador, onde ocorre a troca de calor com o ar ambiente. Portanto, uma transferência direta de calor do radiador para o ar é fundamental para resfriar o motor.

Questão 12 Resposta: D

A teoria do calórico, por tratar o calor como uma substância, não explicava fenômenos onde a energia era gerada ou dissipada, como o aquecimento por atrito.

Questão 13 Resposta: C

A Entropia, a 'bagunça' do sistema, diminui quando um líquido se torna sólido (água congela), pois as moléculas se organizam em uma estrutura mais ordenada.

Questão 14 Resposta: A

A evaporação é um processo lento de vaporização que ocorre à superfície de um líquido em qualquer temperatura. As outras opções são processos de mudança de fase ou vaporização mais rápidos.

Questão 15 Resposta: D

O calor sentido no fundo da panela, sem contato direto, é resultado da emissão de energia na forma de ondas eletromagnéticas, que é a irradiação.

Questão 16 Resposta: C

O cálculo do trabalho para expansão com $PV^{1,5} = k$ é $W = \int P \, dV$. Isolando $P = k/V^{1,5}$ e integrando de V_1 a V_2 , obtém-se $W = k/(1-1,5) \cdot (V_2^{-0,5} - V_1^{-0,5}) = -2k \cdot (V_2^{-0,5} - V_1^{-0,5})$. Com $k = P_1 \cdot V_1^{1,5} = 500 \cdot 0,5^{1,5} \approx 353,55$, $W \approx 88 \text{ kJ}$.

Questão 17 Resposta: C

À pressão atmosférica normal, a água pura entra em ebulição (passa de líquido para gasoso) a 100°C .

Questão 18 Resposta: B

Um processo adiabático é aquele em que não há troca de calor (Q) entre o sistema e a sua vizinhança. Isocórico é volume constante, isentrópico é entropia constante e isotérmico é temperatura constante, mas podem haver trocas de calor nesses processos.

Questão 19 Resposta: C

Aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica (conservação de energia), a energia interna de um sistema só muda se houver troca de calor ou trabalho. Se ambos forem zero, a energia interna permanece constante.

Questão 20 Resposta: A

Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 unidade de massa em 1 grau. Temperatura é a medida da energia térmica, indicando o grau de agitação das moléculas.

Questão 21 Resposta: B

Em sólidos, a transferência de calor ocorre predominantemente por condução, onde a energia térmica passa de partícula para partícula através de vibrações e colisões, sem que as partículas se desloquem significativamente de seus lugares.

Questão 22 Resposta: C

Um processo adiabático é definido pela ausência de transferência de calor entre o sistema e suas vizinhanças. As outras opções (isobárico, isocórico, isotérmico, isovolumétrico) referem-se a constância de outras variáveis termodinâmicas (pressão, volume, temperatura).

Questão 23 Resposta: A

O ciclo de Carnot ideal é composto por duas transformações isotérmicas (em temperatura constante) e duas transformações adiabáticas (sem troca de calor), representando o máximo rendimento teórico de uma máquina térmica.

Questão 24 Resposta: B

A definição apresentada 'O volume de um gás confinado... é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele' corresponde à Lei de Boyle, que estabelece essa relação sob temperatura constante.

Questão 25 Resposta: B

A temperatura é uma medida macroscópica que reflete a energia cinética média das partículas (átomos e moléculas) que compõem a matéria.

Questão 26 Resposta: A

A fórmula para calor é $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Sabemos que $Q = 40 \text{ cal}$, $m = 200 \text{ g}$, $c = 0,8 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$. Substituindo na fórmula: $40 = 200 \cdot 0,8 \cdot \Delta T$. $40 = 160 \cdot \Delta T$. $\Delta T = 40 / 160$. $\Delta T = 1/4$. $\Delta T = 0,25 \text{ }^\circ\text{C}$. A elevação de temperatura é de $0,25 \text{ }^\circ\text{C}$.

Gabarito

1	A	2	D	3	E	4	A	5	C	6	D
7	A	8	C	9	C	10	A	11	E	12	D
13	C	14	A	15	D	16	C	17	C	18	B
19	C	20	A	21	B	22	C	23	A	24	B
25	B	26	A								