

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Nos itens que demandarem **conhecimentos de informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG1A1AAA

1 Encontradas principalmente nos embriões, mas
também em alguns tecidos adultos como o adiposo, as
4 células-tronco têm a capacidade de se transformar em células
de diversos tipos. Embora a chamada plasticidade das
embrionárias seja maior, os desafios éticos de pesquisas com
esse tipo de células levaram a atenção de muitos cientistas às
7 células-tronco adultas. Na virada do milênio, publicações
científicas em periódicos importantes sugeriam que ambas
teriam propriedades equivalentes. Esperava-se que, ao serem
10 injetadas em órgãos danificados, como um coração infartado,
as células-tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos
e células cardíacas. Teve início, então, uma série de ensaios
13 clínicos — testes em pessoas —, que foram amplamente
noticiados.

Hoje, sabe-se que as células-tronco adultas não são tão
16 versáteis quanto prometiam. Os resultados dos ensaios não
foram animadores. Mas isso não significa que tenham sido
descartadas como possível tratamento ou que os esforços
19 tenham sido desperdiçados. Na ciência, o negativo também é
um resultado; mesmo que não renda prêmios ou resulte em
publicações, contribui para o avanço do conhecimento.

Alexandra Ozorio de Almeida. *Dois passos para trás, um para frente*. In: *Revista Pesquisa Fapesp*, 260.^a ed., out./2017, p. 7 (com adaptações).

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto CG1A1AAA, julgue os itens que se seguem.

- 1 O emprego do acento indicativo de crase em “às células-tronco adultas” (ℓ. 6 e 7) é facultativo, dada a presença de termo masculino na palavra composta “células-tronco”.
- 2 Dado o emprego da partícula “se”, em “Esperava-se” (ℓ.9) e “sabe-se” (ℓ.15), é impossível determinar de modo preciso quem esperava “que (...) as células-tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas” (ℓ. 9 a 12) e quem sabe “que as células-tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam” (ℓ. 15 e 16).
- 3 Em ciência, um resultado negativo, embora também tenha seu valor na construção do saber, é considerado algo de menor prestígio, por não resultar em prêmios ou em publicações.
- 4 Infere-se do texto que apenas as células-tronco encontradas em embriões e no tecido adiposo são capazes de se transformar em células de diversos tipos, apesar de haver outras fontes de células-tronco.
- 5 O período “Teve início, então, uma série de ensaios clínicos — testes em pessoas —, que foram amplamente noticiados” (ℓ. 12 a 14) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos — testes em pessoas —, os quais foram amplamente noticiados.

Texto CG1A1BBB

1 Quando dizemos que uma pessoa é doce, fica bem
claro que se trata de um elogio, e de um elogio emocionado,
porque parte de remotas e ternas lembranças: o primeiro sabor
4 que nos recebe no mundo é o gosto adocicado do leite materno,
e dele nos lembraremos pelo resto de nossas vidas. A paixão
pelo açúcar é uma constante em nossa cultura. O açúcar é fonte
7 de energia, uma substância capaz de proporcionar um
instantâneo “barato” que reconforta nervos abalados. É
paradoxal, portanto, a existência de uma doença em que o
10 açúcar está ali, em nossa corrente sanguínea, mas não pode ser
utilizado pelo organismo por falta de insulina. As células
imploram pelo açúcar que não conseguem receber, e que sai,
13 literalmente, na urina. O diabetes é conhecido desde a
Antiguidade, sobretudo porque é uma doença de fácil
diagnóstico: as formigas se encarregam disso. Há séculos,
16 sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o
formigueiro. Também não escapou aos médicos de outrora o
fato de que a pessoa diabética urina muito e emagrece. “As
19 carnes se dissolvem na urina”, diziam os gregos.

Moacyr Scliar. *Doce problema*. In: *A face oculta* — inusitadas e reveladoras histórias da medicina. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001 (com adaptações).

No que concerne às ideias e aos aspectos linguísticos do texto CG1A1BBB, julgue os próximos itens.

- 6 No período “As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber, e que sai, literalmente, na urina” (ℓ. 11 a 13), o vocábulo “que”, nas duas ocorrências, tem o mesmo referente e desempenha a função sintática de sujeito nas orações em que se insere.
- 7 A correção gramatical do texto seria mantida caso o artigo “O” (ℓ.13) fosse substituído por **A** e a palavra “conhecido” (ℓ.13) fosse flexionada no feminino — **conhecida** —, dada a variação de gênero característica da palavra “diabetes”.
- 8 Há uma metáfora no período “Há séculos, sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o formigueiro” (ℓ. 15 a 17).
- 9 Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o trecho “aos médicos” (ℓ.17) fosse reescrito como **dos médicos**.
- 10 As aspas foram empregadas em ‘barato’ (ℓ.8) e em ‘As carnes se dissolvem na urina’ (ℓ. 18 e 19) por motivos distintos.

Texto CG1A1CCC

Internet: <www.leovillanova.net>.

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto CG1A1CCC, julgue os itens subsequentes.

- 11 O emprego das palavras “doido” e “véi” indica que há uma relação simétrica e informal entre os interlocutores.
- 12 Conclui-se da fala do mosquito que está voando que ele se dirige a apenas um dos dois mosquitos que estão próximos ao vidro de vacina contra a dengue.

Considerando a legislação pertinente e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 13 Uma entidade de serviços privados de cobertura assistencial, após firmar convênio com o SUS, passa a integrá-lo de forma complementar.
- 14 Ao se consorciarem para prestar serviços de saúde, os municípios contribuirão com recursos para o consórcio na proporção de suas populações.

Com base na legislação sanitária nacional, julgue os próximos itens.

- 15 Todas as infrações sanitárias estão sujeitas à aplicação da penalidade de multa.
- 16 Para funcionar, uma casa de repouso privada precisa obter licença do órgão sanitário competente.

Julgue os seguintes itens, que versam sobre a legislação epidemiológica nacional.

- 17 O diretor de uma escola básica está isento da obrigação de comunicar à autoridade sanitária a suspeita de doença de notificação compulsória ocorrida no estabelecimento que dirige.
- 18 Um empresário individual está sujeito a investigações epidemiológicas determinadas pela autoridade sanitária apenas como pessoa natural.

A respeito da formação do Brasil contemporâneo, da República Velha e da Era Vargas, julgue os itens seguintes.

- 19 A Política dos Governadores, acordo que consistia no apoio do governo federal a grupos poderosos locais em troca do apoio desses grupos às proposições do governo no Poder Legislativo federal, garantiu a governabilidade do Brasil durante a Primeira República, tendo se estendido aos níveis estadual e municipal.
- 20 Getúlio Vargas se manteve à frente do Palácio do Catete até 1945, quando perdeu o suporte da classe trabalhadora em decorrência da insatisfação com as leis trabalhistas aprovadas pelo governo e do apoio dos trabalhadores à realização de eleições para nova assembleia constituinte.
- 21 Desde as primeiras discussões sobre a formação da nação brasileira, no século XIX, a mestiçagem foi considerada uma das principais marcas de sua população, seja por políticos, como José Bonifácio, seja em estudos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Julgue os itens subsequentes, relativos à história do Brasil da segunda metade do século XX.

- 22 Os grupos legalistas das Forças Armadas asseguraram a continuidade do regime democrático nas severas crises políticas de 1954, 1955 e 1961, quando políticos civis convocaram a intervenção militar para efetivarem golpes de Estado, mas cederam espaço durante a crise que resultou no golpe de 1964, quando a hierarquia militar foi posta em risco, como evidenciado pela insurreição dos sargentos em Brasília.
- 23 Para cumprir o objetivo de industrialização nacional constante no Plano de Metas, o governo de Juscelino Kubitschek adotou estratégias como a atração de investimentos privados para a ampliação do parque industrial e o investimento estatal em áreas estratégicas de infraestrutura.

Com relação à história das Constituições brasileiras, julgue o item a seguir.

- 24 Ao contrário da primeira Constituição brasileira, que foi outorgada pelo Imperador d. Pedro I, em 1824, e vigorou por sessenta e cinco anos, até a queda da monarquia, as seis Constituições do período republicano foram todas promulgadas.

No que diz respeito à história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, julgue os itens subsequentes.

- 25 O Estado do Maranhão e Grão Pará foi instituído devido a dificuldades relacionadas à administração das possessões portuguesas na América, como, por exemplo, a disputa entre colonos e jesuítas pelo controle da mão de obra indígena na região Norte, a qual motivou o movimento denominado Revolta de Bequimão, contrário à decisão régia que entregou aos inácianos o controle dos índios livres.
- 26 A adesão da Província do Maranhão à independência do Brasil resultou da derrota militar de parte da elite maranhense que defendeu, por meio das armas, a manutenção dos laços com Portugal, a despeito das estreitas relações existentes entre o Maranhão e a Corte no Rio de Janeiro. As tropas portuguesas, mesmo tendo vencido a Batalha de Jenipapo, foram derrotadas por Thomas Cochrane em São Luís.
- 27 A Balaiada, que sofreu violenta repressão comandada pelo coronel do Exército Luiz Alves de Lima, foi um movimento de composição social complexo, pois agregou artesãos, escravos, libertos e pequenos proprietários das províncias do Maranhão e Piauí contrários à opressão dos governos locais.
- 28 No início do século XX, difundiu-se a ideia de que a cidade de São Luís, fundada por Jerônimo de Albuquerque após a expulsão dos franceses da região, teria sido fundada pelos franceses.

Acerca da história do Maranhão no período republicano, julgue os próximos itens.

- 29 O domínio do chefe oligárquico Victoriano Freire sobre a política maranhense foi desafiado na década de 60 do século XX, quando José Sarney, com propostas modernizadoras, despontou como liderança estadual e opositor a Victoriano.
- 30 Após a conturbada adesão do Maranhão à República, a ordem foi estabelecida a partir da ação das lideranças que já atuavam na política maranhense desde meados do século XIX.
- 31 José Maria dos Reis Perdigão e Tarquínio Lopes Filho foram grandes lideranças dos tarquinistas — grupo maranhense que apoiou o tenentismo e a Revolução de 1930.


O crescimento industrial do Brasil ocorreu, até 1930, por meio da concentração espacial, que, por sua vez, influenciou a organização do espaço geográfico brasileiro. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 32 O espaço geográfico urbano, nos centros industriais, caracterizou-se por uma nítida segregação socioespacial.
- 33 Um dos fatores que promoveram a concentração espacial foi a disponibilidade de capitais financeiros fornecidos pela cafeicultura.

O vertiginoso processo de urbanização no Brasil deu origem, em poucas décadas, a centros urbanos de todo porte, que, espalhados pelo país, passaram a ordenar os fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais no território brasileiro, configurando uma complexa rede geográfica de cidades.


Com relação ao texto apresentado e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

- 34 As cidades que apresentam maior grau de complexidade socioeconômica e polarizam todo o território brasileiro e parte da América do Sul são as metrópoles nacionais.
- 35 A desconcentração espacial das atividades econômicas, a partir de 1990, promoveu o crescimento das cidades médias.



Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1950 a 2010

Pirâmide etária brasileira entre 1950 e 2010. A. M. N. Vasconcelos; M. M. F. Gomes. **Transição demográfica: experiência brasileira.** Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(4):539-48, out.-dez./2012. Internet: <<http://scielo.iec.pa.gov.br>> (com adaptações).



Índice de envelhecimento das regiões do Brasil. 1970-2010. Vera Elizabeth Closs e Carla Helena Augustin Schwanke. A evolução do índice de envelhecimento no Brasil, nas suas regiões e unidades federativas no período de 1970 a 2010. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.** Rio de Janeiro, 2012; 15(3):443-58, p. 447 (com adaptações).

Tendo as figuras precedentes como referência inicial, julgue os próximos itens, a respeito da população brasileira.

- 36 Em 1970, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste evidenciavam um momento de pré-transição demográfica.
- 37 O processo de envelhecimento da população brasileira iniciou-se na década de 90 do século passado.

Espaço Livre





Figura I



F. Mendonça; Dani Oliveira I. M. **Climatologia**: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007 (com adaptações).

Figura II

Tendo como referência inicial as figuras precedentes e considerando que o estado do Maranhão situa-se em uma região controlada por massas de ar quente, julgue os próximos itens.

- 38 A regularidade térmica observada na cidade de São Luís ao longo do ano, conforme indicado na figura I, deve-se ao efeito da continentalidade.
- 39 A maior pluviosidade nos meses de março e abril na porção norte do estado do Maranhão é efeito da zona de convergência intertropical (ZCIT).
- 40 Em relação à variação sazonal, na cidade de Colinas, as temperaturas do ar mais elevadas ocorrem entre os meses de setembro e dezembro, em virtude das massas de ar seco.

Duas linhas dirigiram o povoamento no Maranhão: a que invadiu o litoral e a que avançou pelos altos sertões, oriunda do interior nordestino.

R. G. Rocha. O processo de ocupação do sul do Maranhão: dinamismo econômico e des(re)ordenamento territorial. In: **Interespaço**, v. 1, n.º 1, 2015, p. 5-26. Internet: <www.periodicoeletronico.ufma.br> (com adaptações).

Com relação ao povoamento do Maranhão, julgue os itens que se seguem.

- 41 O povoamento da região litorânea e do alto sertão maranhense instituiu, nessas regiões, bases econômicas semelhantes.
- 42 A ocupação do alto sertão maranhense foi realizada com o emprego da violência.

Com relação à geomorfologia do território maranhense, julgue os itens a seguir.

- 43 As atividades dos agentes modeladores do relevo revela um forte controle litológico no território maranhense.
- 44 O relevo do território maranhense apresenta feições típicas das bacias sedimentares com formas tabulares e subtabulares.

Determinado laboratório de análises clínicas está sendo investigado por emitir laudos falsos de um exame constituído por 7 indicadores, correspondentes à concentração de 4 compostos na corrente sanguínea, obtidos da seguinte forma: uma medição da concentração de cada um dos compostos A, B, C e D, e 3 medições, por 3 diferentes técnicas, da concentração do composto E. Os laudos verdadeiros de 7 pacientes (chamados pacientes-fonte), com prenomes distintos, entre eles Amanda, Bárbara, Carlos e Daniel, eram usados para compor laudos falsos para os demais pacientes. Para dificultar a ação da autoridade policial, na montagem de um laudo falso, o laboratório tomava o cuidado de, no conjunto de 7 medições que constituíam cada laudo falsificado, usar apenas uma medição de cada paciente-fonte, ou seja, de nunca usar 2 ou mais medições de um mesmo paciente-fonte.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

- 45 Há mais de 5 maneiras distintas de se produzir um laudo falso utilizando-se os dados dos exames de Amanda, Bárbara, Carlos e Daniel, nessa ordem, para os valores referentes aos compostos A, B, C e D.
- 46 Caso o laboratório escolhesse aleatoriamente, entre os dados dos 7 pacientes-fonte, aqueles que seriam usados nas medições referentes ao composto E, a probabilidade de serem usados os dados de Amanda, Bárbara e Carlos seria inferior a 3%.
- 47 Se fosse adotada a estratégia de falsificar laudos seguindo-se a ordem sucessiva de medições referentes aos compostos A, B, C e D e, em seguida, as medições referentes ao composto E, a quantidade de laudos falsos distintos que poderiam ser gerados pelo laboratório seria superior a 800.
- 48 Com relação ao composto E, a quantidade de laudos falsos distintos constituídos com dados dos exames de Amanda, Bárbara e Carlos que poderia ser produzida é superior a 50.




Figura I




Figura II


A figura I precedente ilustra um bloco de massa M que parte do repouso e desliza sobre um plano inclinado de 30° , com atrito, durante 5 s, até atingir sua base. A figura II mostra o gráfico do módulo da velocidade, v , do bloco nesse intervalo de tempo.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue os próximos itens, considerando que o seno de 30° é igual a 0,5.

- 49 A altura em que o bloco se encontrava no início do movimento era superior a 2 m.
- 50 O trabalho realizado pela força de atrito não é conservativo, visto que o atrito gera calor ao longo de todo o trajeto.
- 51 A força resultante sobre o bloco é nula.
- 52 Ao se dobrar a massa desse bloco, a força de atrito atuante também será dobrada.

Espaço Livre

A pólvora é material empregado como propulsor em armas de fogo. Basicamente, a ideia é provocar uma reação que gere uma quantidade grande de gases sob pressão e temperatura elevadas. Ao se expandirem, esses gases impulsionam um projétil. A pólvora negra, empregada em armas mais antigas, é constituída por uma mistura de salitre (KNO_3), enxofre (S) e material de carbono (C). A equação **não** balanceada de uma das reações químicas que ocorrem durante a queima da pólvora é apresentada a seguir.



Considerando essas informações e sabendo que o número atômico do carbono é igual a 6, julgue os itens que se seguem.

- 53 Entre os produtos da reação química apresentada, podem ser identificadas uma substância iônica e duas substâncias moleculares; entre as substâncias moleculares, uma é polar e, a outra, apolar.
- 54 Um átomo neutro do isótopo de carbono-12, no estado fundamental, apresenta, em seu núcleo, 6 prótons e 6 nêutrons; além disso, apresenta 6 elétrons na região extranuclear.
- 55 A menor soma de coeficientes estequiométricos inteiros que permitem balancear a equação química apresentada é igual a 8.
- 56 O KNO_3 é um sal inorgânico resultante da reação de neutralização entre o hidróxido de potássio e o ácido nítrico.

A respeito do Microsoft Word 2007 e dos *softwares* livres, julgue os itens a seguir.

- 57 Mediante o acesso ao código-fonte de um *software* livre, um desenvolvedor poderá modificar esse *software* e distribuir cópias da versão modificada a outros indivíduos, sem restrição de propósito de uso.
- 58 No Word 2007, embora esteja impedido de criar e(ou) exibir alterações controladas no texto, o usuário pode inserir, editar e excluir modificações no texto.

Julgue os itens subsequentes, relativos a *software* para o ambiente de microinformática e a proteção e segurança da informação.

- 59 O *firewall* do Windows protege esse sistema por meio da criptografia dos dados nas unidades de dados fixas e removíveis, bem como resguarda a unidade do sistema operacional contra ataques *offline*, que são efetuados para desabilitar ou descartar o sistema operacional instalado.
- 60 Fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes de um ataque do tipo *ransomware locker*, que impede o acesso ao equipamento infectado, visto que o pagamento do resgate não garante acesso aos dados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos à asma.

- 61** Para pacientes com asma grave, o uso de antagonista de receptor de leucotrieno cisteínico (antileucotrieno) é indicado em substituição ao corticoide inalatório, mantendo-se o uso do beta-agonista de ação prolongada.
- 62** A imunoterapia específica com alérgenos é recomendada para pacientes asmáticos muito graves refratários ao tratamento convencional.
- 63** A asma é mais prevalente em regiões de clima quente e seco, em decorrência da maior proliferação dos ácaros presentes na poeira doméstica.

Um paciente de vinte e três anos de idade, com quadro de febre reumática desde a infância, compareceu ao atendimento médico queixando-se de dispneia ao subir escadas ou correr havia seis meses, com piora progressiva nos últimos dois meses. O paciente relatou dispneia para realizar atividades habituais, como caminhar mais de cinquenta metros. Ao exame físico, o paciente apresentava-se eupneico, acianótico, normocorado, com frequência respiratória de 20 irpm, pressão arterial de 160 mmHg × 60 mmHg (média de três medidas), frequência cardíaca de 94 bpm, ritmo cardíaco em três tempos (terceira bulha), além de *ictus* visível e palpável no 6.º espaço intercostal à esquerda na linha axilar anterior. O pulso carotídeo apresentava ascenso rápido e com alta amplitude. Apresentava bulhas normofonéticas, sopro holodiastólico de alta frequência em decrescendo e aspirativo de 4+/6 e mais audível no 4.º espaço intercostal na linha parasternal à esquerda e no 2.º espaço intercostal na linha parasternal à direita, além de sopro suave mesodiastólico em 5.º espaço intercostal, na linha hemiclavicular à esquerda. A manobra de *handgrip* intensificou ambos os sopros. Os demais dados do exame físico não apresentavam alterações significativas. O eletrocardiograma revelou somente hipertrofia ventricular esquerda.

A respeito desse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

- 64** O sopro mesodiastólico descrito no referido caso clínico é denominado sopro de Austin-Flint.
- 65** A profilaxia contra a febre reumática deverá ser mantida até os vinte e cinco anos de idade.
- 66** Recomenda-se para esse paciente o uso de enalapril e acompanhamento semestral.


Quanto à detecção precoce do câncer gástrico, julgue o próximo item.

- 67** A realização de endoscopia digestiva alta para rastreamento do câncer gástrico em indivíduos assintomáticos, a partir dos cinquenta anos de idade, contribui para a detecção da neoplasia maligna em estágios iniciais e, consequentemente, para o declínio na taxa de mortalidade geral.

Com relação às hepatites virais, julgue os itens subsecutivos.

- 68** Recomenda-se a associação de sofosbuvir com daclatasvir para pacientes portadores de hepatite C crônica genótipo 1 coinfectados com HIV.
- 69** O paciente não apresenta imunidade protetora após a primeira infecção com o vírus da hepatite C e, mesmo após a eliminação espontânea desse vírus na fase aguda, o paciente poderá ser reinfestado, principalmente se estiver exposto a fatores que propiciam a infecção desse agente infeccioso.

Uma paciente de setenta e sete anos de idade, diabética havia quinze anos, compareceu ao atendimento médico relatando episódios de dor retroesternal em queimação de moderada intensidade havia um mês e que geralmente surgia quando ela subia escadas ou andava aceleradamente, mas que desaparecia espontaneamente, em menos de cinco minutos, após o término do esforço. A paciente informou que, na última semana antes do atendimento médico, havia observado que tais episódios ocorriam a esforços menores que os habituais, como tomar banho. Um dia antes do atendimento ela teve um episódio de dor semelhante, porém de maior intensidade, que a despertou do sono e que desapareceu em torno de vinte minutos. No momento da consulta, a paciente estava assintomática. Ao exame físico, apresentava saturação de oxigênio (em ar ambiente) de 95%, pressão arterial de 134 mmHg × 74 mmHg (média de três medidas), frequência cardíaca de 92 bpm e ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopros. O restante do exame físico foi normal. Os resultados dos exames laboratoriais foram os seguintes: triglicerídeos de 155 mg/dL, colesterol total de 204 mg/dL; HDL colesterol de 39 mg/dL, LDL colesterol de 134 mg/dL, glicemia 118 mg/dL. A dosagem de CK-MB massa e troponina da admissão no pronto-socorro foram normais. O exame de eletrocardiograma (com calibração padrão) evidenciou o resultado mostrado na figura a seguir.



No que se refere a esse caso clínico, julgue os itens a seguir.

- 70** O uso de clopidogrel e ácido acetil salicílico pode ser indicado para a referida paciente.
- 71** A paciente deve ser orientada a retornar com novo perfil lipídico após três meses de dieta com redução da ingestão de gordura trans e saturada e, caso os exames indiquem persistência dos níveis de LDL colesterol acima de 100 mg/dL, deve iniciar o uso de sinvastatina.
- 72** Recomenda-se realizar cintilografia miocárdica de perfusão associada ao teste ergométrico nas primeiras vinte e quatro horas após a consulta da paciente para avaliação prognóstica.

Com relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), julgue o seguinte item.

- 73** Macrófagos, neutrófilos, linfócitos T, células CD8 citotóxicas e células Th1, Th17, ILC-3, em conjunto com células epiteliais e outras estruturas celulares, liberam mediadores inflamatórios que podem potencializar o quadro clínico de DPOC.

Um paciente afrodescendente de sessenta e seis anos de idade, hipertenso sem comorbidades e que usava regularmente atenolol 50 mg e enalapril 20 mg, ambos uma vez ao dia, retornou à consulta com os exames solicitados. No dia da consulta, sua pressão arterial era de 162 mmHg × 82 mmHg, semelhantemente às últimas avaliações. A monitorização ambulatorial da pressão arterial de vinte e quatro horas (MAPA) revelou média da pressão arterial de 150 mmHg × 74 mmHg no período total, 160 mmHg × 78 mmHg no período da vigília e 148 mmHg × 68 mmHg no período do sono. Os demais exames de rotina solicitados foram todos normais.

Com relação ao caso clínico precedente, julgue os itens subsequentes.

- 74** Dadas as características apresentadas e a sinergia entre os fármacos, o paciente se beneficiará da substituição do atenolol pelo besilato de anlodipino mais do que do aumento da dose do atenolol, quanto à redução da pressão arterial.
- 75** Trata-se de um caso de hipertensão arterial resistente.

Uma paciente com cinquenta anos de idade procurou serviço médico ambulatorial para submeter-se a avaliação de saúde. A paciente não apresentava queixas clínicas, não praticava atividade física, não tinha antecedentes morbidos patológicos, tinha histórico familiar de hipertensão arterial e de diabetes melito. O exame físico mostrou índice de massa corporal igual a 30 kg/m². Como estava em jejum de doze horas, a paciente foi submetida a uma medida de glicemia, cujo resultado foi igual a 160 mg/dL.

Com base nesse caso clínico, julgue os itens a seguir.

- 76** Recomenda-se que a paciente modifique seus padrões alimentares e inicie um programa de atividade física.
- 77** Para reduzir o risco dessa paciente de desenvolver doença cardíaca, deve-se manter a taxa de lipoproteínas de baixa densidade entre 120 mg/dL e 170 mg/dL.
- 78** Em razão do quadro assintomático da paciente, o valor da glicemia não é critério para o diagnóstico de diabetes melito.
- 79** Nesse caso, é necessário investigar se a paciente, mesmo estando assintomática, apresenta lesões em órgãos-alvo.

Um paciente com quarenta e cinco anos de idade procurou atendimento médico com quadro, havia três meses, de edema mole, frio e indolor localizado no terço médio dos membros inferiores, associado a ganho de 5 kg e eliminação de urina espumosa. O paciente não tinha antecedentes morbidos pessoais. Ao exame físico, constatou-se edema bipelebral e bilateral. O exame de urina revelou a presença de proteína classificada em 3+.

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens subsecutivos.

- 80** O tratamento dietético desse paciente requer dieta com restrição de sal e diminuição da ingestão de proteínas.
- 81** A solicitação da sorologia para hepatite e HIV é importante para elucidar uma possível causa da doença que acomete o referido paciente.
- 82** A formação do edema em membros inferiores decorre do aumento da pressão hidrostática capilar.
- 83** Espera-se encontrar diminuição dos níveis séricos de colesterol e de triglicerídeos do paciente, em função do aumento da excreção renal de lipídeos.

Uma paciente com vinte e oito anos de idade compareceu ao atendimento médico com quadro clínico, havia um ano, de rigidez e edema de características inflamatórias que ocorriam de forma simétrica nas articulações das mãos, com duração de cerca de duas semanas e melhora espontânea. A paciente informou que a rigidez das articulações costumava ser matinal e persistia por mais de duas horas e que isso prejudicava a execução de suas atividades de trabalho em sua profissão. O exame físico comprovou dor, edema e eritema nas articulações de ambas as mãos. Não foram observadas outras alterações.

A respeito do caso clínico precedente, julgue os próximos itens.

- 84** Rigidez matinal que dura mais de uma hora é característica da inflamação articular e indica a gravidade do processo.
- 85** O diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico é menos provável nesse caso clínico, em face de não haver relato de manifestações clínicas em outros órgãos ou sistemas.
- 86** Para o tratamento dessa paciente, devem-se prescrever anti-inflamatórios não esteroidais, uma vez que a doença cursa com resolução espontânea dos sintomas.
- 87** Trata-se de provável comprometimento articular por infecção viral, dado o envolvimento poliarticular sem deformidades por mais de seis semanas.

Uma paciente com quarenta e cinco anos de idade, sem antecedentes patológicos, compareceu ao serviço de emergência apresentando quadro de tontura rotatória associada a náuseas, vômitos e zumbidos auditivos bilaterais havia duas horas. Os sintomas agravavam-se com a movimentação da cabeça. Não havia cefaleia, escotomas, turvação visual e perda auditiva. Ela informou que caíra da própria altura assim que acordou. O exame físico mostrou a presença de vertigem e nistagmo com a realização da manobra de Dix-Hallpike.


Em relação ao caso clínico apresentado, julgue os itens que se seguem.

- 88** A manobra de Dix-Hallpike consiste em deixar a paciente de pé com os olhos fechados por três minutos com o objetivo de desencadear o quadro de vertigem.
- 89** O tratamento dessa paciente pode apresentar bons resultados com a realização da manobra de Epley.
- 90** Trata-se da descrição de um quadro de vertigem de origem central.

A respeito do acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH), julgue os itens subsequentes.

- 91 Ressangramento, vasoespasmos, hidrocefalia, crises convulsivas e síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético são exemplos de complicações associadas ao AVCH.
- 92 São exemplos de causas de AVCH aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas intracerebrais, vasculite, neoplasias do sistema nervoso central, hemofilia e púrpura trombocitopênica.
- 93 Se em um paciente de setenta anos de idade, com diagnóstico de AVCH e com alteração do nível de consciência, observam-se abertura ocular apenas a estímulos dolorosos, resposta verbal com sons incompreensíveis e extensão como melhor resposta motora, então esse paciente apresenta nove pontos na Escala de Coma de Glasgow.

A figura a seguir mostra a representação do que foi observado durante a inspeção da orofaringe de um paciente de trinta e cinco anos de idade que compareceu ao atendimento médico com insuficiência respiratória aguda e indicação de intubação orotraqueal. A inspeção foi realizada com abertura máxima da boca e protrusão da língua, em posição sentada.



John M. Oropello et al. *Critical Care* 2017, McGraw-Hill Education, 2017, cap. 17 (com adaptações).

Com relação a esse caso clínico, julgue os itens que se seguem.

- 94 Os achados mostrados na figura correlacionam-se com baixa dificuldade de intubação orotraqueal.
- 95 Segundo a classificação de Cormack e Lehane, a inspeção mostrada na figura é classificada como tipo I.

Uma jovem de vinte e três anos de idade foi levada para o atendimento médico com quadro de dispnéia intensa, tosse produtiva com expectoração rósea e espumosa. O exame físico revelou: pressão arterial de 110 mmHg × 70 mmHg; frequência cardíaca de 110 bpm; presença de estertores em ambos os campos pulmonares (das bases aos ápices) associados a sibilos e roncos esparsos; *ictus cordis in situ*; ritmo cardíaco regular taquicárdico em 2 tempos; hiperfonese da primeira bulha em foco mitral; estalido de abertura da mitral; ruflar diastólico e reforço pré-sistólico melhor audíveis na região do *ictus cordis*; abdome livre, sem visceromegalias; e extremidades sem edema, cianóticas (+2/+4).

No que se refere a esse caso clínico, julgue os itens seguintes.

- 96 Nessa paciente, a etiologia básica da emergência em curso é a presença de infarto agudo do miocárdio.
- 97 O principal diagnóstico do caso em tela é de paciente com edema agudo de pulmão.

Um paciente de quarenta e oito anos de idade foi levado ao serviço de pronto atendimento em situação de parada cardiorrespiratória (PCR).

A respeito dessa emergência médica, julgue os itens a seguir, considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013) e da Associação Americana do Coração (2015) para o suporte básico de vida.

- 98 Nessa condição clínica, recomenda-se a manutenção de quinze compressões torácicas para cada duas ventilações (15:2).
- 99 A profundidade recomendada para cada compressão torácica é de, no mínimo, 5 cm.
- 100 O principal mecanismo de parada cardíaca nesse caso clínico é a assistolia.

Um paciente de vinte anos de idade compareceu ao atendimento médico queixando-se do surgimento súbito de ardência e vermelhidão na região perilabial inferior após um período de estresse emocional e, dois dias após esse período, passou a apresentar pequenas bolhas dolorosas nessa região do corpo. O paciente negou febre, sudorese ou imunodeficiências. O exame clínico evidenciou a presença de lesões bolhosas e eritema na região perilabial inferior de moderada intensidade e ausência de lesões na cavidade oral.

Considerando esse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

- 101 O tratamento recomendado para o paciente em questão é a aplicação tópica de aciclovir.
- 102 O principal diagnóstico para esse paciente é de herpes simples.
- 103 O agente etiológico envolvido nas manifestações clínicas desse paciente é o vírus varicela-zóster.

Com relação à endocardite infecciosa, julgue os próximos itens.

- 104 Os microrganismos do grupo HACEK são bacilos ou cocobacilos gram-negativos de crescimento lento, normais na microbiota oral e responsáveis por cerca de 5% dos casos de endocardite infecciosa.
- 105 O *Staphylococcus aureus* é o patógeno de maior preocupação em caso de pacientes usuários de drogas injetáveis com diagnóstico de endocardite infecciosa.

A respeito das neuropatias compressivas em doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, julgue os itens a seguir.

- 106 A síndrome do canal de Guyon é caracterizada pela compressão do nervo ulnar na região do punho, especificamente na passagem pelo canal de Guyon, sendo geralmente causada por cistos sinoviais; a síndrome do túnel do carpo, por sua vez, caracteriza-se pela compressão do nervo mediano, também na região do punho.
- 107 A síndrome do pronador redondo é frequentemente confundida com a síndrome do túnel do carpo: em ambas o nervo mediano é comprimido, o que causa alterações da sensibilidade na área distal dos três primeiros quirodáctilos; no entanto, na síndrome do pronador, a região tenar apresenta alterações de sensibilidade e a manobra de Phalen é negativa.
- 108 A síndrome do interosseo anterior, ramo exclusivamente motor do nervo ulnar, acomete trabalhadores que usam as mãos para carregar objetos pesados, causando parestesia de evolução lenta e vaga dor no antebraço, na projeção da musculatura flexora dos dedos.
- 109 A síndrome do interosseo posterior é caracterizada pelo comprometimento do ramo profundo do nervo ulnar após a sua bifurcação na extremidade proximal do antebraço; a síndrome do túnel cubital, por sua vez, consiste na compressão do nervo radial em sua passagem posteriormente no cotovelo.

No exame periódico de saúde em uma empresa, o médico constatou que uma trabalhadora estava exposta a risco ergonômico decorrente de levantamento e transporte manual de peso. Ela, que estava na oitava semana de gestação, informou ao médico que apresentava quadro sintomatológico compatível com lombociatalgia.

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os seguintes itens, com relação às normas que regem a atuação dos médicos da área trabalhista.

- 110 Mesmo que a empregada se recupere dos sintomas clínicos apresentados, o médico deverá considerá-la inapta para o trabalho e encaminhá-la para perícia do INSS, para concessão de licença-médica durante todo o período de gestação, a fim de prevenir a mãe e o feto de agravos relacionados a atividades perigosas e insalubres.
- 111 É atribuição exclusiva do médico especialista em medicina do trabalho investigar e avaliar a existência de relação entre a causa da doença na referida empregada e as atividades profissionais por ela exercidas, verificando, também, os fatores de risco no ambiente de trabalho.
- 112 Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades da empregada na empresa, além dos exames necessários, o médico deve considerar como fundamentais as opiniões do empregador e do sindicato da categoria.
- 113 Cabe ao médico que atendeu a empregada emitir a comunicação de acidente do trabalho ou outro documento que comprove o evento infortunistico, mesmo com base na mera suspeita de nexo causal da doença com o trabalho.

No que se refere a fatores geradores de transtornos mentais relacionados ao trabalho, julgue os itens subsequentes.

- 114 A implementação de medidas corretivas e de promoção da saúde que envolvam modificações na organização do trabalho independem da participação dos trabalhadores e dos gerentes: essa decisão é determinada por profissionais especializados em ergonomia, administração de empresas ou psicologia organizacional.
- 115 A queixa de fadiga relacionada à carga de trabalho será considerada pelo médico da empresa como um evento sentinela e, ele mesmo providenciará a notificação, sem a necessidade de outras investigações prévias.
- 116 Indivíduos com hábitos vespertinos são mais adaptados para trabalhos noturnos do que aqueles com hábitos matutinos, pois aqueles possuem mecanismo de adaptação conhecido como *coping*.
- 117 A carga de trabalho na dimensão psíquica será aumentada caso o rearranjo na organização do trabalho gere maior autonomia para o trabalhador, elevando-se o risco de adoecimento devido a uma diminuição das referências determinadas pelo trabalho prescrito.

A respeito de fatores de risco para se adquirir doenças como o câncer e de exposição ocupacional, julgue os itens subsecutivos.

- 118 Os trabalhadores expostos a radiações ionizantes devem ser monitorados continuamente por meio de dosimetria individual e exames periódicos anuais, entre eles hemograma completo e exame para contagem de plaquetas, para detecção precoce de efeitos nocivos à saúde.
- 119 Estima-se que a maioria dos cânceres surge devido a ações antrópicas no ambiente, inclusive do trabalho, que podem produzir fatores de risco, como agentes carcinogênicos; outra causa é determinada pelo estilo de vida e uma menor parte, que ainda não foi possível identificar a causa, atribuída a fatores genéticos e mutações espontâneas.
- 120 A etiologia do câncer de pele está associada à exposição a raios ultravioleta, por isso agricultores e trabalhadores da construção civil, por exemplo, tendem a apresentar taxas de incidência de câncer de pele mais elevadas que a população em geral e de outros trabalhadores cujas atividades são realizadas sem exposição à radiação solar.

Espaço livre