গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

আম

(জাত: বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩ (অম্রপালি), বারি আম-৪, বারি আম-৫, বারি আম-৬, বারি আম-৭, বারি আম-৮, বারি আম-৯, বারি আম-১০, বারি আম-১১, বারি আম-১২, বারি আম-১৩, বারি আম-১৪, বারি আম-১৫, বারি আম-১৬, বারি আম-১৭, বারি আম-১৮)

কাঙ্খিত ফলন: ৩৫০ ± ৩৫ কেজি/গাছ (২০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ /বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টা হাইড্রেট)	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	৫০০	২০০	২৮০	৪৮	৬০	১০
০-১	২১৭	১৫০	১০০	১১২	২৪	৩০	১০
২-৪	৪৫৬	২৫০	১৮০	১৬৮	২৪	৩০	১৫
৫-৭	৮৪৬	৪০০	২৪০	২৮০	২৪	২৯	২০
৮-১০	১০৮৫	৫০০	৩০০	৩৯২	৩৮	৪৭	২৫
১১-১৫	১১৯৪	৭৫০	৪০০	৪৪৮	৩৮	৪৭	৩০
১৬-২০	১৭৩৬	১০০০	৪৬০	৫৬০	৪৮	৫৯	৩৫
> ২০	২১৭০	১৫০০	৬০০	৭২৮	৪৮	৭১	৪০

আম

(জাত: বিএইউ আম-১, বিএইউ আম-২, বিএইউ আম-৩, বিএইউ আম-৪, বিএইউ আম-৫, বিএইউ আম-৬, বিএইউ আম-১১, বিএইউ আম-১৪, বিএইউ আম-১৫)

কাঙ্খিত ফলন: ৩০০ ± ৩০ কেজি/গাছ/বছর (২০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ/ বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টা হাইড্রেট)	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	২০০	-	১১১	-	৪১	১৫
০-১	১৩০	১০০	১২০	-	৭	-	৫
২-৩	২৬১	২০০	২০০	৩৩	৯	-	৬
৪-৫	৩৭০	৩০০	২৪০	৬৭	১৭	১৮	৭
৬-৭	৬০৯	৫০০	৩৬০	১৩৩	১৭	১৮	৮
৮-১০	৮৪৮	৭০০	৪৮০	২০০	২৬	২৯	৯
১১-১৫	১০৮৭	৯০০	৬০০	২৬৭	২৬	২৯	১০
১৬-২০	১৩২৬	১১৫০	৭২০	৩৫৬	৩৫	৪১	১১
> ২০	১৫৬৫	১৪০০	৮০০	৪৪৪	৪৪	৫৩	১২

প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈবসার এবং টিএসপি, এমওপি. জিপসাম, দস্তা ও বোরন সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত সারের অর্ধেক ফল পাড়ার পর আষাঢ় মাসে এবং বাকি অর্ধেক আশ্বিন মাসে গাছের গোড়া থেকে ৩-৪ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।