কফি

(জাতঃ বারি কফি-১, এবং অন্যান্য জাত)

প্রতিবার/গাছের বয়স (বছর)	সুপারিশকৃত সার (গ্রাম/গাছ)				সুপারিশকৃত সার (গ্রাম/শতক)		
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জৈব সার/পঁচা গোবর	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	জিংক সালফেট (মনো)	বোরিক এসিড
১-৩ বছর	১৭-২০ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	৩ কেজি	২০০ গ্রাম	৭০ গ্রাম	২০ গ্রাম
৪ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী	৪০-৪৫ গ্রাম	৩০-৩৫ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম	৫ কেজি	২৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	২৫ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

মূখ্য ও গৌণ পুষ্টি উৎপাদন উভয়ে কফি গাছের বৃদ্ধি ও গুণগতমান সম্পন্ন ফল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। প্রাথমিকভাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম কফি গছের অত্যাবশকীয় উপাদান। তবে অল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সালফার গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। খুব সামান্য পরিমাণ মূখ্য উপাদান বিশেষ করে জিংক ও বোরণ সার প্রয়োজন হয়। গুণগতমান সম্পন্ন কফি উৎপাদনে নিন্মোক্ত উপাদান সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফসফরাস, সালফার, বোরন, কপার এবং মলিবডেনাম ফুল আসার ৪৫ দিন পরে এবং দানা/ফল গঠন শুরু হলে, জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন হয়।

দানা/ফল ক্রমাগত শক্ত হতে থাকা অবস্থায় গাছের প্রধানতঃ

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। ফুল ফোটার প্রায় ৭ মাস পরে ফল পাকা শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফসফরাস, পটাসিয়াম, বোরন এবং মলিবডেনাম, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে সারের পরিমাণ, মাটির ধরণ, মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থের পরিমাণ, গাছের, বৃদ্ধি, ফল ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বছরের ৪ বার গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সাধারণত এরাবিকা জাতে চেয়ে রোবাস্টা জাতে সার কম লাগে। মার্চ (ফুল ফোটার পূর্বে), মে (ফুল ফোটার পরে), আগস্ট (দানা/ফল গঠণের পর) এবং অক্টোবর (ফল পাকার পূর্বে) মাসে বছরে মোট ৪ বার সার প্রয়োগ ভাল ফলন পাওয়া যায়।