গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

জাম্বুরা/ বাতাবি লেবু গাছের সার সুপারিশ

জাম্বুরা/বাতাবি লেবু

(জাতঃ বারি বাতাবি লেবু-১, বারি বাতাবি লেবু-২, বারি বাতাবি লেবু-৩, বারি বাতাবি লেবু-৪, বারি বাতাবি লেবু-৫, বারি বাতাবি লেবু-৬, বিএইউ জাম্বুরা-১, বিএইউ জাম্বুরা-২, বিএইউ জাম্বুরা-৩)

কাঙ্খিত ফলনঃ ১২০ ± ১২ কেজি/গাছ (১৫ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টা হাইড্রেট)	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	৩০০	১০০	২৫২	-	-	১৫
১-২	২১৭	২০০	১৮০	১১২	২৪	১২	১০
৩-৪	৩২৬	২৫০	৩২০	১৪০	২৪	১২	১৫
৫-৭	৫৪৩	৩৭৫	৫০০	১৬৮	৯৫	২৯	২০
৮-১০	৬৫১	৫০০	৫৫০	২২৪	৯৫	৩৫	২৫
১১-১৫	৭৬০	৬০০	৭০০	২৮০	১১৯	৪৭	৩০
>১৫	৯৭৭	৭৫০	৮০০	৩৩৬	১১৯	৫৯	৩৫

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত সকল সার সমান ৩ ভাগে ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন-কার্তিক মাসে গাছের গোড়া থেকে দেড় থেকে ৩ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে খুঁটি দিয়ে ড্রিল করে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৩. অধিক অম্ল মাটিতে ৩-৪ বছর অন্তর মাটিতে জো থাকা অবস্থায় গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম ডলোচুন প্রয়োগ করে মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ফল সংগ্রহের পর চুন প্রয়োগ করা উত্তম। বর্ষাকালে চুন প্রয়োগ করা যাবে না।