গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

কাঁঠাল গাছের সার সুপারিশ

কাঁঠাল

(জাত: বারি কাঁঠাল-১, বারি কাঁঠাল-২, বারি কাঁঠাল-৩, বারি কাঁঠাল-৪, বারি কাঁঠাল-৫, বারি কাঁঠাল-৬, বিএইউ কাঁঠাল-১)

কাঙ্খিত ফলন: ১০০০ ± ১০০ কেজি/গাছ (২০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ /বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টা হাইড্রেট)	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	৫০০	২৫০	১৯৬	-	-	২৫
০-১	৩২৬	৩৭৫	৩০০	১১২	১০	-	-
২-৪	৫৪৩	৫০০	৫০০	১৬৮	১৯	-	১৫
৫-৭	৭৬০	৭৫০	৭০০	১৯৬	১৯	১২	২০
৮-১০	৯৭৭	১০০০	৯০০	২৫২	২৯	২৪	২৫
১১-১৫	১৩০২	১৪০০	১১০০	৩৩৬	৩৩	২৯	৩০
১৬-২০	১৬২৮	১৫০০	১৩০০	৫০৪	৩৮	৪৭	৩৫
> ২০	১৭৩৬	২০০০	১৫০০	৫৬০	৪৮	৫৯	৪০

প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈবসার এবং টিএসপি, এমওপি. জিপসাম, দস্তা ও বোরন সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত সারের অর্ধেক ফল পাড়ার পর আষাঢ় মাসে এবং বাকি অর্ধেক আশ্বিন মাসে গাছের গোড়া থেকে ৩-৪ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।