গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

লংগান/ আঁশফল গাছের সার সুপারিশ

লংগান

(জাত: বারি আঁশফল-১, বারি আঁশফল-২, বিএইউ লংগান-১ ও বিএইউ লংগান-২)

কাঙ্খিত ফলন: ৫০ ± ৫ কেজি/গাছ/বছর (১০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবস (কেজি/ /বছর
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টাহাইড্রেট)	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	০	১৫০	৪০	০	০	০	১০
০-১	৩২৬	২৫০	২০০	৮৪	০	১২	১০
২-৪	৪৩৪	৩৭৫	৩০০	১১২	২৪	২৯	১৫
৫-৭	৫৪৩	৫০০	৪০০	১৯৬	২৪	২৯	২০
৮-১০	৭৬০	৭৫০	৬০০	২২৪	৩৮	৪৭	২০
>১০	৮৬৮	১০০০	৭০০	২৮০	৪৮	৪৭	২৫

প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত সার সমান ২ ভাগে বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে গাছের গোড়া থেকে ৩ থেকে সাড়ে ৪ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে খুঁটি দিয়ে ড্রিল করে সার প্রয়োগ করতে হবে।