গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

নারিকেল গাছের সার সুপারিশ

{ জাত ঃ ডুর্য়াব (খাটো) জাতের নারিকেল}

ফলন মাত্রা ঃ ৬০±৮টি/গাছ/বছর

গাছের বয়স (বছর)	সারের পরিমান (গ্রাম/চারা/বছর)						কম্পোস্ট (কেজি/গর্ত/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট মনো	বরিক এসিড	
রোপনের পূর্বে	-	৩০০	-	-	১০০	৬০	৪০
১-৪	১৮০	১৫০	৫০০	২০০	৩০	১৫	১৫
৫-৭	৩৫০	২৫০	৮০০	৩০০	৪০	২০	১৫
৮-১০	৬০০	৪৫০	১৫০০	৫৫০	৬০	৩০	২৫
১১-১৫	৮০০	৬০০	২০০০	৪৫০	৮০	৪০	৩০
১৬-২০	১০০০	৮০০	২৫০০	৫০০	১০০	৫০	৪০
২০বছরের বেশী	১২০০	১০০০	৩০০০	৬০০	১৫০	৬০	৫০

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

(ক) বেসাল ডোজ অবশ্যই চারা লাগানোর কমপক্ষে ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

(খ) বৃদ্ধিশীল গাছ সুপারিশকৃত সার সমান ২ ভাগে এপ্রিল-মে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারার চর্তুদিকে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

(গ) সার প্রয়োগের পর চাষ ও সেচ দিতে হবে।

(ঘ) কম্পোস্ট সার হিসাবে ভার্মি/ট্রাইকোডার্মা কম্পোস্ট ব্যবহার অধিক ফলদায়ক হবে।