গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

প্যাশন ফলের সার সুপারিশ
(জাত ঃ বেগুনি এবং হলুদ জাত)

গাছের বয়স (বছর)	সারের পরিমান (গ্রাম/চারা/বছর)						গোবর (কেজি/গর্ত/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট হেপ্টা	বরিক এসিড	
রোপনের পূর্বে	-	২০০	১০০	-	২৫	২০	১২-১৫
প্রতি বছর	২৫০	২০০	২০০	-	২০	-	১০-১৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

(ক) বেসাল ডোজ অবশ্যই চারা লাগানোর কমপক্ষে ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

(খ) ইউরিয়া সাধারণত তিন দফায় ভাগ করে দেওয়া ভালো, টিএসপি রোপণের সময় এবং এমওপি ফুল ফোটার আগে দেওয়া শ্রেয়।