গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

কুল (সব) গাছের সার সুপারিশ

কুল

(জাত: বারি কুল-১, বারি কুল-২, বারি কুল-৩, বারি কুল-৪, বারি কুল-৫)

কাঙ্খিত ফলন: ১৬০ ± ১৬ কেজি/শতাংশ/বছর (৮ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)					জৈবসার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	৩০০	২৫০	৫৬	-	৫
০-১	৩০৪	২৫০	২৫০	৮৪	০	২
২-৪	৬৯৪	৫০০	৬০০	১১২	২৯	২.৫
৫-৭	৮৬৮	৮০০	৮০০	১৪০	২৯	৩
৮-১০	১০৮৫	১০০০	১১০০	১৬৮	২৯	৪
১১-১৫	১১৯৪	১২৫০	১২০০	২২৪	৫৯	৪
১৬-২০	১৩৪৫	১৪০০	১৩০০	২২৪	৫৯	৫
>১৫	১৬২৮	১৭৫০	১৫০০	২৮০	৫৯	৫

প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত জৈবসারসহ সকল সার সমান ৩ ভাগে ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছের গোড়া থেকে ৩-৪ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারে জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

কুল

(জাত: বিএইউ কুল-১, বিএইউ কুল-২, বিএইউ কুল-৩)

কাঙ্খিত ফলন: ২০০ ± ২০ কেজি/শতাংশ/বছর (৪ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)					জৈবসার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	২০০	-	-	-	১৫
০-১	২৬১	৩০০	৩০০	১০০	৪	৭
২-৪	৫২২	৪৫০	৪৫০	১৩৩	৯	১০
>৪	৭৮৩	৬০০	৬০০	২০০	১৩	১৫

প্রয়োগ পদ্ধতি: বারি কুল গাছের মত একই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।