গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

২০. ছাদবাগানের সার ব্যবস্থাপনা

আম

(জাত: বারি আম-৩ (আম্রপালি), বারি আম-৪, বারি আম-১১)

কাঙ্খিত ফলন: ৩০০ ± ৩০ কেজি/গাছ/বছর (২০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টা হাইড্রেট)	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	০	১৫০	৪০	০	০	০	০
১-২	১২২	১২৫	৭০	৫৬	১৯	১৮	১০
৩-৪	১৫২	১৬০	৮০	৮৪	২৯	২৯	১০
৫-৬	১৮৪	২০০	৯০	১১২	৩৮	২৯	১০
৭-৮	২০৬	২২৫	১০০	১৪০	৪৮	৪৭	১০
>৯	২৬০	৩০০	১৫০	১৯৬	৫৭	৫৯	১০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

- চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার পটের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।
- পটের আকার: ১৮-২০″ x ১৮-২০″।
- চারা লাগানোর পর সার সমান ৪ কিস্তিতে ভাদ্র-আশ্বিন, অগ্রহায়ন-পৌষ, ফাল্গুন-চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার সমান ২ কিস্তিতে সেপ্টেম্বর, ও মার্চ মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে পটের কিছু মাটি বদলাতে হবে।