গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা ফসলের সার সুপারিশ
(বরবটি, ঢেঁড়শ, টমেটো, হলুদ ও মরিচ)

সবজি/মসলা ফসল	অনুমোদিত সারের মাত্রা (গ্রাম/১০০ বর্গ ফুট)					
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (হেপ্টাহাইড্রেট)	বোরিক এসিড
বরবটি	৪০	৭৩	৩০	২৬	১.৮৫	৪.১৭
ঢেঁড়শ	৮৫	৭৩	২১	২২	১.৮৫	৪.১৭
গ্রীষ্মকালীন টমেটো	১১২	১৫৬	৩৫	২২	১.৮৫	৪.১৭
মসলা ফসল						
হলুদ	৮৮	৮৩	৯৭	৪৪	-	৬.১১
মরিচ	৪৪	১৯৮	৪৪	২২	১.৮৫	৪.১৭

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

অনুমোদিত মাত্রার সকল সার (দস্তা সার বাদে) লাউ, হলুদ ও মরিচে সমান ৬ ভাগে এবং উল্লিখিত অন্যান্য ফসলে সমান ৫ ভাগে চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১০ দিন পর পর ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে গাছের চারপাশে বেডে প্রয়োগ করতে হবে। ২৫-৩০ গ্রাম দস্তা (জিংক সালফেট) সার ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে স্প্রে করে পাতায় প্রয়োগ করতে হবে। হলুদে ১৫ দিন পর পর সার প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়ে সার ধুয়ে গেলে সারের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভাসমান বেডে চারা তৈরি করতে কোন সার ব্যবহার কর যাবে না, করলে চারা দুর্বল হবে ও রোপনের পর চারা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে। ভাসমান বেডে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা ঠিক নয়; এতে বেডের পচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ও বেডের আয়ুস্কাল কমে যায়।