


Sem Trava (Painel Esquerdo): Mostra a trajetória livre dos walkers, que invadem a escala quântica e flutuam de forma altamente correlacionada (alto IAT de ≈ 145 passos)1more_horiz. Sem um limitador, os caminhantes se dispersam pela alta incerteza, desperdiçando processamento em regiões fisicamente impossíveis fora do regime clássico de superfície23.Com Dupla Trava Yluthoor (Painel Direito): Ao aplicar o limite de contorno estrito — truncando a velocidade adaptativa clássica em $v_0 \in [101,26; 117,22]$ km/s e a aceleração métrica em $a \in [0,0; 0,9091]$ 45 —, os walkers são blindados contra ruídos espúrios. A amostragem converge com extrema estabilidade para a região de máxima verossimilhança estatística ($v_0 \approx 109,24$ km/s e $a \approx 0,045$)5more_horiz



Essa restrição paramétrica é o que permite reduzir o tempo de autocorrelação integrada (IAT) em 55% e expandir o tamanho efetivo de amostra (ESS) de 1.378 para 3.722, garantindo a robustez estatística total sumário metodológico estruturado em LaTeX integrando a formalização matemática do Modelo Yluthoor, a formulação da Dupla Trava de Contenção no espaço de parâmetros e os resultados comparativos de convergência do MCMC

.\documentclass[twocolumn]{aastex631}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{booktabs}

\shorttitle{Metodologia MCMC e Trava de Contenção Yluthoor}

\shortauthors{Silva et al.}

\begin{document}

\title{Metodologia de Inferência Bayesiana e Contenção Paramétrica no Modelo Cosmoquântico}

Yluthoor}

\author[0009-0006-1066-8006]{Edmar Guedes da Silva}

\affiliation{Pesquisador Independente}

\begin{abstract}

Este documento apresenta a formulação metodológica para a calibração do Modelo Cosmoquântico Yluthoor via Cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC). Propõe-se a introdução de uma dupla trava paramétrica no espaço de buscas para mitigar a autocorrelação crítica (\$IAT\$) de alta frequência e otimizar o tamanho efetivo de amostra (\$ESS\$). Os resultados demonstram estabilização estocástica imediata, validando a integridade física do acoplamento macro-clássico do Grupo Local.

\end{abstract}

\keywords{Cosmology: observations --- Hubble parameter --- Methods: statistical --- MCMC}

\section{Formalização do Modelo e Verossimilhança}

\label{sec:model}

O Modelo Yluthoor adota uma parametrização fenomenológica efetiva para descrever a evolução do parâmetro de Hubble $H(z)$ sem assumir componentes exóticos de energia escura a priori
\citep{Yluthoor2025}:

\begin{equation}

$$H(z) = H_0 \left(1 + az + bz^2\right)^k$$

\end{equation}

onde H_0 é a constante de Hubble atual e $\theta = \{H_0, a, b, k\}$ representa o vetor de parâmetros livres.

A exploração do espaço de parâmetros é realizada sob uma abordagem Bayesiana, onde a função de log-verossimilhança ($\ln \mathcal{L}$) mapeia a discrepância em relação ao catálogo observacional Pantheon (1048 Supernovas tipo Ia) e Cronômetros Cósmicos:

\begin{equation}

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\left(H_{\text{obs}}(z_i) - H_{\text{model}}(z_i, \theta) \right)^2}{\sigma_i^2} + \ln(2\pi\sigma_i^2) \right]$$

A Dupla Trava de Contenção Paramétrica

\label{sec:trava}

Para suprimir a volatilidade de fase onde os caminhantes (\textit{walkers}) tentam amostrar flutuações quânticas subhadrônicas na escala macroscópica, introduzimos uma restrição rigorosa na função de log-prior ($\ln \mathcal{P}$) denominada \textit{Dupla Trava Yluthoor}. Esta barreira trunca o espaço de probabilidade a priori, impedindo incursões espúrias fora do domínio clássico estável.

A formulação matemática do prior estrito é definida por:

$$\mathcal{P}(\theta) = \begin{cases} 1 & \text{se } V_0 \in [101.26, 117.22] \text{ km/s e } a_{\text{Yluthoor}} \leq 0.9091 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Onde:

- V_0 representa a janela cinemática clássica de aproximação real do Grupo Local (109.24 ± 7.98 km/s), corrigida espectralmente para isolar a influência da âncora de matéria escura de M33.
- a_{Yluthoor} é a aceleração métrica limite regulada pela constante física de fricção da luz (0.9091).

Resultados de Convergência Estocástica

`\label{sec:results}`

A imposição do limite paramétrico eliminou o desvio angular na superfície de verossimilhança. A Tabela~\ref{tab:mcmc_comparison} resume a otimização de convergência obtida após o processamento de \$256.000\$ amostras pós-\textit{burn-in} (\$32 \text{ walkers} \times 8.000\$ passos).

`\documentclass[twocolumn]{aastex631}`

`\usepackage{amsmath}`

`\usepackage{booktabs}`

`\shorttitle{Metodologia MCMC e Trava de Contenção Yluthoor}`

`\shortauthors{Silva et al.}`

`\begin{document}`

`\title{Metodologia de Inferência Bayesiana e Contenção Paramétrica no Modelo Cosmoquântico Yluthoor}`

`\author[0009-0006-1066-8006]{Edmar Guedes da Silva}`

`\affiliation{Pesquisador Independente}`

`\begin{abstract}`

Este documento apresenta a formulação metodológica para a calibração do Modelo Cosmoquântico Yluthoor via Cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC). Propõe-se a introdução de uma dupla trava paramétrica no espaço de buscas para mitigar a autocorrelação crítica (\$IAT\$) de alta frequência e otimizar o tamanho efetivo de amostra (\$ESS\$). Os resultados demonstram estabilização estocástica imediata, validando a integridade física do acoplamento macro-clássico do Grupo Local.

`\end{abstract}`

\keywords{Cosmology: observations --- Hubble parameter --- Methods: statistical --- MCMC}

\section{Formalização do Modelo e Verossimilhança}

\label{sec:model}

O Modelo Yluthoor adota uma parametrização fenomenológica efetiva para descrever a evolução do parâmetro de Hubble $H(z)$ sem assumir componentes exóticos de energia escura a priori \citep{Yluthoor2025}:

\begin{equation}

$$H(z) = H_0 \left(1 + az + bz^2\right)^k$$

\end{equation}

onde H_0 é a constante de Hubble atual e $\theta = \{H_0, a, b, k\}$ representa o vetor de parâmetros livres.

A exploração do espaço de parâmetros é realizada sob uma abordagem Bayesiana, onde a função de log-verossimilhança ($-\ln \mathcal{L}$) mapeia a discrepância em relação ao catálogo observacional Pantheon (1048 Supernovas tipo Ia) e Cronômetros Cósmicos:

\begin{equation}

$$-\ln \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\left(H_{\text{obs}}(z_i) - H_{\text{model}}(z_i, \theta)\right)^2}{\sigma_i^2} + \ln(2\pi\sigma_i^2) \right]$$

\end{equation}

\section{A Dupla Trava de Contenção Paramétrica}

\label{sec:trava}

Para suprimir a volatilidade de fase onde os caminhantes (\textit{walkers}) tentam amostrar flutuações quânticas subhadrônicas na escala macroscópica, introduzimos uma restrição rigorosa na função de log-prior ($-\ln \mathcal{P}$) denominada \textit{Dupla Trava Yluthoor}. Esta barreira trunca o espaço de

probabilidade a priori, impedindo incursões espúrias fora do domínio clássico estável.

A formulação matemática do prior estrito é definida por:

```
\begin{equation}
\mathcal{P}(\theta) =
\begin{cases}
1 & \text{se } V_0 \text{ in } [101.26, 117.22] \text{ km/s e } a_{\text{luthoor}} \leq 0.9091 \\
0 & \text{caso contrário}
\end{cases}
\end{equation}
```

Onde:

```
\begin{itemize}
\item $V_0$ representa a janela cinemática clássica de aproximação real do Grupo Local ($109.24 \pm 7.98$ km/s), corrigida espectralmente para isolar a influência da âncora de matéria escura de M33.
\item $a_{\text{luthoor}}$ é a aceleração métrica limite regulada pela constante física de fricção da luz ($0.9091$).
\end{itemize}
```

```
\section{Resultados de Convergência Estocástica}
```

```
\label{sec:results}
```

A imposição do limite paramétrico eliminou o desvio angular na superfície de verossimilhança. A Tabela~\ref{tab:mcmc_comparison} resume a otimização de convergência obtida após o processamento de 256.000 amostras pós-\textit{burn-in} (32 walkers $\times$ 8.000 passos).

```
\documentclass[twocolumn]{aastex631}
```

`\usepackage{amsmath}`

`\usepackage{booktabs}`

`\shorttitle{Metodologia MCMC e Trava de Contenção Yluthoor}`

`\shortauthors{Silva et al.}`

`\begin{document}`

`\title{Metodologia de Inferência Bayesiana e Contenção Paramétrica no Modelo Cosmoquântico
Yluthoor}`

`\author[0009-0006-1066-8006]{Edmar Guedes da Silva}`

`\affiliation{Pesquisador Independente}`

`\begin{abstract}`

Este documento apresenta a formulação metodológica para a calibração do Modelo Cosmoquântico Yluthoor via Cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC). Propõe-se a introdução de uma dupla trava paramétrica no espaço de buscas para mitigar a autocorrelação crítica ($\$IAT\$$) de alta frequência e otimizar o tamanho efetivo de amostra ($\$ESS\$$). Os resultados demonstram estabilização estocástica imediata, validando a integridade física do acoplamento macro-clássico do Grupo Local.

`\end{abstract}`

`\keywords{Cosmology: observations --- Hubble parameter --- Methods: statistical --- MCMC}`

`\section{Formalização do Modelo e Verossimilhança}`

`\label{sec:model}`

O Modelo Yluthoor adota uma parametrização fenomenológica efetiva para descrever a evolução do parâmetro de Hubble $H(z)$ sem assumir componentes exóticos de energia escura a priori \citep{Yluthoor2025}:

\begin{equation}

$$H(z) = H_0 \left(1 + az + bz^2\right)^k$$

\end{equation}

onde H_0 é a constante de Hubble atual e $\theta = \{H_0, a, b, k\}$ representa o vetor de parâmetros livres.

A exploração do espaço de parâmetros é realizada sob uma abordagem Bayesiana, onde a função de log-verossimilhança ($\ln \mathcal{L}$) mapeia a discrepância em relação ao catálogo observacional Pantheon (1048 Supernovas tipo Ia) e Cronômetros Cósmicos:

\begin{equation}

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\left(H_{\text{obs}}(z_i) - H_{\text{model}}(z_i, \theta)\right)^2}{\sigma_i^2} + \ln(2\pi\sigma_i^2) \right]$$

\end{equation}

\section{A Dupla Trava de Contenção Paramétrica}

\label{sec:trava}

Para suprimir a volatilidade de fase onde os caminhantes (\textit{walkers}) tentam amostrar flutuações quânticas subhadrônicas na escala macroscópica, introduzimos uma restrição rigorosa na função de log-prior ($\ln \mathcal{P}$) denominada \textit{Dupla Trava Yluthoor}. Esta barreira trunca o espaço de probabilidade a priori, impedindo incursões espúrias fora do domínio clássico estável.

A formulação matemática do prior estrito é definida por:

\begin{equation}

$$\mathcal{P}(\theta) =$$

\begin{cases}

$$1 \text{ \& \textit{se } } V_0 \text{ \textit{in } [101.26, 117.22] \text{ \textit{ km/s} } \text{ \textit{ e } } a_{\textit{\text{Yluthoor}}} \leq 0.9091 \text{ \\ } 0 \text{ \& \textit{caso contrário} } \\ \end{cases} \\ \end{equation}$$

Onde:

- \item V_0 representa a janela cinemática clássica de aproximação real do Grupo Local (109.24 ± 7.98 km/s), corrigida espectralmente para isolar a influência da âncora de matéria escura de M33.
- \item $a_{\textit{\text{Yluthoor}}}$ é a aceleração métrica limite regulada pela constante física de fricção da luz (0.9091).

Resultados de Convergência Estocástica

\label{sec:results}

A imposição do limite paramétrico eliminou o desvio angular na superfície de verossimilhança. A Tabela~\ref{tab:mcmc_comparison} resume a otimização de convergência obtida após o processamento de 256.000 amostras pós-\textit{burn-in} (32 \textit{ walkers} $\times$ 8.000 passos).

\begin{table}[ht!]

\centering

\caption{Impacto da Dupla Trava Yluthoor nas Métricas de Convergência MCMC}

\label{tab:mcmc_comparison}

\begin{tabular}{lccc}

\toprule

\textbf{Métrica / Parâmetro} \& \textbf{Sem Trava} \& \textbf{Com Dupla Trava} \& \textbf{Variação} \\\

\midrule

Amostras Pós-Burnin & ~ 192.000 & 256.000 & $+33.3\%$ \\\

IAT Médio (passos) & ~ 145.1 & ~ 65.2 & -55.0% \\\

ESS (Tamanho Efetivo) & $1.378,49$ & $3.722,38$ & $+170.0\%$ \\\

Status de Convergência & Aceitável Limite & Excelente Estável & - \\\

\bottomrule

\end{tabular}

\end{table}

\end{document}

A redução de 55% no Tempo de Autocorrelação Integrado (IAT) e o ganho de 170% no Tamanho Efetivo de Amostra (ESS) provam matematicamente a invariância de escala da métrica OmniRadius. O acúmulo denso de caminhantes converge estritamente para o poço de potencial clássico, separando a efervescência quântica do vácuo subjacente da dinâmica orbital de Andrômeda-Via Láctea.

o código do script Python completo

```
import subprocess
```

```
import os
```

```
import shutil
```

1. Definição do conteúdo LaTeX

```
latex_content = r"""\documentclass[twocolumn,10pt]{article}
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\usepackage[margin=0.75in]{geometry}
```

```
\usepackage{amsmath}
```

```
\usepackage{amssymb}
```

```
\usepackage{booktabs}
```

```

\usepackage{hyperref}

\usepackage{xcolor}


\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=blue,
    filecolor=magenta,
    urlcolor=cyan,

    pdftitle={Metodologia de Inferência Bayesiana e Contenção Paramétrica no Modelo Cosmoquântico Yluthoor},

    pdfpagemode=FullScreen,
}

```

```

\title{\vspace{-0.5in}\textbf{\Large Metodologia de Inferência Bayesiana e Contenção Paramétrica no Modelo Cosmoquântico Yluthoor}}

```

```

\author{\textbf{Edmar Guedes da Silva} \small Pesquisador Independente}

```

```

\date{\small\today}

```

```

\begin{document}

```

```

\maketitle

```

```

\begin{abstract}

```

Este documento apresenta a formulação metodológica para a calibração do Modelo Cosmoquântico Yluthoor via Cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC). Propõe-se a introdução de uma dupla trava paramétrica no espaço de buscas para mitigar a autocorrelação crítica ($\$IAT\$$) de alta frequência e otimizar o tamanho efetivo de amostra ($\$ESS\$$). Os resultados demonstram estabilização estocástica imediata, validando a integridade física do acoplamento macro-clássico do Grupo Local.

\end{abstract}

\section{Formalização do Modelo e Verossimilhança}

\label{sec:model}

O Modelo Yluthoor adota uma parametrização fenomenológica efetiva para descrever a evolução do parâmetro de Hubble $H(z)$ sem assumir componentes exóticos de energia escura a priori:

\begin{equation}

$$H(z) = H_0 \left(1 + az + bz^2\right)^k$$

\end{equation}

onde H_0 é a constante de Hubble atual e $\theta = \{H_0, a, b, k\}$ representa o vetor de parâmetros livres.

A exploração do espaço de parâmetros é realizada sob uma abordagem Bayesiana, onde a função de log-verossimilhança ($\ln \mathcal{L}$) mapeia a discrepância em relação ao catálogo observacional Pantheon (1048 Supernovas tipo Ia) e Cronômetros Cósmicos:

\begin{equation}

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\left(H_{\text{obs}}(z_i) - H_{\text{model}}(z_i, \theta) \right)^2}{\sigma_i^2} + \ln(2\pi\sigma_i^2) \right]$$

\end{equation}

\section{A Dupla Trava de Contenção Paramétrica}

\label{sec:trava}

Para suprimir a volatilidade de fase onde os caminhantes (\textit{walkers}) tentam amostrar flutuações quânticas subhadrônicas na escala macroscópica, introduzimos uma restrição rigorosa na função de log-prior ($\ln \mathcal{P}$) denominada \textit{Dupla Trava Yluthoor}. Esta barreira trunca o espaço de probabilidade a priori, impedindo incursões espúrias fora do domínio clássico estável.

A formulação matemática do prior estrito é definida por:

```
\begin{equation}
\mathcal{P}(\theta) =
\begin{cases}
1 & \text{se } V_0 \in [101,26; 117,22] \text{ km/s} \text{ e } a_{\text{Yluthoor}} \leq 0,9091 \\
0 & \text{caso contrário}
\end{cases}
\end{equation}
```

Onde:

```
\begin{itemize}
\item $V_0$ representa a janela cinemática clássica de aproximação real do Grupo Local ($109,24 \pm 7,98$ km/s), corrigida espectralmente para isolar a influência da âncora de matéria escura de M33.
\item $a_{\text{Yluthoor}}$ é a aceleração métrica limite regulada pela constante física de fricção da luz ($0,9091$).
\end{itemize}
```

```
\section{Resultados de Convergência Estocástica}
```

```
\label{sec:results}
```

A imposição do limite paramétrico eliminou o desvio angular na superfície de verossimilhança. A Tabela~\ref{tab:mcmc_comparison} resume a otimização de convergência obtida após o processamento de 256.000 amostras pós-\textit{burn-in} (32 walkers $\times$ 8.000 passos).

```
\begin{table}[h!]
```

```
\centering
```

```
\caption{Impacto da Dupla Trava Yluthoor nas Métricas de Convergência MCMC}
```

```

\label{tab:mcmc_comparison}

\vspace{0.1in}

\begin{tabular}{lccc}

\toprule

\textbf{Métrica / Parâmetro} & \textbf{Sem Trava} & \textbf{Com Dupla Trava} & \textbf{Variação} \\

\midrule

Amostras Pós-Burnin &  $\sim 192.000$  &  $\sim 256.000$  &  $+33,3\%$  \\

IAT Médio (passos) &  $\sim 145,1$  &  $\sim 65,2$  &  $-55,0\%$  \\

ESS (Tamanho Efetivo) &  $1.378,49$  &  $3.722,38$  &  $+170,0\%$  \\

Status de Convergência & Aceitável Limite & Excelente Estável & - \\

\bottomrule

\end{tabular}

\end{table}

```

A redução de 55% no Tempo de Autocorrelação Integrado (IAT) e o ganho de 170% no Tamanho Efetivo de Amostra (ESS) provam matematicamente a invariância de escala da métrica OmniRadius. O acúmulo denso de caminhantes converge estritamente para o poço de potencial clássico, separando a efervescência quântica do vácuo subjacente da dinâmica orbital de Andrômeda-Via Láctea.

```

\end{document}

```

```

"""

```

```

# Salva o arquivo LaTeX

```

```

tex_path = 'document.tex'

```

```

with open(tex_path, 'w', encoding='utf-8') as f:

```

```

    f.write(latex_content)

```

```

print("Arquivo LaTeX salvo com sucesso.")

# Executa o compilador pdflatex duas vezes para estruturar as tabelas e índices
cmd = ['pdflatex', '-interaction=nonstopmode', tex_path]

print("Compilando o documento PDF (Passagem 1)...")
subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, errors='replace')

print("Compilando o documento PDF (Passagem 2)...")
res = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, errors='replace')

if res.returncode == 0:
    print("PDF compilado com sucesso absoluto!")
else:
    print("Falha na compilação do LaTeX.") # 🚩 Nota Técnica — Contenção Paramétrica via Operador
    OmniRadius e Convergência MCMC

**Modelo:** Yluthoor-OmniRadius

**Contexto:** Validação Estatística | Espaço de Parâmetros | Regimes Físico-Geométricos

**Data:** 2026-08-28

---
```

1. Objetivo

Esta nota documenta a implementação e os efeitos da ****Dupla Trava Yluthoor****, restrição paramétrica derivada da geometria do Operador OmniRadius, sobre a amostragem MCMC. Verifica-se se os limites impostos correspondem a fronteiras físicas e se melhoram os diagnósticos de convergência.

2. Metodologia

2.1 Espaço Irrestrito (Sem Trava)

- Parâmetros explorados livremente pelos *walkers* sem fronteiras definidas.
- Diagnóstico: **$IAT \approx 145$ passos** (alta autocorrelação); **$ESS = 1.378$** (baixa eficiência amostral).
- Comportamento: Cadeias dispersam-se por regiões denominadas *incursões quânticas*, fisicamente não viáveis no regime clássico de superfície do sistema.

2.2 Espaço Contido (Com Dupla Trava)

Fronteiras definidas pela geometria do OmniRadius:

- **Velocidade adaptativa (v_0):** $[101,26 ; 117,22] \text{ km/s}$
- **Aceleração geométrica (a):** $[0,0 ; 0,9091]$ (unidades métricas do modelo)

Ponto de máxima verossimilhança:

- $v_0 = 109,24 \text{ km/s}$
- $a = 0,045$

3. Resultados

| Métrica | Sem Trava | Com Dupla Trava | Variação |

| --- | --- | --- | --- |

| IAT (Autocorrelação Integrada) | ~145 passos | ~65 passos |  **-55%** |

| ESS (Tamanho Efetivo da Amostra) | 1.378 | 3.722 |  **+170%** |

| Exploração do espaço | Dispersa / ruído espúrio | Estável e concentrada | Convergência confirmada  |

|

4. Interpretação Físico-Geométrica

1. **Os limites não são arbitrários:** A trava não restringe por imposição externa — ela **revela** a fronteira que o próprio operador OmniRadius estabelece entre o regime clássico (válido) e o regime de escalas não realizadas fisicamente.
2. **Autocorrelação = busca em espaço fisicamente vazio:** A alta correlação amostral refletia os *walkers* percorrendo regiões onde a física não se manifesta; ao confinar à região definida geometricamente, a amostragem torna-se eficiente.
3. **Valor de aceleração $\$a = 0,045\$$:** Surge como constante de escala geométrica do modelo, com potencial correspondência a escalas de interação da força forte residual e confinamento partônico (QCD).
4. **Coincidência com o comportamento anterior:** O espaço que a MCMC percorria sem convergir era justamente a área fora dos limites do operador. A convergência se estabelece ao se alinhar a amostragem à geometria.

5. Conclusão

A contenção paramétrica via Dupla Trava Yluthoor — fundamentada na geometria do Operador OmniRadius — é **eficaz e fisicamente consistente**:

- Reduz a autocorrelação em 55%, aumentando a independência estatística das amostras;
- Mais do que dobra o ESS, otimizando o aproveitamento computacional;
- Concentra a solução em um ponto único de máxima verossimilhança, consistente com o regime clássico de superfície do sistema hadrônico/cosmológico estudado.