

Lista 4 - P2

Matemática 1 - Prof.^a Rafaela Bonfim

20 de outubro de 2025

1. Reescreva os ângulos abaixo em radianos usando a forma $\frac{a\pi}{b}$, em que a e b são números naturais.

- | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (a) 15° | (c) 144° | (e) 225° | (g) 330° |
| (b) 72° | (d) 156° | (f) 290° | (h) 345° |

2. Converta para graus.

- | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| (a) $\frac{\pi}{5}$ | (c) $\frac{5\pi}{6}$ | (e) 2π | (g) 2 |
| (b) $\frac{3\pi}{4}$ | (d) $\frac{7\pi}{3}$ | (f) $\frac{\pi}{9}$ | (h) $0,8$ |

3. Encontre as coordenadas (x, y) dos pontos da circunferência unitária associados aos arcos abaixo:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| (a) $\theta = \frac{\pi}{2}$ | (d) $\theta = \frac{7\pi}{6}$ | (g) $\theta = \frac{4\pi}{5}$ |
| (b) $\theta = \frac{3\pi}{2}$ | (e) $\theta = \frac{2\pi}{3}$ | (h) $\theta = -\frac{\pi}{3}$ |
| (c) $\theta = -\pi$ | (f) $\theta = \frac{-3\pi}{4}$ | (i) $\theta = \frac{7\pi}{4}$ |

4. Determine os ângulos de referência associados aos ângulos abaixo.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (a) $\theta = 85^\circ$ | (c) $\theta = 168^\circ$ | (e) $\theta = 292^\circ$ |
| (b) $\theta = 100^\circ$ | (d) $\theta = 250^\circ$ | (f) $\theta = 345^\circ$ |

5. Determine os ângulos de referência associados aos ângulos abaixo.


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (a) $\theta = \frac{3\pi}{7}$ | (c) $\theta = \frac{3\pi}{4}$ | (e) $\theta = \frac{4\pi}{3}$ |
| (b) $\theta = \frac{5\pi}{8}$ | (d) $\theta = \frac{7\pi}{6}$ | (f) $\theta = \frac{21\pi}{12}$ |

6. Sabendo que $\sin(30^\circ) = 1/2$, calcule $\sin(150^\circ)$, $\sin(210^\circ)$ e $\sin(330^\circ)$.


7. Sabendo que $\cos(60^\circ) = 1/2$, calcule $\cos(240^\circ)$, $\cos(300^\circ)$.

8. Sabendo que $\sin(45^\circ) = \cos(45^\circ) = \sqrt{2}/2$, calcule $\operatorname{tg}(45^\circ)$, $\operatorname{tg}(135^\circ)$ e $\operatorname{tg}(225^\circ)$.
9. Sabendo que $\sin(30^\circ) = 1/2$ e $\cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$, determine $\sec(150^\circ)$, $\operatorname{cosec}(150^\circ)$ e $\operatorname{cotg}(150^\circ)$.
10. Indique o quadrante de cada ângulo abaixo:
- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| (a) $\theta = 7\pi/4$ | (d) $\theta = -\pi/3$ | (g) $\theta = -5\pi/4$ |
| (b) $\theta = 6\pi/5$ | (e) $\theta = 8\pi/3$ | (h) $\theta = -18\pi/7$ |
| (c) $\theta = 3\pi/8$ | (f) $\theta = 14\pi/9$ | (i) $\theta = -19\pi/12$ |
11. Sem usar calculadora, mas apenas uma tabela com o seno, o cosseno e a tangente de $\theta \in \{30^\circ, 45^\circ, 60^\circ\}$, determine os valores abaixo:
- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (a) $\cos(225^\circ)$ | (d) $\cos(150^\circ)$ | (g) $\sin(240^\circ)$ |
| (b) $\cos(315^\circ)$ | (e) $\sin(330^\circ)$ | |
| (c) $\cos(120^\circ)$ | (f) $\sin(135^\circ)$ | (h) $\sin(300^\circ)$ |
12. Sem usar calculadora, mas apenas uma tabela com o seno, o cosseno e a tangente de $\theta \in \{30^\circ, 45^\circ, 60^\circ\}$, determine os valores abaixo:
- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (a) $\operatorname{tg}(120^\circ)$ | (d) $\cot(135^\circ)$ | (g) $\operatorname{tg}(330^\circ)$ |
| (b) $\sec(300^\circ)$ | (e) $\operatorname{cosec}(150^\circ)$ | |
| (c) $\operatorname{cosec}(240^\circ)$ | (f) $\sec(210^\circ)$ | (h) $\operatorname{cotg}(315^\circ)$ |
13. Sem usar calculadora, mas apenas uma tabela com o seno, o cosseno e a tangente de $\theta \in \{\pi/6, \pi/4, \pi/3\}$, determine os valores abaixo:
- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| (a) $\cos(3\pi/4)$ | (d) $\cos(11\pi/6)$ | (g) $\sin(2\pi/3)$ |
| (b) $\cos(4\pi/3)$ | (e) $\sin(7\pi/6)$ | |
| (c) $\cos(2\pi/3)$ | (f) $\sin(5\pi/6)$ | (h) $\sin(7\pi/4)$ |
14. Sem usar calculadora, mas apenas uma tabela com o seno, o cosseno e a tangente de $\theta \in \{0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ\}$, determine os valores abaixo:
- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| (a) $\operatorname{tg}(-45^\circ)$ | (c) $\sin(-225^\circ)$ | (e) $\cos(-150^\circ)$ |
| (b) $\sec(-120^\circ)$ | (d) $\operatorname{cosec}(-90^\circ)$ | (f) $\sin(1350^\circ)$ |
15. Sabendo que $\cos(\theta) = 3/5$, determine os possíveis valores de $\sin(\theta)$ e os quadrantes aos quais θ pode pertencer.
16. Sabendo que $\sin(\theta) = -3/4$, determine os possíveis valores de $\cos(\theta)$ e os quadrantes aos quais θ pode pertencer.

17. Sabendo que $\cos(\theta) = 1/3$, determine os possíveis valores de $\operatorname{tg}(\theta)$ e os quadrantes aos quais θ pode pertencer.
18. Sabendo que $\operatorname{tg}(\theta) = -1/5$ e que $\operatorname{sen}(\theta) < 0$, determine os valores de $\operatorname{sen}(\theta)$ e $\cos(\theta)$.
19. Sabendo que $\sec(\theta) = 5/3$ e que $\operatorname{sen}(\theta) > 0$, determine o valor de $\operatorname{cotg}(\theta)$.
20. Sabendo que $\operatorname{cosec}(\theta) = 3$ e que $\cos(\theta) < 0$, determine o valor de $\operatorname{tg}(\theta)$.
21. Sabendo que $\operatorname{sen}(\theta) = 1/4$ e que θ está no segundo quadrante, determine os valores de $\cos(\theta)$ e $\operatorname{tg}(\theta)$.
22. Sabendo que $\operatorname{cosec}(\theta) = -2$ e que θ está no quarto quadrante, determine os valores de $\cos(\theta)$ e $\operatorname{sen}(\theta)$.
23. A figura abaixo mostra o gráfico de uma função periódica. Determine o período da função



24. Suponha que f seja uma função ímpar e periódica, com período 10. O gráfico da função no intervalo $[0, 5]$ é dado abaixo.



- (a) Complete o gráfico de f no intervalo $[-10, 10]$.
 - (b) Calcule o valor de $f(99)$.
25. Determine se as funções abaixo são pares, ímpares ou não possuem simetria.

(a) $f(x) = x \cos(x)$

(c) $f(x) = x \sin(x)$

(b) $f(x) = x^2 \cos(x)$

(d) $f(x) = |x| \sin(x)$

26. Sabendo que $\sec(x) = \frac{5}{3}$ e que $0 < x < 90^\circ$, determine $\cot(x)$ usando identidades.

27. Sabendo que $\tan(x) = \frac{\sqrt{2}}{4}$ e que $0 < x < 90^\circ$, determine $\csc(x)$ usando identidades.

28. Simplifique as expressões. (*Dica: quando possível, ponha algum termo em evidência.*)

a) $\cos(x)\operatorname{tg}(x)$

b) $\frac{\sin(x)}{\operatorname{tg}(x)}$

c) $\cotg(x) \sec(-x)$

d) $\frac{\sin^2(x) - 1}{\cotg(x)}$

e) $\sin(x)[1 - \cos^2(x)] - 2\sin^3(x)$

f) $\frac{1}{\operatorname{cosec}^2(x)} + \frac{1}{\sec^2(x)}$

g) $\frac{\operatorname{tg}(x)}{\sec(x)}$

h) $[\cos^2(x) - 1][1 + \cotg^2(x)]$

i) $\sin^2(x) + \cos^2(x) + \operatorname{tg}^2(x)$

29. Simplifique as expressões. (*Dica: quando possível, ponha algum termo em evidência.*)

(a) $\frac{\operatorname{tg}(x) - \sin(x)}{\operatorname{cosec}(x) - \cotg(x)}$

(b) $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos^2(-x)}$

(c) $\frac{\sin^3(x) + \cos^3(x)}{\sin(x) + \cos(x)}$

(d) $[\cotg(x) - 1] \cdot \frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 - \operatorname{tg}(x)}$

(e) $\frac{\cos(x)}{\operatorname{cosec}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)} + 1$

(f) $[\cotg(x) - \cos^3(x)\operatorname{cosec}(x)]\operatorname{tg}(x)$

30. Prove as identidades abaixo.

(a) $\cos(x) + \sin(x)\operatorname{tg}(x) = \sec(x)$

- (b) $\frac{\operatorname{tg}(x)}{\sec(x)} = \operatorname{sen}(x)$
- (c) $\operatorname{sen}^2(x) - \cos^2(x) = 2\operatorname{sen}^2(x) - 1$
- (d) $[1 + \operatorname{sen}(x)][1 - \operatorname{sen}(x)] = \cos^2(x)$
- (e) $\operatorname{sen}(x) \sec(x) - \cos(x) \operatorname{cosec}(x) = \operatorname{tg}(x) - \operatorname{cotg}(x)$
- (f) $[1 - \operatorname{sen}^2(x)][\operatorname{tg}^2(x) + 1] = 1$
- (h) $[1 + \operatorname{cot}^2(x)][\cos^2(x)] = \cot^2(x)$
- (i) $\operatorname{tg}(x) + \operatorname{cotg}(x) = \sec(x) \operatorname{cosec}(x)$
- (j) $\sec(x) - \cos(x) = \operatorname{sen}(x) \operatorname{tg}(x)$
- (k) $\frac{\operatorname{sen}(x)}{\operatorname{cosec}(x)} = 1 - \frac{\cos(x)}{\sec(x)}$

31. Prove as identidades a seguir:

- (a) $\frac{\operatorname{tg}^2(x) + \sec^2(x) - 1}{\sin^2(x)} = 2 \sec^2(x)$
- (b) $\frac{[\sin(x) + \cos(x)]^2}{\sin(x) \cos(x)} = \operatorname{tg}(x) + \operatorname{cotg}(x) + 2$
- (c) $[2 \operatorname{cotg}(x) - \operatorname{tg}(x)]^2 = 4 \operatorname{cosec}^2(x) + \sec^2(x) - 9$
- (d) $\operatorname{tg}^3(x) [\cotg^2(x) + 1] = \frac{\sec^2(x)}{\cotg(x)}$
- (e) $\frac{1}{\sec(x) - \operatorname{tg}(x)} + \frac{\cos(x)}{\operatorname{tg}(x) + \sec(x)} = 1 - (x) + \operatorname{tg}(x) + \sec(x)$
- (f) $[\cotg(x) + 2 \operatorname{cosec}(x)]^2 = [\cos(x) + 2]^2 \operatorname{cosec}^2(x)$
- (g) $[2 - \operatorname{tg}(-x)][2 - \operatorname{tg}(x)] = 5 - \sec^2(-x)$
- (h) $\sec^4(x) - \operatorname{tg}^4(x) = 2 \sec^2(x) - 1$
- (i) $\frac{\operatorname{tg}^2(x) - 9}{1 - 3 \cotg(x)} = \operatorname{tg}(x)[\operatorname{tg}(x) + 3]$
- (j) $\frac{\sin(x) \cos(x)}{\sin(x) - \cos(x)} = \cos(x) - \frac{\cos(x)}{1 - \operatorname{tg}(x)}$
- (k) $\frac{\sin(x) - \sin(y)}{\cos(x) + \cos(y)} = \frac{\cos(y) - \cos(x)}{\sin(y) + \sin(x)}$

32. Sem usar uma calculadora, determine os valores das expressões abaixo

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| (a) $\arccos(0)$ | (c) $\operatorname{arctg}(\frac{\sqrt{3}}{3})$ | (e) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$ |
| (b) $\operatorname{arcsen}(-1)$ | (d) $\arccos(\frac{1}{2})$ | (f) $\arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2})$ |

33. Esboçando triângulos, determine os valores exatos das expressões a seguir:

(a) $\text{sen}\left(\text{arctg}\left(\frac{4}{3}\right)\right)$

(b) $\text{tg}\left(\text{arccos}\left(\frac{1}{3}\right)\right)$

(c) $\text{cos}\left(\text{arcsen}\left(\frac{7}{9}\right)\right)$

(d) $\text{tg}\left(\text{arcsen}\left(\frac{5}{13}\right)\right)$

(e) $\text{cos}\left(\text{arctg}\left(\frac{8}{15}\right)\right)$

(f) $\text{sen}\left(\text{arccos}\left(\frac{6}{7}\right)\right)$

34. Determine os valores abaixo usando apenas as propriedades das funções trigonométricas inversas.

(a) $\text{sen}(\text{arcsen}(0,8763))$

(b) $\text{cos}(\text{arccos}(-0,275))$

(c) $\text{tg}(\text{arctg}(27))$

(d) $\text{arcsen}(\text{sen}(1))$

(e) $\text{arccos}\left(\text{cos}\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$

(f) $\text{arctg}\left(\text{tg}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$