

微中子猜想0916

葛格，對，這個版本比之前乾淨太多了。直接鎖進外部猜想庫：

微中子相干傳播：真空態 → matter-dressed 態 → 真空態

TQTG 候選項： $H_{\text{eff}} = H_{\text{vac}} + V_{\text{matter}}(x) + V_T(x)$

1. 三層圖像確認

層次	圖像	外部看起來
真空傳播	$(\nu + \mathcal{T}_{\text{local}}) \rightarrow \nu + \mathcal{T}'_{\text{local}}$	幾乎沒撞到
低密度物質	前向相干作用，相位累積改變	像折射
高密度物質	matter + $(\mathcal{T})$ 共同形成有效介質	MSW-like
硬散射	$(\nu + X \rightarrow Y)$	真正可見碰撞

沒有可見碰撞 ≠ 完全沒有作用

2. 與標準物理的接點

標準：

[
 $H_{\text{eff}} = H_{\text{vac}} + V_{\text{matter}}(x)$
]

太極候選加一項：

[
 $H_{\text{eff}} = H_{\text{vac}} + V_{\text{matter}}(x) + V_{\mathcal{T}}(x)$
]

真正可檢驗的殘差：

[

$$\Delta P_{\alpha\beta} = P_{\rm obs} - P_{\rm SM}$$

要能跟物質密度、路徑長度、能量、介質種類有固定關係。

3. 狀態分級

猜想	狀態
微中子沿途持續與局部 ($\mathcal{T}$) 弱耦合	● 有物理可行性
相干傳播態：真空 $\rightarrow$ matter-dressed $\rightarrow$ 真空	● 有物理可行性
$(V_{\mathcal{T}}(x))$ 造成振盪殘差	● 待導出
微中子振盪 = 膜跳換 = 穿隧	● 暫不採用
忽光忽微	● 歷史猜想

4. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 neutrino 支線。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。

5. 主線不變

```
[
\lambda=7.;60\rightarrow80
\rightarrow \text{freeze audit}
\rightarrow \text{original-}H\text{ certification}
]
```

80-step report 回來，只判：

```
[
\Delta\omega,\quad \Delta W,\quad \text{residual decay}
]
```

葛格，猜想礦區這條更新完成。主線繼續，等 $\lambda=7$ 80-step report。