ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x)=4^x$ là:

A. $\frac{4^{x+1}}{x+1}+C.$ **B.** $\frac{4^x}{2\ln 2}+C.$ **C.** $\frac{4^x}{x}+C.$ **D.** $x\cdot 4^{x-1}+C.$

Lời giải

Chọn B

$\int 4^x dx=\frac{4^x}{\ln 4}+C=\frac{4^x}{\ln 2^2}+C=\frac{4^x}{2\ln 2}+C.$

Câu 2: Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-4x+4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=3$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox.

A. 33. **B.** $\frac{33}{5}$. **C.** $\frac{33\pi}{5}$. **D.** 33π

Lời giải:

Chọn C

Ta có: $\mathrm{V}=\pi\int_0^3(x-2)^4\mathrm{d}x=\frac{33\pi}{5}$.

Câu 3: Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[2;4)$. **B.** $[4;6)$. **C.** $[6;8)$. **D.** $[8;10)$.

Lời giải

Gọi $x_1;x_2;...;x_{30}$ là điểm số của 30 học sinh xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,...,x_4\in[2;4);x_5,...,x_{12}\in[4;6);x_{13},...,x_{23}\in[6;8);x_{24},...,x_{30}\in[8;10)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1;x_2;...;x_{30}$ là $\frac{1}{2}(x_{15}+x_{16})\in[6;8)$.

Ta xác định được: $n=30;p=3;n_3=11;m_1+m_2=4+8=12;u_3=6;u_4=8$.

Vậy trung vị của mẫu số liệu trên là: $M_e=6+\frac{\frac{30}{2}-12}{11}\cdot(8-6)=\frac{72}{11}\approx 6,55$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $A(2;1;3)$, $B(1;0;1)$, $C(-1;1;2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC?

A. $\begin{cases}x=-2t\\y=-1+t\\z=3+t\end{cases}$. **B.** $x-2y+z=0$.

C. $\frac{x-2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-3}{1}$. **D.** $\frac{x-1}{-2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{1}$.


Lời giải

Chọn C

Đường thẳng đi qua A và song song BC nhận $\overrightarrow{BC}=(-2;1;1)$ làm vectơ chỉ phương

$\Rightarrow$ Phương trình đường thẳng cần tìm: $\dfrac{x-2}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-3}{1}$.

Câu 5: Tìm hệ số a,b,c để hàm số $y=\dfrac{2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ:



A. $a=2,b=2,c=-1$. **B.** $a=1,b=1,c=-1$. **C.** $a=1,b=2,c=1$. **D.** $a=1,b=-2,c=1$.

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho ta thấy: Đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tại các điểm $(0;-1),(-2;0)\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{2}{b}=-1\\-2a+2=0\end{cases}$ Suy ra $a=1,b=-2,c=1$.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $2^x<1$ là:

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(1;7)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $2^x<1\Leftrightarrow 2^x<2^0\Leftrightarrow x<0$

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $(-\infty;0)$.

Câu 7: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P):2x-y+z+3=0$?

A. $\vec{n_1}=(2;-1;1)$. **B.** $\vec{n_2}=(2;1;1)$. **C.** $\vec{n_3}=(2;-1;3)$. **D.** $\vec{n_4}=(-1;1;3)$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$.

Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. $CD\perp(SBC)$. **B.** $SA\perp(ABC)$. **C.** $BC\perp(SAB)$. **D.** $BD\perp(SAC)$.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $3^{2x+1}=27$ là

A. 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=8$ và công sai $d=3$. Số hạng u_2 của cấp số cộng là


A. $\dfrac{8}{3}$. **B.** 24. **C.** 5. **D.** 11.

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$. **D.** $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như *Hình 1*.



Hình 1

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu	7	8	9	10	11	12
Chọn	**A**	**A**	**D**	**D**	**C**	**B**

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=2\cos x+x$.

a) $f(0)=2$; $f(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=2\sin x+1$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{7\pi}{6}$.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{2}+\sqrt{3}$.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án	a) Đúng			
	b) Sai			
	c) Đúng			
	d) Đúng			

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 240 m , tốc độ của ô tô là 28,8 km/h . Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t)=at+b$ (m/s) với $(a,b\in\mathbb{R},a>0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 16 giây và duy trì sự tăng tốc trong 30 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 208 m.

b) Giá trị của b là 8.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây $(0\le t\le 30)$ kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t)=\int_0^{30} v(t)dt$.

d) Sau 30 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.

Giải: KQ: Đ-Đ-S-Đ.

a) Tốc độ ban đầu của ô tô là 28,8 km/h = 8 m/s.

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giây đầu tiên là: $S_1=4.8=32\text{m}$.

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là: $S_2=240-32=208\text{m}$. Do đó a đúng.

b) Thời điểm bắt đầu tăng tốc ta có $v(0)=b=8\Rightarrow b=8$. Do đó b đúng.

c) Quãng đường $S(t)$ ô tô đi được trong thời gian t giây $(0\le t\le 30)$ kể từ lúc bắt đầu tăng tốc được ti hs theo công thức $S(t)=\int_0^t v(t)dt$. Do đó c sai.

d) T có $v(t)=at+8(\text{m/s})$

Biết xe nhập làn sau 16 phút kể từ khi tăng tốc, nên ta có $208=\int_0^{16}(at+8)dt=128a+128\Rightarrow a=\frac{5}{8}$

$\Rightarrow v(t)=\frac{5}{8}t+8$ (m/s)

Tốc độ của ô tô sau 30 giây là $\Rightarrow v(30)=\frac{5}{8}.30+8=\frac{107}{4}$ (m/s)=96,3(km/h). Do đó đúng.

Câu 3. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm

a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại I là $0,85$.

b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại I là $0,99$.

c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là $0,9855$.

d) Xác suất chọn được sản phẩm loại I mà không bị hỏng là $0,95$.

Lời giải

Tác giả: Cao Văn Tùng, THPT Lạng Giang số 2

a) S	b) Đ	c) Đ	d) S

A : "Khách hàng chọn được sản phẩm loại Γ ";

B "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng". Khi đó:

a) Ta có: $P(A)=0,85;\ P(\overline{A})=0,15$; xác suất để không chọn được sản phẩm loại I là $0,15$. Mệnh đề **sai**.

b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại I là
$P(B\mid A)=1-P(\overline{B}\mid A)=1-0,01=0,99$. Mệnh đề **đúng.**

c) Tìm xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng
$P(B\mid \overline{A})=1-P(\overline{B}\mid \overline{A})=1-0,04=0,96$.


Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:
$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,85.0,99+0,15.0,96=0,9855$. Mệnh đề **đúng**

d) Tính xác suất chọn được sản phẩm loại I mà không bị hỏng tức tính $P(A\mid B)$

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{0,85.0,99}{0,9855}\approx 0,854\ne 0,95$. Mệnh đề **sai.**

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6630 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6370 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và

đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6;15;-2)$ sau một thời gian vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(5;12;0)$.



a) Đường thẳng AM có phương trình chính tắc là $\frac{x-5}{1}=\frac{y-12}{3}=\frac{z}{-2}$.

b) Trên hệ tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển qua điểm $N(7;18;-5)$.

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $B\left(-\frac{6}{7};-\frac{39}{7};\frac{82}{7}\right)$.

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $21915\,km$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-mét).

Lời giải

Tác giả: Cao Văn Tùng – THPT Lạng Giang số 2

a) Đ	b) S	c) Đ	d) Đ

a) Đường thẳng AM có phương trình chính tắc là.

Ta có $\overrightarrow{AM}=(1;3;-2)$ là vectơ chỉ phương; đường thẳng lại đi qua $A(5;12;0)$ nên có phương trình $\frac{x-5}{1}=\frac{y-12}{3}=\frac{z}{-2}$. Mệnh đề **đúng.**

b) Thiên thạch di chuyển qua điểm $N(7;18;-5)$.

Thay tọa độ điểm $N(7;18;-5)$ vào phương trình AM ta được $\frac{7-5}{1}=\frac{18-12}{3}=\frac{-5}{-2}\Leftrightarrow 2=2=\frac{5}{2}$ vô lý.

Mệnh đề **sai.**

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $B\in AM:\frac{x-5}{1}=\frac{y-12}{3}=\frac{z}{-2}\Rightarrow B(5+t;12+3t;-2t)$.

Ngoài thực tế khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $6370+6630=13000(km)$ ứng với 13 đơn vị trên hệ trục tọa độ, hay $OB=13\Leftrightarrow OB^2=169$.

$\Leftrightarrow (5+t)^2+(12+3t)^2+(-2t)^2=169$

$\Leftrightarrow 14t^2+82t=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=-\dfrac{41}{7}. \end{array}\right.$

Với $t=0\Rightarrow B(5;12;0)\equiv A$ vô lý

Với $t=-\dfrac{41}{7}\Rightarrow B\left(-\dfrac{6}{7};-\dfrac{39}{7};\dfrac{82}{7}\right)$. Mệnh đề **đúng**.

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $21915\,km$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-mét).

Ta có $AB=\sqrt{\left(-\dfrac{6}{7}-5\right)^2+\left(-\dfrac{39}{7}-12\right)^2+\left(\dfrac{82}{7}\right)^2}=\dfrac{41\sqrt{14}}{7}$

Khoảng cách thực tế là $1000AB=1000\dfrac{41\sqrt{14}}{7}\approx 21915(km)$. Mệnh đề **đúng**.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có SA, AB, AC đôi một vuông góc. Biết rằng $SA=5; AB=3; AC=4$. Khoảng cách giữa SA và BC là

Đáp án: $2,4$.

Câu 2. Cho tứ diện *ABCD*, một con bọ đang đậu ở đỉnh *A* của tứ diện. Mỗi lần nghe một tiếng trống thì nó nhảy sang một đỉnh bất kì của tứ diện *ABCD* mà kề với đỉnh nó đang đậu. Hỏi sau 4 tiếng trống nó có bao nhiêu cách trở về đỉnh *A*?

Đáp án: 21

Câu 3. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90;0;30)$, $N(90;120;30)$, $P(0;120;30)$, $Q(0;0;30)$ (Hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M=K_0N=K_0P=K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A, camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19 (Nguồn: *https://www.abiturloesumg.de; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI*).




Hình 34

Biết rằng vecto $\overrightarrow{K_0K_1}$ có tọa độ là $(a;b;c); a,b,c \in \mathbb{R}$. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?


Lời giải

Trả lời: -6.

Cách 1: Ta có thể mô tả lại nội dung của bài theo hình vẽ sau:



Hình 34



Gọi M_1, N_1, P_1, K lần lượt là hình chiếu của M, N, P, K_0 lên mặt phẳng (Oxy).

Ta thấy $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật. Gọi K' là giao hai đường chéo MP và NQ.

Khi đó $K'Q = K'P = K'N = K'M$. Vì $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$ và camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng từ điểm K_0 xuống điểm K_1 nên các điểm K', K_0, K_1, K thẳng hàng.

Khi đó, các điểm K', K_0, K_1, K có hoành độ và tung độ bằng nhau.

Theo bài ra, cao độ của K_0 và K_1 lần lượt là 25 và 19. Giả sử $K_0(x;y;25)$ và $K_1(x;y;19)$.

Ta có $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật nên $K'K = OQ$, suy ra cao độ của K' bằng 30.

Do đó, $K'(x;y;30)$.

Ta có $\overrightarrow{K'Q} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OK'} = 30\vec{k} - (x\vec{i} + y\vec{j} + 30\vec{k}) = -x\vec{i} - y\vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{K'Q} = (-x;-y;0)$.

$\overrightarrow{NK'} = \overrightarrow{OK'} - \overrightarrow{ON} = (x\vec{i} + y\vec{j} + 30\vec{k}) - (90\vec{i} + 120\vec{j} + 30\vec{k}) = (x-90)\vec{i} + (y-120)\vec{j}$

$\Rightarrow \overrightarrow{NK'} = (x-90; y-120; 0)$.

Vì K' là giao hai đường chéo của hình chữ nhật $MNPQ$ nên K' là trung điểm của NQ.


Suy ra $\overrightarrow{K'Q} = \overrightarrow{NK'} \Leftrightarrow \begin{cases} -x = x - 90 \\ -y = y - 120 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 45 \\ y = 60 \end{cases}$.

Do vậy, $K_0(45;\ 60;\ 25)$; $K_1(45;\ 60;\ 19)$ nên ta có


$\overrightarrow{K_0K_1} = \overrightarrow{OK_1} - \overrightarrow{OK_0} = \left(45\vec{i} + 60\vec{j} + 19\vec{k}\right) - \left(45\vec{i} + 60\vec{j} + 25\vec{k}\right) = -6\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{K_0K_1} = (0;0;-6).$

Do đó, $a+b+c=-6$.

Cách 2: Ta có thể mô tả lại nội dung của bài theo hình vẽ sau:



Hình 34



Trong mặt phẳng $OQNF$:

Qua điểm K_0 kẻ đường thẳng song song với NQ, đường thẳng này cắt OQ, NF lần lượt tại $Q_0; N_0$. Khi đó: $Q_0(0;0;25); N_0(90;120;25)$.

Trung điểm K_0 của Q_0N_0 có tọa độ: $K_0(45;60;25)$.


Qua điểm K_1 kẻ đường thẳng song song với NQ, đường thẳng này cắt OQ, NF lần lượt tại $Q_1; N_1$. Khi đó: $Q_1(0;0;19); N_1(90;120;19)$.

Trung điểm K_1 của Q_1N_1 có tọa độ: $K_1(45;60;19)$.

Khi đó: $\overrightarrow{K_0K_1} = (0;0;-6) \Rightarrow P = a+b+c = -6$.


Cách 3: (Trần Tân) Từ giả thiết ta có $\overrightarrow{K_0K_1}$ ngược hướng với vec tơ đơn vị trên trục Oz là vec tơ $\vec{k} = (0;0;1)$ và do độ dài đoạn $K_0K_1 = 6$ nên $\overrightarrow{K_0K_1} = -6\vec{k} = (0;0;-6)$ nên ta có $a+b+c=-6$.

Câu 4. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên dưới. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200 000 (đồng) và phần còn lại 100 000 (đồng). Biết $A_1A_2 = 8\ m$, $B_1B_2 = 6\ m$ và tứ giác $MNPQ$ là hình ch ữ nhật có $MQ = 3\ m$. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng



Lời giải

Đáp án 7, 3.



Gọi phương trình chính tắc của elip (E) có dạng: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

Với $\begin{cases} A_1A_2=8=2a \\ B_1B_2=6=2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4 \\ b=3 \end{cases} \rightarrow (E):\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1 \Leftrightarrow y=\pm\frac{3}{4}\sqrt{16-x^2}$.

Suy ra diện tích của hình elip là $S_{(E)}=\pi a.b=12\pi\ (\text{m}^2)$.

Vì $MNPQ$ là hình chữ nhật và $MQ=3\rightarrow M\left(x;\frac{3}{2}\right)\in(E)$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16}+\frac{1}{4}=1 \Rightarrow x^2=12 \rightarrow M\left(-2\sqrt{3};\frac{3}{2}\right);N\left(2\sqrt{3};\frac{3}{2}\right)$$

Gọi $S_1;S_2$ lần lượt là diện tích phần bị tô màu và không bị tô màu

Ta có: $S_2=4.\frac{3}{4}\int\limits_{2\sqrt{3}}^{4}\sqrt{16-x^2}\,\text{d}x=3\int\limits_{2\sqrt{3}}^{4}\sqrt{16-x^2}\,\text{d}x \xrightarrow{x=4\sin t} S_2=4\pi-6\sqrt{3}\ (\text{m}^2)$

Suy ra: $S_1=S_{(E)}-S_2=8\pi+6\sqrt{3}$. Gọi T là tổng chi phí. Khi đó ta có

$T=\left(4\pi-6\sqrt{3}\right).100+\left(8\pi+6\sqrt{3}\right).200\simeq 7.322.000$ (đồng). Từ đó làm tròn thành 7,3 (triệu đồng).

Chú ý : Trong thực hành học sinh chỉ cần bấm máy tính ra được kết quả.

Câu 5: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000. Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp số: 39

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000-100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12+x$ (nghìn đồng).

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$f(x)=(3000-100x)(12+x)$ (nghìn đồng).

Xét hàm số $f(x)=(3000-100x)(12+x)$ trên $(0;+\infty)$.

Ta có: $f(x)=-100x^2+1800x+36000$.

$f'(x) = -200x + 1800$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -200x + 1800 = 0 \Leftrightarrow x = 9$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0;+\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x = 9$

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39000 đồng.

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.

Lời giải:

Đáp số: **0.81**

Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I

B là biến cố bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.

Ta có xác suất cần tính là $P(A/B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

Với $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{C_6^2.C_3^2 + C_4^2.C_7^2 + (6.4).(7.3)}{C_{10}^2.C_{10}^2} = \dfrac{1}{3}$.

TH1. Lấy được mỗi hộp một bi đỏ và một bi trắng ta có $P(AB) = \dfrac{(6.4).(7.3)}{C_{10}^2.C_{10}^2} = \dfrac{56}{225}$.

TH2. Lấy đươc 2 bi đỏ từ hộp I và 2 bi trắng từ hộp II ta có $P(AB) = \dfrac{C_6^2.C_3^2}{C_{10}^2.C_{10}^2} = \dfrac{1}{45}$.

Khi đó ta có xác suất cần tính là $P(A/B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{\dfrac{56}{225} + \dfrac{1}{45}}{\dfrac{1}{3}} = \dfrac{61}{75} = 0.813$.