SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ GIANG
(*Đề thi có 04 trang*)


ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC THI TỐT NGHIỆP THPT
Năm học 2024 – 2025
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên học sinh: …….. Số báo danh:……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(0;1)$. **B.** $(-3;-2)$.

C. $(0;2)$. **D.** $(1;2)$.


Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là



A. $x=2$. **B.** $x=0$.

C. $y=-2$. **D.** $y=2$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là



A. $y=0$. **B.** $x=0$.

C. $x=-1$. **D.** $y=-1$.


Câu 4. Cho hàm số $y=x^4-4x^2+3$. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;4]$ tại điểm x_0. Giá trị $\sqrt{2}x_0$ là

A. $4\sqrt{2}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** 2. **D.** -1.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=x^2$. Hàm số $y=f(x)$ là

A. $f(x)=3x^2$. **B.** $f(x)=2x$. **C.** $f(x)=\frac{x^2}{3}$. **D.** $f(x)=\frac{x^3}{3}$.

Câu 6. Cho các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và có đồ thị như hình vẽ. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ và hai đường thẳng $x=a, x=b$ là



A. $S=\int_{b}^{a}\left|f(x)-g(x)\right|dx.$ **B.** $S=\int_{a}^{b}\left[g(x)-f(x)\right]dx.$

C. $S=\int_{b}^{a}\left[f(x)-g(x)\right]dx.$ **D.** $S=\int_{a}^{b}\left|f(x)-g(x)\right|dx.$

Câu 7. Trong không gian *Oxyz*, cho mặt phẳng (α) có phương trình $2x-y+z-3=0.$ Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến có toạ độ là

A. $(2;1;-3).$ **B.** $(-1;1;-3).$ **C.** $(2;1;-1).$ **D.** $(2;-1;1).$

Câu 8. Trong không gian *Oxyz*, cho mặt cầu $(S): x^2+(y-1)^2+z^2=2$. Bán kính của mặt cầu đã cho là

A. $2\sqrt{2}.$ **B.** 2. **C.** $\sqrt{2}.$ **D.** 4.

Câu 9. Cho hai biến cố *A* và *B*. Xác suất của biến cố *A* với điều kiện biến cố *B* đã xảy ra được gọi là xác suất của *A* với điều kiện *B*, kí hiệu là $P(A|B)$. Nếu $P(B)>0$, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}.$ **B.** $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}.$

C. $P(A|B)=\dfrac{P(B)}{P(A\cap B)}.$ **D.** $P(A|B)=\dfrac{P(A)}{P(A\cap B)}.$

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: *cm*) của 36 học sinh lớp 12 ở một trường trung học phổ thông như bảng dưới đây

Nhóm	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Tần số	6	11	9	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là

A. $R=9.$ **B.** $R=15.$ **C.** $R=12.$ **D.** $R=36.$

Câu 11. Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho là

A. 5. **B.** 25. **C.** 50. **D.** 625.

Câu 12. Chỉ số hay độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $pH=-\log\left[H^+\right]$ với $\left[H^+\right]$ là nồng độ ion hydrogen. Độ pH của một loại sữa có $\left[H^+\right]=10^{-6,8}$ là

A. $-6,8.$ **B.** $68.$ **C.** $6,8.$ **D.** $0,68.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho đường thẳng $\Delta: \dfrac{x+2024}{2}=\dfrac{y+2025}{3}=\dfrac{z+2026}{6}$ và mặt phẳng $(P): x-2y-2z+1=0$. Gọi α là góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P).

a) Vectơ $\vec{u}=(2024;2025;2026)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

b) Điểm $M=(-2024;-2025;-2026)$ là một điểm chung của Δ và (P).

c) Với $\vec{u},\vec{n}$ lần lượt là một vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của Δ và (P). Ta có $\sin\alpha=\dfrac{|\vec{u}.\vec{n}|}{|\vec{u}|.|\vec{n}|}$.

d) Góc $\alpha\approx 50^0$ (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$.

a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(0;+\infty)$.

b) Hàm số đã cho không có cực trị.

c) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x+1$.

d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm có toạ độ $(-1;0)$.

Câu 3. Thầy Tuấn thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B như bảng dưới đây.

Điểm trung bình / Lớp	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

a) Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là 5.

b) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A.

c) Xét mẫu số liệu của lớp 11A ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{0,51}$.

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 11B.

Câu 4. Trong không gian *Oxyz* cho $A(1;0;1), B(2;1;2), C(1;-1;1)$.

a) Ba điểm đã cho thẳng hàng.


b) Toạ độ điểm *D* thoả mãn $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ là $D(0;2;-1)$.

c) Độ dài đoạn *BC* bằng 2.

d) $\cos\widehat{BAC}=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một logo được thiết kế như phần gạch sọc trong hình vẽ bên. Logo trên là hình phẳng giới hạn bởi hai Parabol $y=f(x), y=g(x)$ như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục là *dm*). Tính diện tích của logo trên (làm tròn đến hàng phần mười).




Câu 2. Một người gửi 60 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $0,5\%$ một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (hay gọi là lãi kép). Giả sử trong nhiều tháng liên tiếp kể từ khi gửi tiền, người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi từ tháng thứ mấy trở đi, số tiền cả vốn lẫn lãi, người đó có hơn 66 triệu đồng?


Câu 3. Một bức tường trang trí có dạng như hình vẽ.
Các viên gạch hình vuông được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó, số viên gạch ở hàng dưới cùng và trên cùng lần lượt là 24 viên và 12 viên. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?



Câu 4. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài $6\ m$, cạnh đáy trên dài $4\ m$, cạnh bên dài $4\ m$ (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là $1.200.000$ đồng $/\text{m}^3$. Số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?



Câu 5. Một khối Rubik 4 x 4 được gắn với hệ tọa độ $Oxyz$ có đơn vị trên mỗi trục bằng độ dài cạnh hình lập phương nhỏ *(hình vẽ bên)*. Ba điểm A, B, C nằm ở góc các hình lập phương nhỏ như hình vẽ. Xét mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm A, B, C. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Oxy) bằng bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng phần trục)?



Câu 6. Một doanh nghiệp trước khi xuất khẩu áo sơ mi trong lô hàng S phải qua hai lần kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo trong lô hàng đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Chọn ra ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi trong lô hàng S. Tính xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

…….. HẾT ……

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*
- *Giám thị không giải thích gì thêm.*

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
Trường THPT Nguyễn Thị Giang
(*Đáp án có 05 trang*)

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC THI TN THPT
Năm học 2024 – 2025
Môn: Toán lớp 12

A. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**A**	**B**	**C**	**C**	**D**	**D**	**D**	**C**	**A**	**B**	**A**	**C**

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,50** điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a)S	a)Đ	a)Đ	a)S
b)S	b)S	b)Đ	b)S
c)Đ	c)Đ	c)S	c)S
d)Đ	d)Đ	d)Đ	d)Đ

PHẦN III

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)


Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	**9,8**	**20**	**234**	**114**	**70,5**	**0,931**

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I		
Câu	**Nội dung**	**Ghi chú**
1	Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số nghịch biến trên $(0;1)$.	
2	Dựa vào đồ thị ta thấy điểm cực tiểu của hàm số là $x=0$.	
3	Dựa vào đồ thị ta thấy đường tiệm cận đứng là $x=-1$.	
4	$y'=4x^3-8x=0 \Leftrightarrow x\in\left\{0;\sqrt{2}\right\}$; $y(0)=3; y\left(\sqrt{2}\right)=-1; y(4)=195 \Rightarrow x_0=\sqrt{2}$. $\sqrt{2}x_0=2$.	
5	Do $\left(\frac{x^3}{3}\right)'=x^2$ nên chọn D.	

6	Dựa vào hình vẽ ta chọn D	
7	Dựa vào pt tổng quát của mặt phẳng ta chọn D	
8	Dựa vào phương trình mặt cầu ta chọn C	
9	Dựa vào định nghĩa để chọn A	
10	Khoảng biến thiên $R=175-160=15.$	
11	Độ lệch chuẩn $\sqrt{25}=5.$	
12	Độ pH là $pH=-\log 10^{-6,8}=6,8.$	

PHẦN II

Câu	Nội dung	Ghi chú
1	$\vec{u}=(2;3;6)$ là một vectơ chỉ phương của Δ. Vectơ $\vec{n}=(1;-2;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của (P). Ta thấy toạ độ điểm *M* thoả mãn phương trình của đường thẳng mà không thoả mãn phương trình của mặt phẳng nên điểm *M* thuộc đường thẳng nhưng không thuộc mặt phẳng. $\sin\alpha=\frac{\lvert\vec{u}.\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{n}\rvert}=\frac{16}{21}\Rightarrow\alpha\approx 50^0.$	
2	Hàm số $y=\frac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tập xác định là $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có đạo hàm $y'=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$. Giải phương trình: $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\\x=0\end{array}\right.$. Bảng biến thiên:  a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(0;+\infty)$. b) Hàm số đạt cực đại tại $x_{CD}=-2$ và giá trị cực đại $y_{CD}=-2$, hàm số đạt cực tiểu tại $x_{CT}=0$ và giá trị cực tiểu $y_{CT}=2$. c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-(x+1)\right)=0\Rightarrow y=x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho. d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm có toạ độ $(-1;0)$.	
3	- Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là: $10-5=5$. Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11B là: $10-6=4$. Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A. -Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện:	

Giá trị đại diện / Lớp	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

- Xét mẫu số liệu của lớp 11A:

Cỡ mẫu là $n_1 = 1+11+22+6 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x_1} = \frac{1\cdot 5,5+11\cdot 7,5+22\cdot 8,5+6\cdot 9,5}{40} = 8,3.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{40}\left(1.5,5^2+11.7,5^2+22.8,5^2+6.9,5^2\right)-8,3^2 = 0,61.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{0,61}$.

- Xét mẫu số liệu của lớp 11B:

Cỡ mẫu là $n_2 = 6+8+14+12 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x_2} = \frac{6\cdot 6,5+8\cdot 7,5+14\cdot 8,5+12\cdot 9,5}{40} = 8,3.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{40}\left(6\cdot 6,5^2+8\cdot 7,5^2+14\cdot 8,5^2+12\cdot 9,5^2\right)-8,3^2 = 1,06.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{1,06}$.

Do $S_1 < S_2$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 11B.

4

$\overrightarrow{AB} = (1;1;1), \overrightarrow{AC} = (0;-1;0), k\overrightarrow{AC} = (0;-k;0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \neq k\overrightarrow{AC}, \forall k \in \mathbb{R}$ nên A, B, C không thẳng hàng.


Gọi $D(x_D;y_D;z_D); \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x_D = 1 \\ -1-y_D = 1 \\ 1-z_D = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 0 \\ y_D = -2 \\ z_D = 0 \end{cases} \Rightarrow D(0;-2;0)$.

$\overrightarrow{BC} = (-1;-2;-1) \Rightarrow BC = \sqrt{6}.$

$\cos\widehat{BAC} = \cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) = \dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|} = \dfrac{1.0+1.(-1)+1.0}{\sqrt{3}.1} = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}.$

PHẦN III

Câu	Nội dung	Ghi chú
1	Tìm được $y = f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 1$ và $y = g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2.$ Ta có: $\frac{1}{4}x^2 - 1 = -\frac{1}{4}x^2 + 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{6}$ hoặc $x = -\sqrt{6}$ Khi đó, diện tích của logo là:	

	$= \int\limits_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \left[\left(-\frac{1}{4}x^2 + 2 \right) - \left(\frac{1}{4}x^2 - 1 \right) \right] dx$ $= \int\limits_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \left(3 - \frac{1}{2}x^2 \right) dx = \left(3x - \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} = 4\sqrt{6} \approx 9,8 \text{dm}^2.$	
2	Gọi $u_0 = 60$ (triệu đồng), còn u_n (triệu đồng) là số tiền mà người đó có được sau n $(n \in \mathbb{N}^*)$ tháng gửi tiết kiệm. Khi đó, ta có $u_{n+1} = u_n + \frac{0,5}{100}u_n = 1,005u_n.$ Suy ra dãy số (u_n) lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 1,005$ và có $u_n = 60.1,005^n.$ Ta xét bất phương trình $60.1,005^n > 66 \Leftrightarrow 1,005^n > 1,1 \Leftrightarrow n > \log_{1,005} 1,1.$ Vì $\log_{1,005} 1,1 \approx 19,1$ và $\left(n \in \mathbb{N}^* \right)$ nên bắt đầu từ tháng thứ 20 trở đi thì người đó có hơn 66 triệu đồng.	
3	Số viên gạch ở hàng đầu tiên (ứng với đáy lớn) là $u_1 = 24.$ Số viên gạch ở hàng trên cùng (ứng với đáy nhỏ) là $u_n = 12.$ Vì mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó nên ta thu được cấp số cộng có công sai $d = -1.$ Như vậy $u_n = 12 = u_1 + (n-1)(-1) \Rightarrow n = 13.$ Vậy số viên gạch hình vuông cần thiết để ốp hết bức tường đó là $S_{13} = \frac{(u_1 + u_{13})13}{2} = 234$ (viên gạch).	
4	Giả sử đáy dưới và đáy trên của tháp lần lượt có dạng hình vuông ABCD và MNPQ có cạnh lần lượt 6 m và 4 m như hình bên.  Gọi O là giao điểm của các đường thẳng chứa cạnh bên của hình chóp cụt đều. Ta có: BD và NQ lần lượt là giao tuyến của mặt phẳng (OBD) với hai mặt phẳng chứa đáy nên $BD \,//\, NQ$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của Q, N trên BD khi đó $HK = QN = 4\sqrt{2}$ (m). Vì tứ giác $BNQD$ là hình thang cân nên $DH = BK = \frac{BD - HK}{2} = \sqrt{2}$ (m). Đường cao của khối chóp cụt đều là $QH = \sqrt{14}$ (m). Diện tích của hai đáy lần lượt bằng 36 m^2 và 16 m^2. Thể tích của khối chóp cụt đều bằng. $V = \frac{1}{3}.\sqrt{14}.\left(36 + \sqrt{36.16} + 16 \right) = \frac{76\sqrt{14}}{3}$ (m^3). Vậy số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là: $\frac{76\sqrt{14}}{3}.1200000 \approx 113746384$ (đồng) ≈ 114 (triệu đồng).	

5	Dựa vào giả thiết ta có tọa độ các điểm là $A(0;3;4), B(2;1;4), C(1;0;0)$ Ta có: $\overrightarrow{AB}=(2;-2;0)$, $\overrightarrow{AC}=(1;-3;-4)$ và $\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(8;8;-4)$. Suy ra mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}=(2;2;-1)$. Mặt phẳng (Oxy) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2}=(0;0;1)$. Khi đó, $\cos\left((P),(Oxy)\right)=\dfrac{\left\|\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}\right\|}{\left\|\overrightarrow{n_1}\right\|.\left\|\overrightarrow{n_2}\right\|}=\dfrac{\left\|2.0+2.0+(-1).1\right\|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}.\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=\dfrac{1}{3}$. Vậy góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Oxy) bằng khoảng $70,5°$.	
6	A: "Chiếc áo qua lần kiểm tra 1"; B: "Chiếc áo qua lần kiểm tra 2"; C: "Chiếc áo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu". Khi đó, xác suất để áo qua được lần kiểm tra thứ 2, biết rằng đã qua được lần kiểm tra thứ nhất, là xác suất có điều kiện $P(B\mid A)$ và $P(C)=P(B\cap A)$. Ta có $P(B\mid A)=0,95; P(A)=0,98\Rightarrow P(C)=P(B\cap A)=P(A).P(B\mid A)=0,98.0,95=0,931.$	

…….. Hết ……