

Feuille d'exercices 2

Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels

Exercice 1 (*). Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^2 ? (justifier la réponse)

- a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$
- b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$
- c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$
- d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$
- e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\}$
- f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\}$

Exercice 2 (*). Parmi les sous-ensembles suivants de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites de nombres réels, lesquels sont des sous-espaces vectoriels, lesquels ne le sont pas et pourquoi ?

- a) L'ensemble B des suites bornées.
- b) L'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang.
- c) L'ensemble des suites constantes à partir d'un certain rang.
- d) L'ensemble des suites décroissantes à partir d'un certain rang.
- e) L'ensemble des suites convergeant vers 0.
- f) L'ensemble des suites monotones.
- g) L'ensemble des suites dont la valeur est ≤ 1 à partir d'un certain rang.
- h) L'ensemble des suites 3-périodiques.¹
- i) L'ensemble des suites périodiques.²

Exercice 3 (*). Les ensembles E suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} ?

- a) L'ensemble des fonctions 1-périodiques.³

¹On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *périodique de période N* (ou *N -périodique*) si

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+N} = u_n.$$

²On dit qu'une suite est *périodique* si il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que la suite est N -périodique.

³On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est *périodique de période T* (ou *T -périodique*) si

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t + T) = f(t).$$

- b) L'ensemble des fonctions croissantes.
- c) L'ensemble des fonctions qui sont la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante.
- d) L'ensemble des solutions de l'équation différentielle

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y'(t) + e^{t \sin(t)} y(t) = 0.$$

- e) (***) L'ensemble des fonctions périodiques.⁴

Exercice 4 (*). Soit E un K -espace vectoriel, et soient $v_1, \dots, v_n \in E$.

- a) Soit $\lambda \in K$ non nul. Montrer que $\text{Vect}_K(v_1, \dots, v_{n-1}, v_n) = \text{Vect}_K(v_1, \dots, v_{n-1}, \lambda v_n)$.
- b) Soit $1 \leq i \leq n-1$, et soit $\lambda \in K$. Montrer que l'on a

$$\text{Vect}_K(v_1, \dots, v_{n-1}, v_n) = \text{Vect}_K(v_1, \dots, v_{n-1}, v_n + \lambda v_i).$$

- c) Si v_n est combinaison linéaire de v_1, \dots, v_{n-1} , alors $\text{Vect}_K(v_1, \dots, v_{n-1}, v_n) = \text{Vect}_K(v_1, \dots, v_{n-1})$.

Remarque. Les mêmes résultats sont vrais si on remplace v_n par v_j . Dans ce cas, la condition sur i dans **b)** devient $i \neq j$.

Exercice 5 (*). Soit E un K -espace vectoriel (K est un corps). On se propose de donner une autre définition du sous-espace engendré par une partie de E .

Si \mathcal{P} est une partie de E (pas nécessairement finie), on note $\text{Vect}_K(\mathcal{P})$ l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels F de E contenant \mathcal{P} .

- a) Pourquoi $\text{Vect}_K(\mathcal{P})$ est-il un sous-espace vectoriel ?
- b) Montrer les propriétés suivantes:
 - (i) $\text{Vect}_K(\emptyset) = \{0_E\}$
 - (ii) Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a $\mathcal{P} \subset F \Rightarrow \text{Vect}_K(\mathcal{P}) \subset F$
 - (iii) Si $\mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_2$, alors $\text{Vect}_K(\mathcal{P}_1) \subset \text{Vect}_K(\mathcal{P}_2)$
 - (iv) On a $\text{Vect}_K(\mathcal{P}) = \mathcal{P}$ si et seulement si \mathcal{P} est un sous-espace vectoriel de E .
- c) Montrer que $\text{Vect}_K(\mathcal{P})$ est l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de \mathcal{P} à coefficients dans K . Autrement dit, montrer l'égalité

$$\text{Vect}_K(\mathcal{P}) = \{ \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \mid m \geq 0, \lambda_1, \dots, \lambda_m \in K, v_1, \dots, v_m \in \mathcal{P} \}.$$

Pour montrer l'inclusion \subset , on montrera que le membre de droite est un sous-espace vectoriel de E contenant \mathcal{P} (attention, m n'est pas fixé !)

- d) Lorsque $\mathcal{P} = \{v_1, \dots, v_n\}$, expliquer pourquoi on retrouve la définition du cours.
- e) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On rappelle que $F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}$.

Montrer que $F + G = \text{Vect}_K(F \cup G)$.

⁴On dit qu'une fonction est *périodique* si il existe $T \in \mathbb{R}_+^*$ tel que la suite est T -périodique.

Familles libres, familles génératrices, bases

Exercice 6 (*). On considère les familles suivantes de vecteurs de \mathbb{R}^3 :

- 1) $((1, 1, 0), (0, 1, 1))$,
- 2) $((0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1))$,
- 3) $((0, 1, -1), (1, 0, -1), (1, -1, 0))$,
- 4) $((0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 2, 1))$,
- 5) $((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9))$,
- 6) $((0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 2, 1))$.

Parmi ces familles de vecteurs (justifier les réponses données) :

- a) Déterminer lesquelles sont des familles libres. Compléter chacune de ces familles libres en une base de \mathbb{R}^3 .
- b) Déterminer lesquelles sont des familles génératrices. Extraire une base de \mathbb{R}^3 de chacune de ces familles génératrices.
- c) Déterminer lesquelles sont des bases de \mathbb{R}^3 . Déterminer les coordonnées d'un triplet arbitraire $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ dans chacune de ces bases.

Exercice 7 (*). Parmi les familles suivantes de vecteurs de \mathbb{R}^4 , déterminer lesquelles sont génératrices et lesquelles sont libres (justifier les réponses données). Le cas échéant, en extraire ou les compléter en des bases de \mathbb{R}^4 .

- a) $((0, 1, -2, 1), (1, -1, 0, 3), (-2, 7, -10, -1))$,
- b) $((0, 1, -2, 1), (1, -1, 0, 3), (-1, 4, -6, 0))$,
- c) $((0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1))$,
- d) $((0, 1, -1, 0), (1, 0, -1, 0), (1, -1, 0, 0), (0, 0, 0, 1))$,
- e) $((1, 1, 1, 2), (1, 1, 2, 1), (1, 2, 1, 1), (2, 1, 1, 1))$.

Exercice 8 ()**. Pour chacune des familles suivantes, donner une condition nécessaire et suffisante sur les paramètres réels a, b pour que la famille en question soit une base de \mathbb{R}^3 .

- a) $((1, 1, 1), (0, a, 1), (0, 0, b))$,
- b) $((1, 0, 1), (a, b, 1), (b, a, 1))$,
- c) $((1, a, b), (a, 1, a), (b, b, 1))$,
- d) $((a, a, b), (a, b, a), (b, a, a))$,
- e) $((0, a, b), (a, 0, b), (a, b, 0))$.

Exercice 9 ()**. Les familles suivantes de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ sont-elles libres ?

- a) $(f_1 : x \mapsto \cos(x), f_2 : x \mapsto \sin(x), f_3 : x \mapsto 1)$,
- b) $(f_1 : x \mapsto \cos^2(x), f_2 : x \mapsto \cos(2x), f_3 : x \mapsto 1)$,
- c) $(f_1 : x \mapsto |x - 1|, f_2 : x \mapsto |x|, f_3 : x \mapsto |x + 1|)$,

Exercice 10 (**). Pour tout entier $i \in \mathbb{N}$, on note e_i la suite de nombre réels $(\delta_{i,n})_{n \in \mathbb{N}}$ où

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- a) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille (e_1, \dots, e_n) est une famille libre de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- b) L'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est-il de dimension finie ?
- c) On définit $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ comme l'ensemble des suites de nombres réels $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ est fini.
 - a) Démontrer que $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
 - b) Ce sous-espace vectoriel est-il de dimension finie ?

Exercice 11 (**). Montrer par récurrence que les familles suivantes de n vecteurs de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ sont libres (On pourra utiliser la dérivation).

- a) $(f_k : x \mapsto \sin(kx))_{1 \leq k \leq n}$,
- b) $(f_k : x \mapsto e^{\lambda_k x})_{1 \leq k \leq n}$ où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des nombres réels deux à deux distincts.

Exercice 12 (**). Soit u, v et w trois vecteurs d'un \mathbb{R} -espace vectoriel E . Montrer que $\text{Vect}(u, v) = \text{Vect}(u, w)$ si et seulement si

$$\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \quad \alpha u + \beta v + \gamma w = 0 \quad \text{et} \quad \beta \gamma \neq 0.$$

Exercice 13 (***). Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel et x_1, \dots, x_n une famille libre de n vecteurs de E . On se donne n scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ et on pose

$$y = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k.$$

Pour tout $1 \leq i \leq n$ on pose $y_i = x_i + y$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les λ_k pour que la famille y_1, \dots, y_n soit libre.