

# Tests sur deux échantillons : comparer moyennes et variances

Frédérique Leblanc

## Les données :

- $X$  est observé pour  $n_X$  individus :

$$x_1, x_2, \dots, x_{n_X}$$

- $Y$  est observé pour  $n_Y$  individus :

$$y_1, y_2, \dots, y_{n_Y}$$

## Deux situations possibles :

- mêmes individus observés en  $X$  et  $Y$  : **Echantillons appariés**
- différents individus observés en  $X$  et  $Y$  : **Echantillons indépendants**

- 1 Comparer les moyennes de  $X$  et  $Y$  (cas appariés et indép.)
- 2 Comparer les variances de  $X$  et  $Y$  (cas indép.)
- 3 Comparer les distributions de  $X$  et  $Y$  (cas indép. voir chap suivant)

**Exemples** : dans le fichier de données du poly :

1) poids à 15 ans et poids à 20 ans  $\implies$  appariés.

question possible : le poids à 15 ans est-il en moyenne le même qu'à 20 ans ?

2) poids chez les filles et poids chez les garçons  $\implies$  indépendants.

question possible : le sexe a-t-il en moyenne un effet sur le poids ?

On notera  $E(X) = \mu_X$ ,  $E(Y) = \mu_Y$ ,  $V(X) = \sigma_X^2$  et  $V(Y) = \sigma_Y^2$ .  
Selon le cas on posera les modèles suivants :

- ❶ **Appariés** : Soit  $D = X - Y$  on suppose  $D$  de loi  $\mathcal{N}(\mu_D, \sigma_D^2)$   
où  $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$  et  $\sigma_D$  sont inconnus.
- ❷ **Indépendants** :
  - i)  $X$  et  $Y$  sont supposées de loi resp.  $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$  et  $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$
  - ii)  $\sigma_X = \sigma_Y$  si inconnus et petits échantillons ( $n < 30$ )

On veut tester

$$\mathcal{H}_0 : \mu_D \leq 0 \quad \mathcal{H}_1 : \mu_D > 0$$

$$\mathcal{H}_0 : \mu_D \geq 0 \quad \mathcal{H}_1 : \mu_D < 0$$

$$\mathcal{H}_0 : \mu_D = 0 \quad \mathcal{H}_1 : \mu_D \neq 0$$

On applique les résultats des test à 1 échantillon sur l'échantillon des différences :  $d_1, d_2, \dots, d_n$ .

**Statistique de test :**  $T = \bar{D}\sqrt{n}/S'_D$

**Loi de T sous  $\mathcal{H}_0$  :** Student à  $n - 1$  d.l.

## Modèle :

$X$  de loi  $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

$Y$  de loi  $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

$$\mathcal{H}_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \quad \mathcal{H}_1 : \sigma_X > \sigma_Y$$

$$\mathcal{H}_0 : \sigma_X = \sigma_Y \quad \mathcal{H}_1 : \sigma_X < \sigma_Y$$

$$\mathcal{H}_0 : \sigma_X = \sigma_Y \quad \mathcal{H}_1 : \sigma_X \neq \sigma_Y$$

**Statistique de Test :  $T = S_X'^2/S_Y'^2$**

**loi de T sous  $\mathcal{H}_0$  :** loi de Fisher de para.  $\mathcal{F}_{n_X-1, n_Y-1}$

**Regions de rejet :**

$$\{T > f_{n_X-1, n_Y-1, 1-\alpha}\} , \{T < f_{n_X-1, +n_Y-1, \alpha}\}$$

$$\{T > f_{n_X-1, n_Y-1, 1-\alpha/2}\} \cup \{T < f_{n_X-1, +n_Y-1, \alpha/2}\}$$

## Modèle :

$X$  de loi  $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

$Y$  de loi  $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

## Tests de comparaison de moyennes :

$$\mathcal{H}_0 : \mu_X - \mu_Y = 0 \quad \mathcal{H}_1 : \mu_X - \mu_Y > 0$$

$$\mathcal{H}_0 : \mu_X - \mu_Y = 0 \quad \mathcal{H}_1 : \mu_X - \mu_Y < 0$$

$$\mathcal{H}_0 : \mu_X - \mu_Y = 0 \quad \mathcal{H}_1 : \mu_X - \mu_Y \neq 0$$



**Estimateur de  $\mu_X - \mu_Y$  :**  $\bar{X} - \bar{Y}$

**Régions de Rejet :**  $\{T > \dots\}$ ,  $\{T < \dots\}$  et  $\{|T| > \dots\}$

Ensuite plusieurs situations :

- les variances sont connues (situation rare)
- elles sont inconnues mais supposées égales (petits échantillons possibles)
- elles sont inconnues et non nécessairement égales (grands échantillons  $n > 100$ )

**Statistique de Test :** Elle dépend de la situation et est l'estimateur centré et réduit sous  $\mathcal{H}_0$

loi de  $\bar{X} - \bar{Y}$  :

$$\mathcal{N}\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}\right)$$

loi de  $\bar{X} - \bar{Y}$  sous  $\mathcal{H}_0$  :

$$\mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}\right)$$

loi de  $\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}}$  sous  $\mathcal{H}_0$  :

$$\mathcal{N}(0, 1)$$

❶ **variances connues :**

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}}$$

Loi de T sous  $\mathcal{H}_0$ :  $\mathcal{N}(0, 1)$

❷ **variances inconnues et grands échantillons :**

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}}}$$

Loi de T sous  $\mathcal{H}_0$ : approximativement  $\mathcal{N}(0, 1)$

❸ **variances inconnues et égales :**

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\Sigma^2(n_X^{-1} + n_Y^{-1})}} \quad \text{avec} \quad \Sigma^2 = \frac{n_X S_X^2 + n_Y S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}$$

Loi de T sous  $\mathcal{H}_0$ : Student  $\mathcal{T}_{n_X+n_Y-2}$

Pour les situations 1 et 2 les régions de rejet sont

$$\{T > u_{1-\alpha}\} , \quad \{T < -u_{1-\alpha}\} , \quad \{|T| > u_{1-\alpha/2}\}$$

et les p-valeurs

$$1 - \phi(T_{calc}) , \quad \phi(T_{calc}) , \quad 2 - 2\Phi(|T_{calc}|)$$

Pour la situation 3 les régions de rejet sont

$$\{T > t_{n_X+n_Y-2, 1-\alpha}\} , \quad \{T < -t_{n_X+n_Y-2, 1-\alpha}\} , \quad \{|T| > t_{n_X+n_Y-2, 1-\alpha/2}\}$$

et les p-valeurs

$$1 - F(T_{calc}) , \quad F(T_{calc}) , \quad 2 - 2F(|T_{calc}|)$$

où  $F$  est la FdR de la  $\mathcal{T}_{n_X+n_Y-2}$

## Exercice :

La taille d'une fille est elle plus variable que celle d'un garçon ?

Est-elle différente chez les filles et les garçons ?

Avec les données suivantes (voir poly) :

chez les filles :  $n_X = 14$  ,  $\sum x_i = 2288$ ,  $\sum x_i^2 = 376226$

chez les garçons :  $n_Y = 6$  ,  $\sum y_i = 1145$ ,  $\sum y_i^2 = 219231$