

和粉末观察，其结构及组成细胞区别见表2。

表2 复盆子与小柱悬钩子主要显微特征比较

药材名称		复 盆 子	小 柱 悬 钩 子
植物学名		Rubus chingii Hu	Rubus columellaris Tutch
小核果横切面	外果皮	表皮细胞一行，直径15~38μm，部分特化为毛茸	表皮细胞一行，直径13~25μm，无毛茸特化
	中果皮	为5~8列薄壁细胞，含草酸钙簇晶	为4~6列薄壁细胞，含草酸钙簇晶
	内果皮	外侧由6~7列纤维组成，内侧由7~8列纤维组成，两侧纤维相互交错；整体边缘有9~12个辐射棱	外侧由5~6列纤维组成，内侧由4~6列纤维组成，两侧纤维相互交错；整体边缘有8~10个辐射棱
粉	性状	棕黄色，略显油性	灰黄色，干燥松散
	非腺毛	为单细胞，多碎断。直径11~20μm，完整者长40~435μm。先端尖，基部略膨大，具孔沟和纹孔。壁厚，木化，表面常有螺旋	无
末离组织解	草酸钙簇晶	较大，直径17~48μm	较小，直径13~25μm
	内果皮纤维	众多，狭长，平直或弯曲，直径3.8~26.6μm，有显著分枝	众多，狭长，平直或弯曲，直径3.8~16.4μm，无显著分枝
	非腺毛	多完整存在	无

致谢 生药承武汉大学生物系郭友好同志
复核鉴定。

西北药学杂志 1988年12月；3（4）：19

中药桑白皮及其伪品的鉴定

康玉龙、张万年 （兰州军区药检所）

桑白皮系常用中药，具有泻肺平喘，行气消肿之功。但这次在我区中药质量抽查中，发现部分单位用的是伪品桑白皮，经鉴定为同科植物构树和柘树除去栓皮的根皮。以上两种伪

品在外观上与真品相似，容易混淆。为保证用药安全有效，现将其主要区别列表比较，以供参考。

	桑 白 皮	构 树 皮	柘 树 皮
始载	《神农本草经》	《别录》	《嘉祐本草》
来源	桑科植物桑 Morua alba L.	桑科植物构树 Broussonetia papyrifere (L.) Vent.	桑科植物柘树 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
性味	甘、寒，泻肺平喘	甘、平，利尿消肿	苦、平，凉血止血
外形	片状扭曲，厚1~5mm	筒状扭曲，两边内卷 厚1.5mm左右	片状扭曲，两边内卷 厚1~2.5mm
外表面	淡黄白色，并留棕黄色或红黄色栓皮斑块，有纵向细纹	白色，有残留黄淡褐色栓皮，有纵向细纹	粗糙淡白色，有残留橙黄色栓皮具横向皱纹及颗粒突起
内表面	灰黄白色，粗纤维状	淡黄，光滑	灰白色，有侧根痕穿孔
质地	体轻质韧，断面纤维性极强，极易纵向撕裂，并有白色粉末飞出	体轻质韧，断面纤维性较强，易纵向片层状撕裂，有白色粉尘飞出	体轻质韧，断面略带纤维性，纵向撕裂常中途断裂，有白色粉末飞出
断面			
气味	豆腥气浓，味甘微苦	气微，味淡	略有豆腥气，味微苦涩