

枳实不同炮制品对其挥发油的影响

江西中医学院药学系 桑千锋

主题词 中药炮制学 枳实/分析 挥发油

古代对枳实的炮制方法较多,早在汉代,《伤寒杂病论》有炙、烧、炒、麸炒等记载;到了宋代又增加了熬、醋制、烂、醋炒等。至明、清两代方法更多,在这众多的炮制方法之中,笔者选出了几种目前使用较多且具有代表性的方法(如麸炒、砂炒、醋制法),对挥发油的影响进行了初步研究。

实验方法

一、药材:购于新建县医药公司,本品经鉴定为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 的干燥幼果。

二、炮制:1.生枳实:将原药筛去灰屑,洗净,即得。2.麸炒枳实:先将锅烧热后,均匀撒入麸皮,待至冒烟时,投入枳实片,炒至麸焦黑色,药深黄色时,取出,筛去麸皮,放凉。3.醋制枳实:将枳实片加入米醋拌匀,闷润至醋被吸尽,投入锅中用文火炒至外黑色,内褐色,取出放凉(每100公斤枳实,用米醋35公斤)。4.砂炒枳实:将油砂置于锅内,武火加热至滑利状态,砂温在200℃时,加入枳实片,炒至全部鼓起,有裂隙时,筛去油砂,放凉即得。

实验结果

取生枳实、麸炒枳实、醋制枳实、砂炒枳实各490克,分别于挥发油提取器中提取,6小时后,读出挥发油毫升数,并于阿贝折射仪下,测定挥发油折光率,结果如下:

结果表明各种炮制方法均能降低枳实中挥发油含量,缓制其燥烈之性。其中砂炒法仅仅降低0.074%,可能是由于砂炒法在降低部分挥发油的同时,还使药材质地疏松,挥发油易于煎出,而对整个挥发油影响不大。醋制法降低挥发油量最大,达24.26%,因醋为有机弱酸,很可能对枳实中其它有效成分产生一定影响,再则,醋的成本较高,用量又大。麸炒后降低挥发油含量15.04%,其折光率增大,颜色加深。

综上所述,枳实以麸炒为好。其优点:一是麸炒后,可以缓和峻烈之性,以免损伤正气,减少对胃的刺激,这与“麦麸皮炒抑醋性,勿伤上膈”的传统用药理论是一致的。二是麸炒后可以赋色,使饮片外形美观,还有焦香气,增强健脾消食之功,三是麸炒后其挥发油的折光率增大,颜色加深。有关药理实验,尚待进一步研究。(杜克洪、谢敏两同学参加了此实验研究,在此致谢。)

四种规格枳实挥发油含量及折光率的测定

品名	挥发油颜色	挥发油数量 ml	挥发油折光率
生枳实	黄色	2.72	1.4272
麸炒枳实	深黄色	2.31	15.04 1.7349
醋制枳实	棕黄色	2.05	24.26 1.4726
砂炒枳实	黄色	2.70	0.074 1.4728

桑白皮及其伪品肥皂荚的鉴别

江西省吉安地区药品检验所 刘龙先

桑白皮为常用中药。为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的根皮。具泻肺平喘,利水消肿之功效。近来,发现桑白皮的伪品,病人服后有麻舌刺喉之感。经实地考察鉴别,属豆科植物肥皂荚 *Gymnocladus chinensis* Baill. 的根皮。为确保临床用药,现就两者的性状、特征鉴别如下,以供参考。

肥皂荚:根皮呈槽状、板状,少有卷筒状,长短宽窄不一,除去外皮,厚2—8mm。外表面黄白色或黄棕色,具不规则隆起的横纹,且有残留黄棕色或

灰褐色的栓皮。内表面黄白色,具纵皱纹。体重,质硬,不易折断,断面不平坦,纤维性差,气微,味苦涩且麻舌刺喉。

桑白皮:根皮呈扭曲的卷筒状、槽状、极少板状,长短宽窄不一,厚1~4mm。外表面淡黄色或黄棕色,有残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮。内表面黄白色或灰白色,有细纵皱纹。体轻,质韧,难折断,易纵撕裂,撕裂时有粉尘飞扬。微豆腥气,味微甘。