

胞,有的含草酸钙针晶束,内皮层外侧少数石细胞散在。韧皮部与木质部束约 19 个,间隔排列,各木质部束间为非木化的薄壁组织。

1.3 荧光反应 山麦冬:取本品的薄片,置紫外光灯(635 nm)下观察,显浅蓝色荧光。上麦冬:不显荧光。

2 土茯苓与白土茯苓的鉴别 《中国药典》(1990 年版)收载的土茯苓为百合科植物光叶菝葜 *Smilax glabra* Roxb 的干燥根茎。在我区新干医药市场上发现一代用品白土茯苓。经鉴定,为百合科植物肖菝葜 *Heterosmilax japonica* Kunth 的根茎。其外形与土茯苓相似,特别是切片后,就更不容易区别,现将鉴别情况简介如下:

2.1 性状鉴别 土茯苓:从略。白土茯苓:根茎是不规则块状,长 10cm~8cm。表面黄褐色,粗糙,有坚硬的须根残基。断面周围白色,中心黄色,粉性,切面稍粗糙,有小亮点。质软。味淡。

2.2 显微鉴别(横切面) 土茯苓:下皮为 3~5 列黄棕色细胞,皮层中散有大形粘液细胞,内含草酸钙针晶。中柱薄壁细胞径向延长,散列有限外韧型维管束,木质部通常有两个大的导管及数个较小的导管,韧皮部含有少量纤维,薄壁细胞中含有大量粉粒。白土茯苓:维管束多为周木型,木质部有数个直径相近的导管,其它和土茯苓相似。

桑白皮的理化鉴别

盛平钦

(江西滕王阁制药厂 330003)

关键词 桑白皮 黄酮类衍生物 理化鉴别

桑白皮为常用中药,收载于《中国药典》(1990 年版)一部。其质量标准项下只有性状和显微鉴别两项。据有关资料报道:桑白皮中含有桑皮素、桑皮色烯素、环桑皮素、环桑皮色烯素 4 种新的黄酮类衍生物,总含量达 0.386%。为了加强对药材质量的控制,确保药材质量,有必要对桑白皮所含的黄酮类衍生物进行理化鉴别。

1 样品与试剂 桑白皮:由亳州市天寿药材公司购进的原药材,称样(1);由亳州市振兴药材公司购进的原药材,称样(2);由南昌市黄庆仁药店购进的饮片,称样(3)。3 个样品,经本厂中心化验室检验,均符合药典规定。

2 实验方法 取桑白皮粗末 1g,加乙醇 10ml,加热回流 10 分钟,滤过。取滤液 2ml,置平底瓷蒸发皿内,加镁粉少量及盐酸数滴,置水浴加热,反应结果:3 个样品均

显红色,放置后颜色加深。

3 结果分析 3 个样品的理化鉴别,操作简便易行,显色反应明显,结果易于判断。作为桑白皮所含黄酮类衍生物的定性鉴别切实可行。

反应条件:应选择平底瓷蒸发皿内,水浴加热下进行。由于平底皿面积较大,在皿内反应液铺开的液层较薄,在水浴加热下,随着反应的进行,液体的蒸发,避免了反应液原有颜色的影响和干扰,加之又有瓷蒸发皿白色背景的衬托,故反应显色明显,结果易于观察。

加入镁粉量为 10mg~15mg,用药匙的匙柄挑取少许即可,盐酸用量 3~4 滴即可。

中药材标本的简易保管方法

孙饶红

(江西省上饶地区医药公司 334000)

赵仁庚

(江西省南昌市药品检验所 330003)

关键词 中药材 标本 保管方法

在进行中药材鉴定时均需核对中药材标本,而中药材标本因为常用,易虫蛀、发霉、变色、走油等,不利于核对。为了保管好中药材标本,一般采用干燥—熏硫的方法。我们采用干燥—无水乙醇法,收到理想的效果,中药材标本可保存 5 年以上。此方法简单易行可靠,特简要介绍如下:

用注射器将无水乙醇注入长颈安瓿中,长颈安瓿的高度应是标本瓶高度的 $3/4 \sim 4/5$,颈长约为安瓿高度的 $2/3$,开口越小越好。中药材标本常规干燥后与已注满无水乙醇的长颈安瓿放入标本瓶中,并每隔半年换 1 次无水乙醇,更可保留原来的色、香、味等,随时可供使用,核对。

莽草与八角茴香的鉴别

余谨发

(江西省南昌铁路中心医院 330003)

关键词 莽草 毒副反应 八角茴香

1988 年笔者在基层医疗单位时,有个基层医药收购站,从外地调进一批莽草误认为八角茴香,造成了严重中毒事故。本品经鉴定为同属植物莽草。它们的果实,从外形极为相似,容易造成混淆。为了人民用药安全有效,将两者药材作如下区别,以供参考。

八角茴香:为木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f 的干燥成熟果实。其功能与主治:温阳散寒,理