

6. 检查牛、羊胆时,由于“进标”未用正品熊胆及游离的 CA、DCA、UDCA、CDCA 对照,无法判断检品所显斑点哪些是 CA、DCA、UDCA 和 CDCA 斑点一致外的其它与牛、羊胆相同的斑点。所以应该用正品熊胆对照,在荧光下观察薄层图谱,利于判断。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国卫生部进口药材部标准, Ws4-1-86
- [2] 谢培山:中药材科技, (6):20, 1982
- [3] 陈鹏仙:中药通报, (1):13, 1988
- [4] 俞长芳:中药材科技, (1):31, 1982

湖南桑白皮的原植物 调查与鉴定

湖南省湘西自治州药品检验所
(吉首 416000) 杨德泉

桑白皮为常用中药,具有泻肺平喘,利水消肿的功效。据明·李时珍《本草纲目》载:“桑根白皮……桑有数种,有白桑,叶大如掌而厚;鸡桑,叶花而薄;子桑,先椹而后叶;山桑,叶尖而长”,桑白皮不单来源于一种植物。为此,笔者对湖南省桑白皮的来源进行了调查,并进行了原植物鉴定。

一、桑白皮的来源分布和药用情况

经调查,湖南省药用桑白皮来源于桑科的四种植物根皮:桑 *Morus alba* L.、鸡桑 *M. australis* Poir、华桑 *M. cathayana* Hemsl. 和蒙桑 *M. mongolica* Schneid.

桑在湖南多为家种,习惯上称为家桑,为养蚕而种,所以,挖取其根皮药用的不多,在桑园垦复时才取皮,故而药材产量不大。但本种分布广,全省各地均有。湖南省的商品桑白皮的主流是华桑及蒙桑根皮,前者习称岩桑,后者习称刺叶桑,主要分布在湘西自治州、大庸市、怀化及邵阳地区,其它地区也有少量分布。鸡桑主要分布在湘西各县,别名小叶桑、野桑,药材产量小于前三种。

二、桑白皮原植物分种检索表

1. 叶表面近于光滑,花单性、雌雄异株
 2. 背面无毛,叶缘锯齿先端为刺芒状
……蒙桑 *M. mongolica* Schneid
 2. 背面叶脉上有疏毛或无毛
 3. 背面脉腋间具簇状毛。叶通常不分裂,子房无花柱或柱极短……家桑 *M. alba* L.
 3. 背面脉上疏生短柔毛,无腋毛,叶常分裂;子房有明显花柱……鸡桑 *M. australis* Poir
1. 叶表面粗糙,背面密生细柔毛;花单性,雌雄同株而异枝……华桑 *M. cathayana* Hemsl.

介绍一种进口西红花伪品

山西省运城地区药品检验所(044100) 王宏斌

西红花为较常用中药,系鸢尾科植物番红花 *Crocus sativus* L. 的干燥柱头。我们在检验过程中,发现一种进口西红花伪品,该品肉眼观察与真品极为相似,外包装用透明玻璃纸罩一个小纸盒(长 3.2 cm、宽 2.2 cm、高 1.5 cm),纸盒底色为蓝色,上有红、黄、白、黑四色套印字样,正面印有朝文和英文,商标为皇冠牌,背面有四种文字注明 100% 纯正西红花;侧面英文注明印度孟买制造;内包装为圆形红色小塑料盒,装量为 1 克。

取该品少量置水中观察,宽端扁平,顶端正齐,无波状凸起,不成喇叭状;体色很快消退,用针拨之,外包一层皮脱离破碎,内留白色小丝条。另取该品少量置白瓷板上,加硫酸 1 滴,酸液显黄色后变为褐黄色。根据以上水试和加硫酸试验判断,该西红花是以化学纸浆做成丝状、外包一层染色物质而制成,纯系伪品,不可供药用。

醋炒柴胡一法

南京市钟山医院(210014) 殷静先

取原药材除去残茎及杂质,洗净润透,切片干燥,置于电热保温干燥箱中,待温度升至 100℃ 时恒温 20 分钟,取出加醋(每 100 公斤柴胡用醋 10 公斤),拌匀置烘箱中,烘至表面呈微黄褐色、质干脆、具有醋气即可。此法不焦片和糊化,尤其适于医院药房、医药门市部等小量需要。成品色泽美观,质松。