

# **CONTINUITÉ**

## **Continuité sur un intervalle**

### *Définition*

$f$  est une fonction définie sur un intervalle  $I$ ,  $a$  est un nombre qui appartient à  $I$ .

1. La fonction  $f$  est continue en  $a$  si et seulement si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
2. La fonction  $f$  est continue sur l'intervalle  $I$  si et seulement si  $f$  est continue en tout nombre de  $I$ .

## **Dérivabilité et continuité**

### *Théorème*

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $a$  un nombre qui appartient à  $I$ .  
Si  $f$  est dérivable en  $a$ , alors  $f$  est continue en  $a$ .

### *Démonstration*

Dire que  $f$  est dérivable en  $a$  signifie que la fonction  $g$  définie sur  $I \setminus \{a\}$  par

$$g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

a pour limite le nombre réel  $f'(a)$  lorsque  $x$  tend vers  $a$ .

$$\forall x \neq a :$$

$$g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\Leftrightarrow g(x) \cdot (x - a) = f(x) - f(a)$$

$$\Leftrightarrow f(x) = g(x) \cdot (x - a) + f(a)$$

On obtient donc

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left( \underbrace{\underbrace{g(x)}_{\rightarrow f'(a)} \cdot \underbrace{(x-a)}_{\rightarrow 0}}_{\rightarrow 0} + f(a) \right)$$

$f$  est donc continue en  $a$

cqfd

### ***Attention***

La réciproque du Théorème est fausse. Une fonction peut être continue en  $a$  sans être dérivable en  $a$ .

### ***Démonstration***

Démonstration par un contre exemple.

La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0 et sa représentation graphique admet une tangente verticale au point (0; 0). Mais la fonction racine carrée est continue en 0, car:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$$

cqfd

## **Fonctions continues et résolution d'équations**

### ***Théorème des valeurs intermédiaires***

Si  $f$  est une fonction continue sur un intervalle  $[a; b]$  et si  $k$  est un nombre réel compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , alors il existe au moins un nombre réel  $c$  de  $[a; b]$  tel que

$$f(c) = k$$

### ***Théorème***

Si  $f$  est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle  $I = [a; b]$

1. L'image de l'intervalle  $I$  par  $f$  est l'intervalle  $J = [f(a); f(b)]$
2. Pour tout nombre réel  $k$  de  $[f(a); f(b)]$ , l'équation

$$f(x) = k$$

a une solution et une seule dans l'intervalle  $[a; b]$

### ***Théorème***

Si  $f$  est une fonction continue et strictement monotone sur  $I = [a; b]$  et  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , alors l'équation  $f(x) = 0$  a une solution et une seule dans  $I$ .

### ***Théorème***

Si  $f$  est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$ , alors :

1. L'image  $f(I)$  d'un intervalle  $I$  par  $f$  est un intervalle  $J$ .
2. Pour tout nombre réel  $k$  de  $J$ , l'équation  $f(x) = k$  a une solution et une seule dans  $I$ .

## **Résumé**

Le tableau suivant résume les différents cas possibles.

Si $I =$	$f$ est strictement croissante sur $I$	$f$ est strictement décroissante sur $I$
----------	--	--

	$f(I)$ est l'intervalle	$f(I)$ est l'intervalle
$[a; b]$	$[f(a); f(b)]$	$[f(b); f(a)]$
$]a; b]$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x); f(b)]$	$[f(b); \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
$[a; b[$	$[f(a); \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow b} f(x); f(a)$
$]a; b[$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x); \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x); \lim_{x \rightarrow b} f(x)$