

# **LOGIQUE ÉLÉMENTAIRE**

## **Propositions et assertions**

### *Definition*

Une proposition, ou assertion, est une phrase qui peut être vraie ou fausse.

### *Remarque*

Les propositions peuvent être mathématiques, ou plus générales.

Nous utiliserons les lettres capitales  $A$ ,  $B$  etc. pour désigner des assertions mathématiques. On peut noter qu'une phrase en langue naturelle peut être vraie ou fausse, mais peut aussi ne pas avoir de valeur de vérité bien définie.

## **Tautologie**

### *Definition*

Une tautologie est une assertion qui est vraie du fait de sa construction.

## **Opérations sur les assertions**

### *Définitions*

- La négation d'une assertion  $A$ , notée  $\neg A$ , est l'assertion qui est vraie si  $A$  est fausse, et fausse si  $A$  est vraie.
- La conjonction de deux assertions  $A$  et  $B$ , notée  $A \wedge B$ , est l'assertion qui est vraie si et seulement si  $A$  est vraie et  $B$  est vraie. On la lit “et”.
- La disjonction de deux assertions  $A$  et  $B$ , est l'assertion  $A \vee B$  qui est vraie si et seulement si  $A$  est vraie ou  $B$  est vraie. On la lit “ou”.

### *Remarque*

Dans une expression composée, la négation prend la priorité sur  $\vee$  et  $\wedge$ .

## **Propositions atomiques, assertions atomiques, variables propositionnelles**

### ***Definition***

Les assertions atomiques, sont des assertions qui ne sont pas obtenues comme composition d'autres assertions.

## **Table de vérité**

Les tables de vérité sont un moyen efficace pour analyser une proposition composée  $C$  à partir de plusieurs assertions atomiques  $A, B, \dots$ . Ce sont des tableaux ayant une ligne pour chaque valeur possible des assertions  $A, B, \dots$  qui apparaissent dans  $C$ , et on met dans les cases correspondantes les valeurs de  $C$ . Ces valeurs sont obtenues à partir des valeurs des variables propositionnelles en utilisant les tables de vérités qui définissent les opérations  $\wedge, \vee$  et  $\neg$ , et en utilisant les règles de priorités sur les opérations. On représente habituellement la valeur “vrai” par 1 et “faux” par 0, et on parle de valeurs de vérités.

## **L'algèbre de Boole**

### ***Propriétés***

- Associativité de  $\wedge$

$$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$$

- Associativité de  $\vee$

$$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$$

- Commutativité de  $\wedge$

$$A \wedge B = B \wedge A$$

- Commutativité de  $\vee$

$$A \vee B = B \vee A$$

- Distributivité de  $\wedge$  par rapport à  $\vee$

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

- L'assertion vraie 1 est élément neutre pour  $\wedge$  et l'assertion fausse 0 est élément neutre pour  $\vee$ .

$$A \wedge 1 = A$$

$$A \vee 0 = A$$

- Distributivité de  $\vee$  par rapport à  $\wedge$

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

- Double négation

$$\neg(\neg A) = A$$

- Loi de Morgan

$$\neg(A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$$

- Loi de Morgan

$$\neg(A \wedge B) = (\neg A) \vee (\neg B)$$

- $$(\neg A) \wedge A = 0$$

- $$(\neg A) \vee A = 1$$

- Loi d'absorption

- $$(A \wedge B) \vee B = B$$

- $$(A \vee B) \wedge B = B$$

## **Implication et équivalence**

A partir des opérateurs  $\neg$ ,  $\wedge$  et  $\vee$ , on peut introduire d'autres opérateurs logiques utiles.

### ***Définition***

On note  $\Rightarrow$  l'opérateur "Implication" défini pour deux assertions  $A$  et  $B$  quelconques par:

$$(A \Rightarrow B) = (\neg A) \vee B$$

### ***Remarque***

On dira que  $A$  implique  $B$  si l'assertion  $A \Rightarrow B$  est vraie. On dit que  $A$  est l'antécédent, et que  $B$  est le conséquent, de l'implication  $A \Rightarrow B$ .

### ***Définition***

L'implication  $B \Rightarrow A$  est appelée réciproque de l'implication  $A \Rightarrow B$ .

### ***Conséquence***

- Il suit de la définition que  $A \Rightarrow B$  est vraie sauf dans le cas où  $A$  est vraie et  $B$  est fausse. Ceci correspond à l'implication qu'on utilise dans le langage courant.
- On note aussi  $\Leftarrow$  l'implication dans le sens inverse, c'est-à-dire que  $B \Leftarrow A$  est équivalent à  $A \Leftarrow B$ .

### ***Définition***

L'implication  $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$  est appelée contraposée de l'implication  $A \Rightarrow B$ .

### ***Proposition***

Une implication est équivalente à sa contraposée.

### ***Démonstration***

On veut montrer que  $A \Rightarrow B$  est vraie si et seulement si  $(\neg A) \Rightarrow (\neg B)$ . Or  $A \Rightarrow B$  est fausse si et seulement si  $A$  est vraie et  $B$  est fausse. Mais  $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$  est fausse si et seulement si  $(\neg B)$  est vraie et  $(\neg A)$  est fausse, donc si et seulement si  $A$  est vraie et  $B$  est fausse. Les deux assertions ont donc exactement les mêmes valeurs de vérité, elles sont donc équivalentes.

$$\begin{aligned}(A \Rightarrow B) &= ((\neg A) \vee B) \\ &= ((\neg A) \vee (\neg(\neg B))) \\ &= ((\neg(\neg B)) \vee (\neg A)) \\ &= (\neg B) \Rightarrow (\neg A)\end{aligned}$$

cqfd.