Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 100 mg polvere per sospensione orale
Zitromax 150 mg polvere per sospensione orale
Zitromax 200 mg polvere per sospensione orale
Zitromax 300 mg polvere per sospensione orale
Zitromax 400 mg polvere per sospensione orale

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax
3. Come prendere Zitromax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina, L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che bloccano la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg
- infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causata da batteri chiamati streptococchi
- infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)
- infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti
- infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)

Adulti che hanno difficoltà di deglutizione:
- infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax

Non prenda Zitromax
- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;
- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):

- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea prima di aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

<u>Superinfezione</u>
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

<u>Infezioni trasmesse per via sessuale</u>
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in tutti i casi di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti
Si rivolga al medico o al farmacista se il bambino ha meno di 6 mesi, poiché l'efficacia e la sicurezza di questo medicinale non sono state dimostrate in questi bambini, oppure se pesa meno di 16 kg, poiché esistono altri medicinali più appropriati per il trattamento.

<u>Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)</u>
Se il bambino ha meno di 6 mesi e il medico ha raccomandato un trattamento con azitromicina, interrompere la somministrazione di questo medicinale e contattare immediatamente il medico se si manifesta vomito a getto o diviene irritabile durante i pasti o subito dopo.

Altri medicinali e Zitromax
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);
- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:
  - chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
  - pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
  - citalopram (per il trattamento della depressione);
  - moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
  - cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
  - idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento

Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene saccarosio, glucosio, alcol benzilico e sodio

Questo medicinale contiene saccarosio e glucosio in ogni bustina da 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg e 400 mg. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 5,8 g di saccarosio e 42 mg di glucosio in ogni bustina da 300 mg.
Questo medicinale contiene 7,7 g di saccarosio e 56 mg di glucosio in ogni bustina da 400 mg.
Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Questo medicinale contiene 0,18 microgrammi di alcol benzilico in ogni bustina da 100 mg.
Questo medicinale contiene 0,26 microgrammi di alcol benzilico in ogni bustina da 150 mg.
Questo medicinale contiene 0,35 microgrammi di alcol benzilico in ogni bustina da 200 mg.
Questo medicinale contiene 0,53 microgrammi di alcol benzilico in ogni bustina da 300 mg.
Questo medicinale contiene 0,70 microgrammi di alcol benzilico in ogni bustina da 400 mg.
L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per bustina, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Questo medicinale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche.

3. Come prendere Zitromax

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate e la durata del trattamento sono di seguito riportate.

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale) Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)	Per questa infezione è previsto un ciclo di trattamento di 1 giorno, 3 giorni o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 1 giorni* dose singola da 30 mg/kg *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 20 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12 mg/kg/die per 5 giorni

È importante assicurarsi di utilizzare la quantità di Zitromax indicata nella tabella sottostante in base al peso corporeo del paziente, all'infezione da trattare e al ciclo di trattamento specifico (1 giorno, 3 giorni, 5 giorni) che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e adolescenti di peso compreso tra 16 kg e 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)	

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale) Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)	Per questa infezione è previsto un ciclo di trattamento di 1 giorno, 3 giorni o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 1 giorno* dose singola da 30 mg/kg *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 2 anni e di peso inferiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 20 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12 mg/kg/die per 5 giorni

È importante assicurarsi di utilizzare la quantità di Zitromax indicata nella tabella sottostante in base al peso corporeo del paziente, all'infezione da trattare e al ciclo di trattamento specifico (1 giorno, 3 giorni, 5 giorni) che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno Polvere per sospensione orale in bustine**				
	5 mg/kg	**10 mg/kg**	**12 mg/kg**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
16-25	100 mg	200 mg	250 mg	400 mg	600 mg
26-35	150 mg	300 mg	350 mg	500 mg[#]	900 mg
36- < 45	200 mg	400 mg	450 mg	500 mg[#]	1200 mg

[#] non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Se il suo bambino pesa meno di 16 kg, la polvere per sospensione orale in flacone di questo medicinale è la più appropriata; chieda al suo medico o al farmacista.

Pazienti adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che hanno difficoltà a deglutire

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Le dosi raccomandate e la durata del trattamento sono come di seguito riportate.

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media) Infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)* Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)# Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni e la quantità di Zitromax da assumere ogni giorno per questi cicli di trattamento è descritta di seguito. *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 500 mg assunti una volta al giorno per 3 giorni. *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 500 mg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 250 mg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni.

* solo per pazienti adulti

per i pazienti adulti il trattamento orale può seguire un trattamento endovenoso iniziale

Uso nei bambini e negli adolescenti
La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

Modo di somministrazione
Per uso orale dopo ricostituzione.

Zitromax deve essere assunto in dose singola giornaliera. Aggiungere l'intero contenuto della bustina in un bicchiere contenente poca acqua e miscelare bene. Una volta miscelata, la sospensione orale deve essere ingerita immediatamente. Se nel bicchiere rimane una parte della sospensione, è possibile aggiungere poca acqua, agitare il bicchiere e poi ingerire la sospensione rimanente. La sospensione può essere assunta indipendentemente dai pasti. L'assunzione di questo medicinale appena prima di un pasto può contribuire a ridurre eventuali disturbi di stomaco.

Se prende più Zitromax di quanto deve
Se prende più Zitromax di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contattare il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax
Se dimentica di prendere Zitromax, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Se interrompe il trattamento con Zitromax troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca* o *tachicardia da torsione di punta*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica*, frequenza non nota).
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)
- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa
- vomito, dolore allo stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia*)
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sensazione di sonnolenza (*sonnolenza*), alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della vista
- disturbo dell'orecchio
- sensazione di capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito)*
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale*) e insufficienza della funzione renale

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zitromax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sulla bustina dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax
Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
Ogni bustina di Zitromax 100 mg polvere per sospensione orale contiene 100 mg di azitromicina (equivalenti a 104,8 mg di azitromicina diidrato).
Ogni bustina di Zitromax 150 mg polvere per sospensione orale contiene 150 mg di azitromicina (equivalenti a 157,2 mg di azitromicina diidrato).
Ogni bustina di Zitromax 200 mg polvere per sospensione orale contiene 200 mg di azitromicina (equivalenti a 209,6 mg di azitromicina diidrato).
Ogni bustina di Zitromax 300 mg polvere per sospensione orale contiene 300 mg di azitromicina (equivalenti a 314,4 mg di azitromicina diidrato).
Ogni bustina di Zitromax 400 mg polvere per sospensione orale contiene 400 mg di azitromicina (equivalenti a 419,2 mg di azitromicina diidrato).

Gli altri componenti sono: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di banana (contiene alcol benzilico), aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte), aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico), **saccarosio** (vedere paragrafo "Zitromax contiene saccarosio").

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione
La polvere per sospensione orale di Zitromax è disponibile in bustine di alluminio rivestite esternamente con carta ed internamente con polietilene. Ogni confezione contiene 3 bustine.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è Zitromax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax
3. Come prendere Zitromax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina, L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che bloccano la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg
- infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causata da batteri chiamati streptococchi
- infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)
- infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti
- infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)

Adulti che hanno difficoltà di deglutizione:
- infezioni batteriche in pazienti adulti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax

Non prenda Zitromax
- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):

- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea prima di aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

Superinfezione
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

Infezioni trasmesse per via sessuale
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in tutti i casi di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti

Se il bambino ha meno di 6 mesi, consulti il medico o il farmacista, poiché l'efficacia e la sicurezza di questo medicinale non sono state dimostrate in questa fascia d'età.

Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)
Se il bambino ha meno di 6 mesi e il medico ha raccomandato un trattamento con azitromicina, interrompere la somministrazione di questo medicinale e contattare immediatamente il medico se si manifesta vomito a getto o diviene irritabile durante i pasti o subito dopo.

Altri medicinali e Zitromax

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:
  - chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
  - pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
  - citalopram (per il trattamento della depressione);
  - moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
  - cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
  - idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, o per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento

Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene saccarosio, glucosio, alcol benzilico e sodio

Questo medicinale contiene saccarosio e glucosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 0,35 microgrammi di alcol benzilico per 5 ml (200 mg) di sospensione orale, che in seguito alla preparazione della sospensione sono equivalenti a 0,07 microgrammi/ml di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio in 5 ml di sospensione orale, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Questo medicinale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche.

3. Come prendere Zitromax

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate e la durata del trattamento sono di seguito riportate.

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni batteriche dei seni	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

paranasali (sinusite) Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale) Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)	Per questa infezione è previsto un ciclo di trattamento di 1 giorno, 3 giorni o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 1 giorni* dose singola da 30 mg/kg *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 20 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12 mg/kg/die per 5 giorni

È importante assicurarsi di utilizzare la quantità di Zitromax indicata nella tabella sottostante in base al peso corporeo del paziente, all'infezione da trattare e al ciclo di trattamento specifico (1 giorno, 3 giorni, 5 giorni) che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno sospensione orale da 40 mg/mL in flacone dopo ricostituzione (15 ml) ^**				
	5 mg/kg+	**10 mg/kg**	**12 mg/kg++**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
7	1,00 mL (40 mg)*	1,75 mL (70 mg)*	2,25 mL (90 mg)	3,50 mL (140 mg)	5,25 mL (210 mg)
8	1,00 mL (40 mg)*	2,00 mL (80 mg)*	2,50 mL (100 mg)	4,00 mL (160 mg)	6,00 mL (240 mg)
9	1,25 mL (50 mg)*	2,25 mL (90 mg)	2,75 mL (110 mg)	4,50 mL (180 mg)	6,75 mL (270 mg)
10	1,25 mL (50 mg)*	2,50 mL (100 mg)	3,00 mL (120 mg)	5,00 mL (200 mg)	7,50 mL (300 mg)
11	1,50 mL (60 mg)*	2,75 mL (110 mg)	3,25 mL (130 mg)	5,50 mL (220 mg)	8,25 mL (330 mg)
12	1,50 mL (60 mg)*	3,00 mL (120 mg)	3,75 mL (150 mg)	6,00 mL (240 mg)	9,00 mL (360 mg)
13	1,75 mL (70 mg)*	3,25 mL (130 mg)	4,00 mL (160 mg)	6,50 mL (260 mg)	9,75 mL (390 mg)
14	1,75 mL (70 mg)*	3,50 mL (140 mg)	4,25 mL (170 mg)	7,00 mL (280 mg)	10,50 mL (420 mg)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

15	2,00 mL (80 mg)*	3,75 mL (150 mg)	4,50 mL (180 mg)	7,50 mL (300 mg)	11,25 mL (450 mg)
16-25	2,50 mL (100 mg)	5,00 mL (200 mg)	6,25 mL (250 mg)	10,00 mL (400 mg)	15,00 mL (600 mg)
26-35	3,75 mL (150 mg)	7,50 mL (300 mg)	8,75 mL (350 mg)	12,50 mL (500 mg) #	22,50 mL (900 mg)
36- < 45	5,00 mL (200 mg)	10,00 mL (400 mg)	11,25 mL (450 mg)	12,50 mL (500 mg) #	30,00 mL (1200 mg)

^dopo ricostituzione, la concentrazione della sospensione orale è 40 mg/mL e il volume totale di sospensione nel flacone è 15 ml (600 mg)

+ Le dosi sono state arrotondate per ottenere una dose appropriate da somministrare.

++ Le dosi sono state arrotondate per ottenere una dose appropriate da somministrare.

*azitromicina 20 mg/mL (100 mg/5 mL) polvere per sospensione orale è la più appropriata da somministrare a questi pazienti.

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Pazienti adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che hanno difficoltà a deglutire

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media) Infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)* Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)# Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni e la quantità di Zitromax da assumere ogni giorno per questi cicli di trattamento è descritta di seguito. *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 12,5 mL (500 mg) assunti una volta al giorno per 3 giorni. *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12,5 mL (500 mg) assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 6,25 mL (250 mg) assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni.

* solo per pazienti adulti

per i pazienti adulti il trattamento orale può seguire un trattamento endovenoso iniziale

La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

Modo di somministrazione

Per uso orale dopo ricostituzione.

Zitromax deve essere assunto per via orale in un'unica dose giornaliera. La sospensione orale può essere assunta indipendentemente dai pasti. L'assunzione di questo medicinale appena prima di un pasto può contribuire a migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Se il flacone di Zitromax ricevuto dal medico o dal farmacista contiene solo polvere e nessun liquido, è necessario aggiungere un volume specifico di acqua al flacone prima di poterlo utilizzare. Se il medico o il farmacista hanno già provveduto a sciogliere la polvere, è possibile procedere direttamente al

Agenzia Italiana del Farmaco


Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).


paragrafo “Istruzioni per l’assunzione di ciascuna dose giornaliera di Zitromax sospensione orale” di seguito riportato.

Istruzioni per la preparazione di Zitromax polvere per sospensione orale prima del primo utilizzo

Contenuto di ogni scatola di Zitromax:

- 1 flacone di Zitromax
- 1 adattatore a pressione per flacone
- 1 siringa dosatrice per somministrazione orale da 10 ml graduata in divisioni da 0,25 ml che eroga 10 mg di azitromicina per ogni graduazione






Punto 1. Agitare bene il flacone per smuovere la polvere prima di aggiungere acqua. Riempire un bicchiere con acqua e tenerlo accanto al flacone.




Punto 2. Separare l’adattatore a pressione per flacone dall’estremità della siringa dosatrice per somministrazione orale e conservarlo nella scatola.



Punto 3. Aprire il flacone premendo il tappo a prova di bambino e ruotando contemporaneamente in senso antiorario.


Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).




Punto 4. Aggiungere acqua al flacone utilizzando la siringa dosatrice per prelevarla dal bicchiere e aggiungerla al flacone. Il volume d'acqua necessario dipende dalla dimensione del flacone in dotazione.

- Flacone da 15 ml: aggiungere 9 ml di acqua.




Se si osservano bolle d'aria nella siringa dosatrice, spingere completamente lo stantuffo per riversare l'acqua nel bicchiere. Ripetere quindi il passaggio per prelevare l'acqua senza che si formino bolle d'aria. Quando si aggiunge l'acqua, il flacone deve essere tenuto inclinato in modo che la maggior parte della polvere non si depositi sul fondo.

Punto 5. Afferrare l'adattatore a pressione per flacone e spingerlo verso il basso nella bocca del falcone per fissarlo saldamente. Riavvitare il tappo sul flacone.



Punto 6. Agitare bene il flacone finché tutta la polvere non si sarà miscelata adeguatamente con l'acqua.



Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).


La sospensione orale è ora pronta per l'uso.
Conservare la siringa dosatrice nella scatola, in quanto sarà necessaria per assumere ogni dose giornaliera di Zitromax sospensione orale.

Istruzioni per l'assunzione della dose giornaliera di Zitromax sospensione orale

Punto 1. Agitare bene il flacone ogni volta prima di assumere una dose della sospensione orale.




Punto 2. Aprire il flacone e inserire la punta della siringa dosatrice nell'apertura dell'adattatore a pressione per flacone, dopo aver verificato che sia ancora saldamente inserito nella bocca del flacone.



Assicurarsi che lo stantuffo della siringa dosatrice sia spinto completamente verso il basso e che il flacone sia in posizione verticale su una superficie piana.

Punto 3. Capovolgere il flacone con la siringa dosatrice in posizione e tirare indietro lentamente lo stantuffo finché la parte superiore dello stantuffo non si trova in corrispondenza della tacca della siringa dosatrice corrispondente al volume (in ml) di Zitromax che il medico le ha prescritto di assumere.




Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).


La siringa dosatrice ha un volume totale di 10 ml e presenta tacche da 0,25 ml. A seconda del volume totale (in ml) di Zitromax sospensione orale che deve assumere, potrebbe essere necessario utilizzare la siringa dosatrice più di una volta per assumere l'intera dose.

Se si osservano bolle d'aria nella siringa dosatrice, spingere completamente lo stantuffo per riversare la sospensione orale nel flacone. Ripetere quindi questo passaggio per prelevare la sospensione orale senza che si formino bolle d'aria.

Punto 4. Rimuovere la siringa dosatrice dall'adattatore a pressione per flacone tirandola con cautela verso l'alto e ruotando il flacone in posizione verticale, quindi appoggiarlo su una superficie piana.



Punto 5. Somministrare la dose di Zitromax




Assicurarsi che il/la bambino/a sia in posizione eretta e inserire la punta della siringa per somministrazione orale nella sua bocca. Puntare la siringa dosatrice verso la parte interna della guancia e spingere lentamente verso il basso lo stantuffo della siringa dosatrice per erogare la sospensione nella bocca. Potrebbe essere necessario utilizzare la siringa dosatrice per somministrazione orale più di una volta per somministrare la quantità di sospensione orale prescritta al/alla bambino/a.

Punto 6. Chiudere il flacone e lavare la siringa dosatrice

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Riavvitare il tappo sul flacone, lasciando l'adattatore a pressione ancora inserito nella bocca del flacone.
Estrarre lo stantuffo dalla siringa dosatrice e lavare entrambi i componenti della siringa dosatrice con acqua. Asciugarli. Spingere nuovamente lo stantuffo nella siringa dosatrice. Conservare la siringa dosatrice nella scatola, in quanto sarà necessaria per assumere ogni dose giornaliera di Zitromax sospensione orale.
Ripetere questi passaggi per ogni giorno del ciclo di trattamento.

Se prende più Zitromax di quanto deve

Se prende più Zitromax di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contatti il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax

Se dimentica di prendere Zitromax, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax

Se interrompe il trattamento con Zitromax troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca* o *tachicardia da torsione di punta*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica*, frequenza non nota)
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa
- vomito, dolore allo stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia*)
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sensazione di sonnolenza (*sonnolenza*), alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della vista
- disturbo dell'orecchio
- sensazione di capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito)*
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale*) e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zitromax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale, dopo la ricostituzione, è stabile per 10 giorni a temperatura ambiente.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
100 g di polvere contengono 4,78 g di azitromicina (equivalenti a 5,01 g di azitromicina biidrato).

Gli altri componenti sono: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di banana (contiene alcol benzilico), aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte), aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico), **saccarosio** (vedere paragrafo "Zitromax contiene saccarosio").

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione
La polvere per sospensione orale di Zitromax è disponibile in flacone di polietilene contenente 600 mg di azitromicina con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore. Una volta ricostituita la sospensione conterrà 200 mg/5 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax
3. Come prendere Zitromax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina, L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che bloccano la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg
- infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi
- infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)
- infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti
- infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)

Adulti che hanno difficoltà di deglutizione:
- infezioni batteriche in pazienti adulti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax

Non prenda Zitromax
- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):

- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea prima di aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

Superinfezione
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

Infezioni trasmesse per via sessuale
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in ogni caso di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti

Se il bambino ha meno di 6 mesi, consulti il medico o il farmacista, poiché l'efficacia e la sicurezza di questo medicinale non sono state dimostrate in questa fascia d'età.

Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)
Se il bambino ha meno di 6 mesi e il medico ha raccomandato un trattamento con azitromicina, interrompere la somministrazione di questo medicinale e contattare immediatamente il medico se si manifesta vomito a getto o diviene irritabile durante i pasti o subito dopo.

Altri medicinali e Zitromax

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);
- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:
  - chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
  - pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
  - citalopram (per il trattamento della depressione);
  - moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
  - cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
  - idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento

Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene saccarosio, glucosio, alcol benzilico e sodio

Questo medicinale contiene saccarosio e glucosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 0,35 microgrammi di alcol benzilico per 5 ml (200 mg) di sospensione orale, che in seguito alla preparazione della sospensione sono equivalenti a 0,07 microgrammi/ml di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio in 5 ml di sospensione orale, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Questo medicinale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche.

3. Come prendere Zitromax

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate e la durata del trattamento sono di seguito riportate.

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale) Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)	Per questa infezione è previsto un ciclo di trattamento di 1 giorno, 3 giorni o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 1 giorni* dose singola da 30 mg/kg *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 20 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12 mg/kg/die per 5 giorni

È importante assicurarsi di utilizzare la quantità di Zitromax indicata nella tabella sottostante in base al peso corporeo del paziente, all'infezione da trattare e al ciclo di trattamento specifico (1 giorno, 3 giorni, 5 giorni) che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno sospensione orale da 40 mg/mL in flacone dopo ricostituzione (22,5 ml o 30 ml) ^**				
	5 mg/kg+	**10 mg/kg**	**12 mg/kg++**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
7	1,00 mL (40 mg)*	1,75 mL (70 mg)*	2,25 mL (90 mg)	3,50 mL (140 mg)	5,25 mL (210 mg)
8	1,00 mL (40 mg)*	2,00 mL (80 mg)*	2,50 mL (100 mg)	4,00 mL (160 mg)	6,00 mL (240 mg)
9	1,25 mL (50 mg)*	2,25 mL (90 mg)	2,75 mL (110 mg)	4,50 mL (180 mg)	6,75 mL (270 mg)
10	1,25 mL (50 mg)*	2,50 mL (100 mg)	3,00 mL (120 mg)	5,00 mL (200 mg)	7,50 mL (300 mg)
11	1,50 mL (60 mg)*	2,75 mL (110 mg)	3,25 mL (130 mg)	5,50 mL (220 mg)	8,25 mL (330 mg)
12	1,50 mL (60 mg)*	3,00 mL (120 mg)	3,75 mL (150 mg)	6,00 mL (240 mg)	9,00 mL (360 mg)
13	1,75 mL (70 mg)*	3,25 mL (130 mg)	4,00 mL (160 mg)	6,50 mL (260 mg)	9,75 mL (390 mg)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

14	1,75 mL (70 mg)*	3,50 mL (140 mg)	4,25 mL (170 mg)	7,00 mL (280 mg)	10,50 mL (420 mg)
15	2,00 mL (80 mg)*	3,75 mL (150 mg)	4,50 mL (180 mg)	7,50 mL (300 mg)	11,25 mL (450 mg)
16-25	2,50 mL (100 mg)	5,00 mL (200 mg)	6,25 mL (250 mg)	10,00 mL (400 mg)	15,00 mL (600 mg)
26-35	3,75 mL (150 mg)	7,50 mL (300 mg)	8,75 mL (350 mg)	12,50 mL (500 mg) #	22,50 mL (900 mg)
36- < 45	5,00 mL (200 mg)	10,00 mL (400 mg)	11,25 mL (450 mg)	12,50 mL (500 mg) #	30,00 mL (1200 mg)

^dopo ricostituzione, la concentrazione della sospensione orale è 40 mg/mL e il volume totale di sospensione nel flacone è 22,5 ml (900 mg) o 30 ml (1200 mg)

+ Le dosi sono state arrotondate per ottenere una dose appropriata da somministrare.

++ Le dosi sono state arrotondate per ottenere una dose appropriata da somministrare.

*azitromicina 20 mg/mL (100 mg/5 mL) polvere per sospensione orale è la più appropriata da somministrare a questi pazienti.

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Pazienti adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che hanno difficoltà a deglutire

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causata da batteri chiamati streptococchi Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media) Infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)* Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)# Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (peridontite) o ascesso gengivale (ascesso peridontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni e la quantità di Zitromax da assumere ogni giorno per questi cicli di trattamento è descritta di seguito. *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 12,5 mL (500 mg) assunti una volta al giorno per 3 giorni. *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12,5 mL (500 mg) assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 6,25 mL (250 mg) assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni.

* solo per pazienti adulti

per i pazienti adulti il trattamento orale può seguire un trattamento endovenoso iniziale

Uso nei bambini e negli adolescenti

La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

Modo di somministrazione

Per uso orale dopo ricostituzione.

Zitromax deve essere assunto per via orale in un'unica dose giornaliera. La sospensione orale può essere assunta indipendentemente dai pasti. L'assunzione di questo medicinale appena prima di un pasto può contribuire a migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Se il flacone di Zitromax ricevuto dal medico o dal farmacista contiene solo polvere e nessun liquido, è necessario aggiungere un volume specifico di acqua al flacone prima di poterlo utilizzare. Se il medico

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).


Agenzia Italiana del Farmaco

o il farmacista hanno già provveduto a sciogliere la polvere, è possibile procedere direttamente al paragrafo "Istruzioni per l'assunzione di ciascuna dose giornaliera di Zitromax sospensione orale" di seguito riportato.

Istruzioni per la preparazione di Zitromax polvere per sospensione orale prima del primo utilizzo

Contenuto di ogni scatola di Zitromax:


- 1 flacone di Zitromax
- 1 adattatore a pressione per flacone
- 1 siringa dosatrice per somministrazione orale da 10 ml graduata in divisioni da 0,25 ml che eroga 10 mg di azitromicina per ogni graduazione



Punto 1. Agitare bene il flacone per smuovere la polvere prima di aggiungere acqua. Riempire un bicchiere con acqua e tenerlo accanto al flacone.




Punto 2. Separare l'adattatore a pressione per flacone dall'estremità della siringa dosatrice per somministrazione orale e conservarlo nella scatola.



Punto 3. Aprire il flacone premendo il tappo a prova di bambino e ruotando contemporaneamente in senso antiorario.


Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).




Punto 4. Aggiungere acqua al flacone utilizzando la siringa dosatrice per prelevarla dal bicchiere e aggiungerla al flacone. Il volume d'acqua necessario dipende dalla dimensione del flacone in dotazione.

- Flacone da 22,5 ml: aggiungere 12 ml (prelevare 10 ml + 2 ml) di acqua.
- Flacone da 30 ml: aggiungere 15 ml (prelevare 10 ml + 5 ml) di acqua.



Se si osservano bolle d'aria nella siringa dosatrice , spingere completamente lo stantuffo per riversare l'acqua nel bicchiere. Ripetere quindi il passaggio per prelevare l'acqua senza che si formino bolle d'aria. Quando si aggiunge l'acqua, il flacone deve essere tenuto inclinato in modo che la maggior parte della polvere non si depositi sul fondo.

Punto 5. Afferrare l'adattatore a pressione per flacone e spingerlo verso il basso nella bocca del flacone per fissarlo saldamente. Riavvitare il tappo sul flacone.



Punto 6. Agitare bene il flacone finché tutta la polvere non si sarà miscelata adeguatamente con l'acqua.



Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).


La sospensione orale è ora pronta per l'uso.
Conservare la siringa dosatrice nella scatola, in quanto sarà necessaria per assumere ogni dose giornaliera di Zitromax sospensione orale.

Istruzioni per l'assunzione della dose giornaliera di Zitromax sospensione orale

Punto 1. Agitare bene il flacone ogni volta prima di assumere una dose della sospensione orale.



Punto 2. Aprire il flacone e inserire la punta della siringa dosatrice nell'apertura dell'adattatore a pressione per flacone, dopo aver verificato che sia ancora saldamente inserito nella bocca del flacone.




Assicurarsi che lo stantuffo della siringa dosatrice sia spinto completamente verso il basso e che il flacone sia in posizione verticale su una superficie piana.

Punto 3. Capovolgere il flacone con la siringa dosatrice in posizione e tirare indietro lentamente lo stantuffo finché la parte superiore dello stantuffo non si trova in corrispondenza della tacca della siringa dosatrice corrispondente al volume (in ml) di Zitromax che il medico le ha prescritto di assumere.

Agenzia Italiana del Farmaco


Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).




La siringa dosatrice ha un volume totale di 10 ml e presenta tacche da 0,25 ml. A seconda del volume totale (in ml) di Zitromax sospensione orale che deve assumere, potrebbe essere necessario utilizzare la siringa dosatrice più di una volta per assumere l'intera dose.

Se si osservano bolle d'aria nella siringa dosatrice, spingere completamente lo stantuffo per riversare la sospensione orale nel flacone. Ripetere quindi questo passaggio per prelevare la sospensione orale senza che si formino bolle d'aria.

Punto 4. Rimuovere la siringa dosatrice dall'adattatore a pressione per flacone tirandola con cautela verso l'alto e ruotando il flacone in posizione verticale, quindi appoggiarlo su una superficie piana.



Punto 5. Somministrare la dose di Zitromax




Assicurarsi che il/la bambino/a sia in posizione eretta e inserire la punta della siringa per somministrazione orale nella sua bocca. Puntare la siringa dosatrice verso la parte interna della guancia e spingere lentamente verso il basso lo stantuffo della siringa dosatrice per erogare la sospensione nella bocca. Potrebbe essere necessario utilizzare la siringa dosatrice più di una volta per somministrare la quantità di sospensione orale prescritta al/alla bambino/a.

Punto 6. Chiudere il flacone e lavare la siringa dosatrice

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Riavvitare il tappo sul flacone, lasciando l'adattatore a pressione ancora inserito nella bocca del flacone.
Estrarre lo stantuffo dalla siringa dosatrice e lavare entrambi i componenti della siringa dosatrice con acqua. Asciugarli. Spingere nuovamente lo stantuffo nella siringa dosatrice. Conservare la siringa dosatrice nella scatola, in quanto sarà necessaria per assumere ogni dose giornaliera di Zitromax sospensione orale.
Ripetere questi passaggi per ogni giorno del ciclo di trattamento.

Se prende più Zitromax di quanto deve

Se prende più Zitromax di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contattare il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax

Se dimentica di prendere Zitromax, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax

Se interrompe il trattamento con Zitromax troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca* o *tachicardia da torsione di punta*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica*, frequenza non nota)
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa
- vomito, dolore allo stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia*)
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sensazione di sonnolenza (*sonnolenza*), alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della vista
- disturbo dell'orecchio
- sensazione di capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito)*
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale*) e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zitromax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale, dopo la ricostituzione, è stabile per 10 giorni a temperatura ambiente.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax
Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
100 g di polvere contengono 4,78 g di azitromicina (equivalenti a 5,01 g di azitromicina diidrato).

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Gli altri componenti sono: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di banana (contiene alcol benzilico), aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte), aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico) **saccarosio** (vedere paragrafo "Zitromax contiene saccarosio").

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione
La polvere per sospensione orale di Zitromax è disponibile in confezioni contenenti 1 flacone di polietilene contenente 900 mg o 1200 mg di azitromicina con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore. Una volta ricostituita la sospensione conterrà 200 mg/5 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax
3. Come prendere Zitromax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina. L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che bloccano la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg
- infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi
- infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)
- infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti
- infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)

Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che hanno difficoltà a deglutire:
Oltre alle infezioni sopra elencate, Zitromax può essere assunto anche per il trattamento delle infezioni seguenti:
- infezioni dell'uretra e della cervice uterina (collo dell'utero) causate dal batterio *Chlamydia trachomatis*
- infezioni batteriche dei genitali con piaghe dolorose (ulcera molle)

Adulti che hanno difficoltà di deglutizione:
- infezioni batteriche in pazienti adulti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax

Non prenda Zitromax
- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;
- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):

- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea prima di aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

<u>Superinfezione</u>

Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

<u>Infezioni trasmesse per via sessuale</u>

Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in tutti i casi di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti

Se il bambino ha meno di 6 mesi, consulti il medico o il farmacista, poiché l'efficacia e la sicurezza di questo medicinale non sono state dimostrate in questa fascia d'età.

<u>Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)</u>

Se il bambino ha meno di 6 mesi e il medico ha raccomandato un trattamento con azitromicina, interrompere la somministrazione di questo medicinale e contattare immediatamente il medico se si manifesta vomito a getto o diviene irritabile durante i pasti o subito dopo.

Altri medicinali e Zitromax

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);
- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:
  - chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
  - pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
  - citalopram (per il trattamento della depressione);
  - moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
  - cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
  - idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento

Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene saccarosio, glucosio, alcol benzilico e sodio

Questo medicinale contiene saccarosio e glucosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 0,35 microgrammi di alcol benzilico per 5 ml (200 mg) di sospensione orale, che in seguito alla preparazione della sospensione sono equivalenti a 0,07 microgrammi/ml di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio in 5 ml di sospensione orale, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche.

3. Come prendere Zitromax

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate e la durata del trattamento sono di seguito riportate.

Bambini di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale) Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)	Per questa infezione è previsto un ciclo di trattamento di 1 giorno, 3 giorni o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 1 giorni* dose singola da 30 mg/kg *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 10 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 10 mg/kg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 5 mg/kg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 20 mg/kg/die per 3 giorni *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12 mg/kg/die per 5 giorni

È importante assicurarsi di utilizzare la quantità di Zitromax indicata nella tabella sottostante in base al peso corporeo del paziente, all'infezione da trattare e al ciclo di trattamento specifico (1 giorno, 3 giorni, 5 giorni) che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno sospensione orale da 40 mg/mL in flacone dopo ricostituzione (37,5 ml) ^**				
	5 mg/kg+	**10 mg/kg**	**12 mg/kg++**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
7	1,00 mL (40 mg)*	1,75 mL (70 mg)*	2,25 mL (90 mg)	3,50 mL (140 mg)	5,25 mL (210 mg)
8	1,00 mL (40 mg)*	2,00 mL (80 mg)*	2,50 mL (100 mg)	4,00 mL (160 mg)	6,00 mL (240 mg)
9	1,25 mL (50 mg)*	2,25 mL (90 mg)	2,75 mL (110 mg)	4,50 mL (180 mg)	6,75 mL (270 mg)
10	1,25 mL (50 mg)*	2,50 mL (100 mg)	3,00 mL (120 mg)	5,00 mL (200 mg)	7,50 mL (300 mg)
11	1,50 mL (60 mg)*	2,75 mL (110 mg)	3,25 mL (130 mg)	5,50 mL (220 mg)	8,25 mL (330 mg)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

12	1,50 mL (60 mg)*	3,00 mL (120 mg)	3,75 mL (150 mg)	6,00 mL (240 mg)	9,00 mL (360 mg)
13	1,75 mL (70 mg)*	3,25 mL (130 mg)	4,00 mL (160 mg)	6,50 mL (260 mg)	9,75 mL (390 mg)
14	1,75 mL (70 mg)*	3,50 mL (140 mg)	4,25 mL (170 mg)	7,00 mL (280 mg)	10,50 mL (420 mg)
15	2,00 mL (80 mg)*	3,75 mL (150 mg)	4,50 mL (180 mg)	7,50 mL (300 mg)	11,25 mL (450 mg)
16-25	2,50 mL (100 mg)	5,00 mL (200 mg)	6,25 mL (250 mg)	10,00 mL (400 mg)	15,00 mL (600 mg)
26-35	3,75 mL (150 mg)	7,50 mL (300 mg)	8,75 mL (350 mg)	12,50 mL (500 mg) #	22,50 mL (900 mg)
36- < 45	5,00 mL (200 mg)	10,00 mL (400 mg)	11,25 mL (450 mg)	12,50 mL (500 mg) #	30,00 mL (1200 mg)

^dopo ricostituzione, la concentrazione della sospensione orale è 40 mg/mL e il volume totale di sospensione nel flacone è 37,5 ml (1500 mg)

+ Le dosi sono state arrotondate per ottenere una dose appropriata da somministrare.

++ Le dosi sono state arrotondate per ottenere una dose appropriata da somministrare.

*azitromicina 20 mg/mL (100 mg/5 mL) polvere per sospensione orale è la più appropriata da somministrare a questi pazienti.

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Pazienti adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che hanno difficoltà a deglutire

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media) Infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)* Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)# Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni e la quantità di Zitromax da assumere ogni giorno per questi cicli di trattamento è descritta di seguito. *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 12,5 mL (500 mg) assunti una volta al giorno per 3 giorni. *Ciclo di trattamento di 5 giorni* 12,5 mL (500 mg) assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 6,25 mL (250 mg) assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni.
Infezioni dell'uretra e della cervice uterina (collo dell'utero) causate dal batterio *Chlamydia trachomatis*	25 mL (1000 mg) assunti in dose singola
Infezioni batteriche dei genitali con piaghe dolorose (ulcera molle)	25 mL (1000 mg) assunti in dose singola

* solo per pazienti adulti

per i pazienti adulti il trattamento orale può seguire un trattamento endovenoso iniziale

Uso nei bambini e negli adolescenti

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

Modo di somministrazione


Per uso orale dopo ricostituzione.

Zitromax deve essere assunto per via orale in un'unica dose giornaliera. La sospensione orale può essere assunta indipendentemente dai pasti. L'assunzione di questo medicinale appena prima di un pasto può contribuire a migliorare la tollerabilità gastrointestinale.
Se il flacone di Zitromax ricevuto dal medico o dal farmacista contiene solo polvere e nessun liquido, è necessario aggiungere un volume specifico di acqua al flacone prima di poterlo utilizzare. Se il medico o il farmacista hanno già provveduto a sciogliere la polvere, è possibile procedere direttamente al paragrafo "Istruzioni per l'assunzione di ciascuna dose giornaliera di Zitromax sospensione orale" di seguito riportato.


Istruzioni per la preparazione di Zitromax polvere per sospensione orale prima del primo utilizzo

Contenuto di ogni scatola di Zitromax:

- 1 flacone di Zitromax
- 1 adattatore a pressione per flacone
- 1 siringa dosatrice per somministrazione orale da 10 ml graduata in divisioni da 0,25 ml che eroga 10 mg di azitromicina per ogni graduazione




Punto 1. Agitare bene il flacone per smuovere la polvere prima di aggiungere acqua. Riempire un bicchiere con acqua e tenerlo accanto al flacone.




Punto 2. Separare l'adattatore a pressione per flacone dall'estremità della siringa dosatrice per somministrazione orale e conservarlo nella scatola.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).




Punto 3. Aprire il flacone premendo il tappo a prova di bambino e ruotando contemporaneamente in senso antiorario.




Punto 4. Aggiungere acqua al flacone utilizzando la siringa dosatrice per prelevarla dal bicchiere e aggiungerla al flacone. Il volume d'acqua necessario dipende dalla dimensione del flacone in dotazione.

- Flacone da 37,5 ml: aggiungere 19 ml (prelevare 10 ml + 9 ml) di acqua.



Se si osservano bolle d'aria nella siringa dosatrice, spingere completamente lo stantuffo per riversare l'acqua nel bicchiere. Ripetere quindi il passaggio per prelevare l'acqua senza che si formino bolle d'aria. Quando si aggiunge l'acqua, il flacone deve essere tenuto inclinato in modo che la maggior parte della polvere non si depositi sul fondo.

Punto 5. Afferrare l'adattatore a pressione per flacone e spingerlo verso il basso nella bocca del flacone per fissarlo saldamente. Riavvitare il tappo sul flacone.



Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Punto 6. Agitare bene il flacone finché tutta la polvere non si sarà miscelata adeguatamente con l'acqua.




La sospensione orale è ora pronta per l'uso.
Conservare la siringa dosatrice nella scatola, in quanto sarà necessaria per assumere ogni dose giornaliera di Zitromax sospensione orale.

Istruzioni per l'assunzione della dose giornaliera di Zitromax sospensione orale

Punto 1. Agitare bene il flacone ogni volta prima di assumere una dose della sospensione orale.



Punto 2. Aprire il flacone e inserire la punta della siringa dosatrice nell'apertura dell'adattatore a pressione per flacone, dopo aver verificato che sia ancora saldamente inserito nella bocca del flacone.




Assicurarsi che lo stantuffo della siringa dosatrice sia spinto completamente verso il basso e che il flacone sia in posizione verticale su una superficie piana.

Punto 3. Capovolgere il flacone con la siringa dosatrice in posizione e tirare indietro lentamente lo stantuffo finché la parte superiore dello stantuffo non si trova in corrispondenza della tacca della

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).


siringa dosatrice corrispondente al volume (in ml) di Zitromax che il medico le ha prescritto di assumere.




La siringa dosatrice ha un volume totale di 10 ml e presenta tacche da 0,25 ml. A seconda del volume totale (in ml) di Zitromax sospensione orale che deve assumere, potrebbe essere necessario utilizzare la siringa dosatrice più di una volta per assumere l'intera dose.

Se si osservano bolle d'aria nella siringa dosatrice, spingere completamente lo stantuffo per riversare la sospensione orale nel flacone. Ripetere quindi questo passaggio per prelevare la sospensione orale senza che si formino bolle d'aria.

Punto 4. Rimuovere la siringa dosatrice dall'adattatore a pressione per flacone, tirandola con cautela verso l'alto e ruotando il flacone in posizione verticale, quindi appoggiarlo su una superficie piana.



Punto 5. Somministrare la dose di Zitromax




Assicurarsi che il/la bambino/a sia in posizione eretta e inserire la punta della siringa per somministrazione orale nella sua bocca. Puntare la siringa dosatrice verso la parte interna della guancia e spingere lentamente verso il basso lo stantuffo della siringa dosatrice per erogare la sospensione nella bocca. Potrebbe essere necessario utilizzare la siringa dosatrice più di una volta per somministrare la quantità di sospensione orale prescritta al/alla bambino/a.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Punto 6 Chiudere il flacone e lavare la siringa dosatrice



Riavvitare il tappo sul flacone, lasciando l'adattatore a pressione ancora inserito nella bocca del flacone.
Estrarre lo stantuffo dalla siringa dosatrice e lavare entrambi i componenti della siringa dosatrice con acqua. Asciugarli. Spingere nuovamente lo stantuffo nella siringa dosatrice. Conservare la siringa dosatrice nella scatola, in quanto sarà necessaria per assumere ogni dose giornaliera di Zitromax sospensione orale.
Ripetere questi passaggi per ogni giorno del ciclo di trattamento.

Se prende più Zitromax di quanto deve

Se prende più Zitromax di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contatti il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax

Se dimentica di prendere Zitromax, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax

Se interrompe il trattamento con Zitromax troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:
- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca* o *tachicardia da torsione di punta*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica*, frequenza non nota)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)
- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa
- vomito, dolore allo stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia*)
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sensazione di sonnolenza (*sonnolenza*), alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della vista
- disturbo dell'orecchio
- sensazione di capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito)*
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale*) e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zitromax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale, dopo la ricostituzione, è stabile per 10 giorni a temperatura ambiente.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax

Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
100 g di polvere contengono 4,78 g di azitromicina (equivalenti a 5,01 g di azitromicina diidrato).

Gli altri componenti sono: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di banana (contiene alcol benzilico), aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte), aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico), **saccarosio** (vedere paragrafo "Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale contiene saccarosio").

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione

La polvere per sospensione orale di Zitromax è disponibile in flacone di polietilene contenente 1500 mg di azitromicina con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore. Una volta ricostituita la sospensione conterrà 200 mg/5 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Scansionare il codice QR con un dispositivo mobile per consultare il foglio illustrativo aggiornato.

Le stesse informazioni sono disponibili anche al seguente URL:
https://pfizerpro.it/prodotti/zitromax/foglietto-illustrativo-qr-code

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 250 mg capsule rigide

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax
3. Come prendere Zitromax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina. L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che inibiscono la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:

<u>adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg</u>
- infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi
- infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)
- infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti
- infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)
- infezioni dell'uretra e della cervice causate dal batterio *Chlamydia trachomatis*
- infezioni batteriche dei genitali con piaghe dolorose (ulcera molle)

<u>Adulti di età pari o superiore a 18 anni</u>
- infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax

Non prenda Zitromax
- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;
- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere di questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):
- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea senza prima aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

<u>Superinfezione</u>
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

<u>Infezioni trasmesse per via sessuale</u>
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in ogni caso di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti

Se il suo peso è inferiore a 45 kg, esistono altri medicinali contenenti azitromicina che possono risultare più pratici da assumere.

Altri medicinali e Zitromax
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:
- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:
  - chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
  - pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
  - citalopram (per il trattamento della depressione);
  - moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
  - cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
  - idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, o per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza
Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento
Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene lattosio e sodio
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere Zitromax

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La quantità di Zitromax che deve assumere ogni giorno dipende dall'infezione batterica per cui è in cura, nonché dal ciclo terapeutico specifico che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Adulti e adolescenti di peso corporeo pari o superiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri streptococcici Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 o 5 giorni; di seguito viene descritta la quantità di Zitromax da assumere ogni giorno per questi cicli di trattamento. *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 500 mg assunti una volta al giorno per 3 giorni. *Ciclo di trattamento di 5 giorni*

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)* Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)# Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	500 mg assunti il primo giorno di trattamento, dopodiché 250 mg assunti una volta al giorno per i successivi 4 giorni.
Infezioni dell'uretra e della cervice causate dal batterio *Chlamydia trachomatis*	1000 mg assunti come dose singola
Infezioni batteriche dei genitali con piaghe dolorose (ulcera molle)	1000 mg assunti come dose singola
*solo per pazienti adulti # per i pazienti adulti il trattamento orale può seguire un trattamento endovenoso iniziale	

Uso nei bambini e negli adolescenti
Se il suo peso è inferiore a 45 kg o non riesce a deglutire questo medicinale, chieda consiglio al medico o al farmacista, in quanto sono disponibili altri medicinali contenenti azitromicina che possono essere più adatti a lei.

Modo di somministrazione

Per uso orale.
Zitromax deve essere assunto per via orale in un'unica dose giornaliera. Le capsule devono essere deglutite intere con dell'acqua. Le capsule devono essere assunte almeno un'ora prima o due ore dopo i pasti.

Se prende più Zitromax di quanto deve

Se prende più Zitromax di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contatti il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax

Se dimentica di prendere Zitromax, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax

Se interrompe il trattamento con Zitromax troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca o torsioni di punta, tachicardia*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica* (frequenza non nota))
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)
- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa
- vomito, dolore di stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia)*
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sonnolenza, alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della vista
- disturbo dell'orecchio
- capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito*)
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale)* e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zitromax

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax
Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
Ciascuna capsula rigida contiene 250 mg di azitromicina (equivalenti a 262,05 mg di azitromicina diidrato).

Gli altri componenti sono: **lattosio** anidro (vedere paragrafo "Zitromax contiene lattosio"), amido di mais, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.
Capsule rigide: gelatina, titanio diossido.

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione
Le capsule rigide di Zitromax sono disponibili in blister di PVC in confezione contenente 6 capsule.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 500 mg compresse rivestite con film

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

7. Cos'è Zitromax e a cosa serve
8. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax
9. Come prendere Zitromax
10. Possibili effetti indesiderati
11. Come conservare Zitromax
12. Contenuto della confezione e altre informazioni

6. Cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina. L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che inibiscono la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:
adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg

- infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri chiamati streptococchi
- infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite)
- infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media)
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti
- infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)
- infezioni dell'uretra e della cervice causate dal batterio *Chlamydia trachomatis*
- infezioni batteriche dei genitali con piaghe dolorose (ulcera molle)

Adulti:

- infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)

7. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax

Non prenda Zitromax

- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;
- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):
- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea prima di aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

Superinfezione
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

Infezioni trasmesse per via sessuale
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in ogni caso di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti
Se il suo peso è inferiore a 45 kg, esistono altri medicinali contenenti azitromicina che possono risultare più pratici da assumere.

Altri medicinali e Zitromax
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:
- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);
- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
- pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
- citalopram (per il trattamento della depressione);
- moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
- cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
- idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza
Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento
Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene lattosio e sodio
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

8. Come prendere Zitromax

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La quantità di Zitromax che deve assumere ogni giorno dipende dall'infezione batterica per cui è in cura, nonché dal ciclo terapeutico specifico che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Adulti e adolescenti di peso corporeo pari o superiore a 45 kg

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni delle tonsille (tonsillite) o della gola (faringite) causate da batteri streptococcici Infezioni batteriche dei seni paranasali (sinusite) Infezioni batteriche dell'orecchio medio (otite media) Infezioni batteriche in pazienti con infiammazione dei bronchi di lunga durata (bronchite cronica)*	Per queste infezioni è previsto un ciclo di trattamento di 3 giorni; di seguito viene descritta la quantità di Zitromax da assumere ogni giorno per questi cicli di trattamento. *Ciclo di trattamento di 3 giorni* 500 mg assunti una volta al giorno per 3 giorni.

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)[#] Infezioni batteriche della pelle e dei tessuti sottostanti Infezioni batteriche delle gengive (periodontite) o ascesso gengivale (ascesso periodontale)	
Infezioni dell'uretra e della cervice causate dal batterio *Chlamydia trachomatis*	1000 mg assunti come dose singola
Infezioni batteriche dei genitali con piaghe dolorose (ulcera molle)	1000 mg assunti come dose singola
*solo per pazienti adulti [#] per i pazienti adulti il trattamento orale può seguire un trattamento endovenoso iniziale	

Uso nei bambini e negli adolescenti
Se il suo peso è inferiore a 45 kg o non riesce a deglutire questo medicinale, chieda consiglio al medico o al farmacista, in quanto sono disponibili altri medicinali contenenti azitromicina che possono essere più adatti a lei.

Modo di somministrazione
Per uso orale.
Zitromax deve essere assunto per via orale in un'unica dose giornaliera. La linea d'incisione sulle compresse serve solo per agevolare la rottura della compressa in caso di difficoltà a deglutirla intera. Le due metà devono essere prese una subito dopo l'altra.

Le compresse possono essere assunte indipendentemente dai pasti. L'assunzione di questo medicinale appena prima di un pasto può contribuire a migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Se prende più Zitromax di quanto deve
Se prende più Zitromax di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contatti il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax
Se dimentica di prendere Zitromax, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax
Se interrompe il trattamento con Zitromax troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

9. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi
Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca o torsioni di punta, tachicardia*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica*, frequenza non nota).
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)
- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa
- vomito, dolore di stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia)*
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sonnolenza, alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della vista
- disturbo dell'orecchio
- capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito*)
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale)* e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

10. Come conservare Zitromax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax

Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
Ciascuna compressa rivestita con film contiene 500 mg di azitromicina (equivalenti a 524,1 mg di azitromicina diidrato).

Gli altri componenti sono: amido pregelatinizzato, calcio fosfato acido anidro, sodio carmellosa, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.
Film di rivestimento: titanio diossido, **lattosio** (vedere paragrafo "Zitromax 500 mg compresse rivestite con film contiene lattosio e sodio"), ipromellosa, triacetina.

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione

Le compresse di Zitromax sono disponibili in blister di PVC/Al in confezione contenente 3 compresse da 500 mg.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Scansionare il codice QR con un dispositivo mobile per consultare il foglio illustrativo aggiornato.

Le stesse informazioni sono disponibili anche al seguente URL:
https://pfizerpro.it/prodotti/zitromax/foglietto-illustrativo-qr-code

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax 500 mg polvere per soluzione per infusione

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Zitromax
3. Come usare Zitromax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Zitromax e a cosa serve

Zitromax contiene il principio attivo azitromicina. L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che inibiscono la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax è utilizzato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:
- infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)
- infezione batterica dell'utero, delle tube di Falloppio e delle ovaie (malattia infiammatoria pelvica), sempre in associazione con altri antibiotici (uno o più) scelti dal medico o dal farmacista.

2. Cosa deve sapere prima di usare Zitromax

Non usi Zitromax
- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Zitromax se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;
- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;
- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere usati in associazione a Zitromax.

Smetta di prendere questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea prima di aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

Superinfezione
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax (superinfezione).

Infezioni trasmesse per via sessuale
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in tutti i casi di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti

Se il bambino non ha compiuto 12 anni o se lei è un adolescente (di età compresa tra 12 e 18 anni non compiuti) non deve usare questo medicinale poiché efficacia e sicurezza non sono state studiate.

Altri medicinali e Zitromax

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'uso contemporaneo di Zitromax con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:
- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);
- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:
  - chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
  - pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
  - citalopram (per il trattamento della depressione);
  - moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
  - cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
  - idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di ricevere questo medicinale.

Gravidanza
Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento
Zitromax passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax contiene sodio

Questo medicinale contiene 114,0 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) in ogni flaconcino. Questo equivale al 5,7% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

3. Come usare Zitromax

Questo medicinale viene somministrato una volta al giorno. Verrà somministrato da un professionista sanitario tramite infusione in vena nell'arco di 3 ore o 1 ora. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

Nella tabella sottostante sono riportati i regimi di dosaggio raccomandati per i pazienti adulti.

Infezione	**Ciclo di trattamento**
Infezione polmonare (polmonite acquisita in comunità, non contratta in ospedale)	500 mg una volta al giorno per almeno 2 giorni, seguiti da una dose orale di 500 mg una volta al giorno per completare un ciclo di trattamento di 7-10 giorni.
Infezione batterica dell'utero, delle tube di Falloppio e delle ovaie (malattia infiammatoria pelvica) Zitromax deve essere utilizzato in associazione con un altro antibiotico scelto dal medico o dal farmacista.	500 mg una volta al giorno per 1 o 2 giorni, seguiti da una dose orale di 250 mg una volta al giorno per completare un ciclo di trattamento di 7 giorni

Modo di somministrazione

Zitromax le verrà somministrato da un operatore sanitario tramite infusione in vena successivamente alla dissoluzione della polvere e a un'ulteriore diluizione. Zitromax non deve essere somministrato tramite bolo endovenoso o iniezione intramuscolare.

L'infusione verrà somministrata in 3 ore a una concentrazione di 1 mg/ml oppure in 1 ora a una concentrazione di 2 mg/ml. L'infusione non deve durare meno di 60 minuti.

Se riceve più Zitromax di quanto deve

Il medico deciderà come curarla, compresa l'interruzione del trattamento e il monitoraggio per rilevare eventuali effetti negativi. Gli effetti indesiderati più comuni derivanti dalla somministrazione di una dose di Zitromax superiore a quella prescritta sono vomito, diarrea, cefalea e nausea.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca* o *tachicardia da torsione di punta*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica* (frequenza non nota), *epatite* (non comune: può interessare fino a 1 persona su 100))
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)
- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* o *necrolisi epidermica tossica*, frequenza non nota)
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

<u>Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)</u>
- diarrea
- fastidio addominale

<u>Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)</u>
- mal di testa
- vomito, dolore allo stomaco, sensazione di star male (*nausea*)
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)
- dolore in sede di iniezione
- infiammazione in sede di iniezione

<u>Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)</u>
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia*)
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- mancanza di appetito
- nervosismo, difficoltà nel dormire (*insonnia*)
- sensazione di capogiro, sonnolenza, alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- compromissione della visione
- disturbo dell'orecchio
- capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, aria intestinale, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- eruzione cutanea, prurito, orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (osteoartrite), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, stanchezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)
- complicazione post-procedurale

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- sensazione di iperattività
- alterazione nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- sordità, udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito)*
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- dolore articolare (*artralgia*)
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale*) e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zitromax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flaconcino dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax

Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
Ciascun flaconcino contiene 500 mg di azitromicina (equivalenti a 524,1 mg di azitromicina diidrato).

Gli altri componenti sono: acido citrico anidro, **sodio idrossido**.

Descrizione dell'aspetto di Zitromax e contenuto della confezione
La polvere è contenuta in un flaconcino di vetro monouso da 10 ml con chiusura costituita da stopper di gomma butilica e sigillo di alluminio.
Ogni confezione contiene 1 flaconcino.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Fareva Amboise
Zone Industrielle-29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Francia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli operatori sanitari:

Modalità di somministrazione
ZITROMAX polvere per soluzione per infusione dopo ricostituzione e diluizione deve essere somministrato per infusione endovenosa.
La concentrazione della soluzione e la durata dell'infusione devono essere pari a: 1 mg/ml in 3 ore oppure 2 mg/ml in 1 ora.

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

ZITROMAX polvere per soluzione per infusione non deve essere somministrato in bolo o per via intramuscolare.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PER SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA

Ricostituzione
La soluzione iniziale deve essere preparata aggiungendo 4,8 ml di acqua per preparazioni iniettabili al flaconcino contenente la polvere. Agitare il flaconcino fino a completa dissoluzione della polvere. Si raccomanda di usare una siringa standard da 5 ml per prelevare il volume esatto di 4,8 ml di acqua sterile per iniezioni. 1 ml di soluzione ricostituita contiene 100 mg di azitromicina.
I farmaci da somministrare per via parenterale devono essere controllati attentamente per escludere la presenza di particolato nella soluzione. Nel caso in cui siano evidenti particelle in sospensione, la soluzione deve essere eliminata.
La soluzione ricostituita deve essere diluita prima della somministrazione seguendo le istruzioni indicate di seguito.

Diluizione
Per ottenere una concentrazione di azitromicina pari a 1,0-2,0 mg/ml, prelevare dal flaconcino 5 ml della soluzione ricostituita (concentrazione 100 mg/ml), aggiungendoli al volume appropriato di una delle seguenti soluzioni per infusione:
Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %)
Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,45 %)
Ringer Lattato
Glucosio 5 % in acqua
Glucosio 5 % in soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,45 %) con 20 mEq KCl
Glucosio 5 % in soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,45 %)
Glucosio 5 % in soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,30 %)
Glucosio 5 % in Ringer Lattato

Concentrazione finale della soluzione per infusione	Volume del solvente
1,0 mg/ml	500 ml
2,0 mg/ml	250 ml

La somministrazione endovenosa di una dose di 500 mg di azitromicina, diluita secondo le istruzioni, deve essere effettuata in un periodo di tempo non inferiore a 60 minuti.

Modalità di conservazione
La soluzione ricostituita è chimicamente e fisicamente stabile per 24 ore se conservata a temperature non superiori ai 30°C. Una volta diluita secondo le istruzioni, la soluzione è stabile dal punto di vista chimico e fisico per 24 ore a temperature uguali o inferiori a 30°C o per 7 giorni se conservata in frigorifero (5°C). Tuttavia, dal punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se la soluzione non viene usata immediatamente, è compito di chi ne fa uso di verificare i tempi e le condizioni di conservazione. Comunque si consiglia di non superare le 24 ore a temperature comprese tra 2 e 8°C, ad eccezione del caso in cui la ricostituzione/diluizione sia avvenuta in condizioni asettiche validate e controllate.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zitromax Avium 600 mg compresse rivestite con film

azitromicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Zitromax Avium e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax Avium
3. Come prendere Zitromax Avium
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zitromax Avium
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Zitromax Avium e a cosa serve

Zitromax Avium contiene il principio attivo azitromicina. L'azitromicina è un antibiotico che appartiene al gruppo di antibiotici chiamati "macrolidi", che inibiscono la crescita dei batteri sensibili.

Zitromax Avium è assunto per il trattamento delle seguenti infezioni:

Adulti (età pari o superiore ai 18 anni)

- infezioni causate dai micobatteri del *Mycobacterium avium* complex (MAC) nelle persone con infezione da HIV in stadio avanzato. Zitromax Avium deve essere usato in associazione con un altro antibiotico chiamato etambutolo.

Zitromax Avium è usato anche per la prevenzione delle infezioni causate dai batteri del *Mycobacterium avium* complex (MAC) nelle persone affette da infezione da HIV.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zitromax Avium

Non prenda Zitromax Avium

- se è allergico all'azitromicina, all'eritromicina, ad altri antibiotici chiamati "macrolidi" o "ketolidi" o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zitromax Avium se soffre o ha sofferto di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- problemi cardiaci (ad esempio problemi con il ritmo cardiaco o insufficienza cardiaca) o bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue: queste condizioni possono contribuire a gravi effetti indesiderati cardiaci provocati dall'azitromicina;
- problemi al fegato: il medico può dover monitorare la funzionalità epatica o interrompere il trattamento;
- diarrea grave dopo la somministrazione di altri antibiotici;

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- debolezza muscolare localizzata (miastenia gravis), in quanto i sintomi di questa malattia possono peggiorare durante il trattamento;
- se sta assumendo derivati dell'ergot come ad esempio l'ergotamina (utilizzata per trattare l'emicrania), in quanto questi medicinali non devono essere assunti in associazione a Zitromax Avium.

Smetta di prendere di questo medicinale e contatti immediatamente il medico (vedere anche "Effetti indesiderati gravi" nel paragrafo 4):
- se sospetta di avere una reazione allergica (ad esempio difficoltà respiratorie, tumefazione del viso o della gola, eruzione cutanea, vesciche);
- se nota uno qualsiasi dei sintomi descritti nel paragrafo 4 correlati a reazioni cutanee gravi, tra cui sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), segnalate in associazione al trattamento con azitromicina;
- se avverte un battito cardiaco anomalo o palpitazioni, capogiro o mancamento durante l'assunzione di Zitromax Avium;
- se manifesta segni di problemi al fegato (ad esempio urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi);
- se manifesta diarrea grave durante o dopo il trattamento. Non assuma alcun medicinale per curare la diarrea senza prima aver consultato il medico. Se la diarrea persiste o ricompare entro le prime settimane di trattamento, informi il medico.

Superinfezione
Il medico può tenere sotto controllo i sintomi di ulteriori infezioni batteriche o micotiche che non possono essere trattate con Zitromax Avium (superinfezione).

Infezioni trasmesse per via sessuale
Il medico può effettuare un test per escludere una potenziale sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmessa che altrimenti può progredire inosservata ed essere diagnosticata in ritardo. Inoltre, in ogni caso di infezioni batteriche trasmesse per via sessuale, il medico eseguirà esami di laboratorio di follow-up per monitorare il successo della terapia.

Bambini e adolescenti
Questo medicinale non è raccomandato se:
- ha meno di 18 anni e presenta un'infezione da microrganismi del *Mycobacterium avium* complex, che di solito colpisce le persone affette da HIV che hanno difese immunitarie basse, in quanto efficacia e sicurezza non sono state studiate in questi casi.

Se il suo peso è inferiore a 45 kg, esistono altri medicinali contenenti azitromicina che possono risultarle più pratici da assumere.

Altri medicinali e Zitromax Avium
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione contemporanea di Zitromax Avium con altri medicinali può provocare effetti indesiderati. Pertanto, è particolarmente importante che informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:
- atorvastatina e altri medicinali del gruppo delle statine (per abbassare il colesterolo nel sangue e prevenire le malattie cardiache, tra cui infarti e ictus);
- ciclosporina (per prevenire il rigetto da parte dell'organismo degli organi trapiantati);
- colchicina (per il trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare);
- dabigatran (per prevenire e trattare la formazione di coaguli di sangue (anticoagulante))
- digossina (per il trattamento di malattie cardiache);
- warfarin o medicinali simili usati per fluidificare il sangue (anticoagulanti);
- medicinali che possono far sì che il muscolo cardiaco impieghi più tempo del solito a contrarsi e rilassarsi (prolungamento dell'intervallo QT), come ad esempio i seguenti:

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- chinidina, procainamide, dofetilide, amiodarone e sotalolo (per il trattamento di un battito cardiaco irregolare, compresi i casi di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento - aritmia cardiaca);
- pimozide (per il trattamento delle malattie mentali);
- citalopram (per il trattamento della depressione);
- moxifloxacina e levofloxacina (antibiotici);
- cisapride (per il trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale);
- idrossiclorochina o clorochina (per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide, per trattare o prevenire la malaria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza
Il medico deciderà se può assumere questo medicinale durante la gravidanza, dopo essersi accertato che i benefici siano superiori ai potenziali rischi.

Allattamento
Zitromax Avium passa nel latte materno. Pertanto il medico deciderà se interrompere l'allattamento o evitare il trattamento con Zitromax Avium, tenendo conto sia del beneficio dell'allattamento per il bambino sia del beneficio della terapia per lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zitromax Avium altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato segnalato che Zitromax Avium provoca capogiro, sonnolenza e crisi convulsive, nonché problemi di vista e udito in alcune persone. Questi possibili effetti indesiderati possono alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Zitromax Avium contiene lattosio e sodio
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere Zitromax Avium

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La quantità di Zitromax Avium che deve assumere ogni giorno dipende dall'infezione batterica per cui è in cura, nonché dal ciclo terapeutico specifico che il medico o il farmacista le ha indicato di seguire.

Adulti

Infezione	Ciclo di trattamento con azitromicina
Infezioni causate dai micobatteri del gruppo *Mycobacterium avium* complex (MAC) nelle persone con infezione da HIV in stadio avanzato. Zitromax Avium deve essere usato in associazione con un altro farmaco chiamato etambutolo.*	600 mg una volta al giorno
Prevenzione delle infezioni causate dai micobatteri del gruppo *Mycobacterium avium* complex (MAC) nelle persone affette da infezione da HIV*	1200 mg una volta alla settimana

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

*solo per pazienti adulti

Se il suo peso è inferiore a 45 kg o non riesce a deglutire questo medicinale, chieda consiglio al medico o al farmacista, in quanto sono disponibili anche altri medicinali contenenti azitromicina che possono essere più adatti a lei.

Modo di somministrazione

Per uso orale.
Zitromax Avium deve essere assunto per via orale in un'unica dose giornaliera. La linea d'incisione sulle compresse serve solo per agevolare la rottura della compressa in caso di difficoltà a deglutirla intera. Le due metà devono essere prese una subito dopo l'altra.

Le compresse possono essere assunte indipendentemente dai pasti. L'assunzione di questo medicinale appena prima di un pasto può contribuire a migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Se prende più Zitromax Avium di quanto deve

Se prende più Zitromax Avium di quanto deve, può non sentirsi bene. I tipici segni di sovradosaggio sono vomito, diarrea, dolori addominali e nausea. Informi immediatamente il medico o contatti il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere Zitromax Avium

Se dimentica di prendere Zitromax Avium, lo prenda il prima possibile, purché ciò avvenga almeno 12 ore prima della dose successiva. Se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zitromax Avium

Se interrompe il trattamento con Zitromax Avium troppo presto, l'infezione può ripresentarsi. Prenda Zitromax Avium per tutta la durata del trattamento, anche quando inizia a sentirsi meglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Smetta di usare Zitromax Avium e consulti immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sibilo respiratorio improvviso, difficoltà respiratorie, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito che interessano prevalentemente tutto il corpo (*reazione anafilattica*, frequenza non nota)
- battito cardiaco accelerato o irregolare (*aritmia cardiaca o torsioni di punta, tachicardia*, frequenza non nota)
- urine scure, perdita di appetito o ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, segni di disturbi al fegato (*insufficienza epatica* o *necrosi epatica* (frequenza non nota), *epatite* (non comune: può interessare fino a 1 persona su 100))
- diarrea grave con crampi addominali, feci con tracce di sangue e/o febbre possono significare la presenza di un'infezione dell'intestino crasso (*colite da antibiotici*, frequenza non nota). Non assuma medicinali contro la diarrea che inibiscono i movimenti intestinali (*antiperistaltici*)
- macchie rossastre sul tronco non in rilievo, a forma di bersaglio o circolari, spesso con vescicole centrali, esfoliazione della cute, ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e degli occhi. Queste gravi eruzioni cutanee possono essere precedute da febbre e sintomi

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

simil-influenzali (*sindrome di Stevens-Johnson* (non comune: può interessare fino a 1 persona su 100) o *necrolisi epidermica tossica* (frequenza non nota))
- eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (*sindrome DRESS* o *sindrome da ipersensibilità a farmaco*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000))
- eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con protuberanze sottocutanee e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi solitamente compaiono all'inizio del trattamento (*pustolosi esantematica acuta generalizzata*, raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)).

Altri effetti indesiderati

Molto comune (possono interessare più di 1 persona su 10)
- diarrea
- fastidio addominale, dolore di stomaco, sensazione di star male (*nausea*), aria intestinale

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- mal di testa, sensazione di capogiro, alterazione del senso del gusto (*disgeusia*), sensazione di intorpidimento (*parestesia*)
- vomito, mancanza di appetito
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue (*conta linfocitaria diminuita, conta eosinofila aumentata, conta basofila aumentata, conta dei monociti aumentata, conta dei neutrofili aumentata, bicarbonato ematico diminuito*)
- compromissione della vista
- sordità
- eruzione cutanea, prurito
- dolore articolare (*artralgia*)
- stanchezza

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100)
- candidosi (*candidiasi*), un'infezione micotica della bocca e della vagina, altre infezioni micotiche
- infezione polmonare, infezione batterica della gola, infiammazione del tratto gastrointestinale, patologia respiratoria, infiammazione della mucosa all'interno del naso, infezione vaginale
- alterazioni nel numero dei globuli bianchi (*leucopenia, neutropenia, eosinofilia)*
- conta delle piastrine aumentata
- riduzione della percentuale di tutte le cellule del sangue nel volume ematico totale (*ematocrito ridotto*)
- reazioni allergiche, gonfiore delle mani, dei piedi e del viso (*angioedema*)
- nervosismo, difficoltà a dormire (*insonnia*)
- sensazione di sonnolenza (*sonnolenza*)
- ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura (*ipoestesia*)
- disturbo dell'orecchio
- udito ridotto o fischi nelle orecchie (*tinnito*)
- capogiro (*vertigine*)
- percezione del battito cardiaco (*palpitazioni*)
- vampata di calore
- respiro sibilante improvviso, sanguinamento dal naso
- stipsi, digestione compromessa (*dispepsia*), infiammazione della mucosa dello stomaco (*gastrite*), difficoltà nella deglutizione (*disfagia*), pancia gonfia, bocca secca, eruttazione, ulcerazione della bocca, salivazione aumentata
- orticaria, dermatite, cute secca, sudorazione anomala eccessiva (*iperidrosi*)
- gonfiore e dolore alle articolazioni (*osteoartrite*), dolore muscolare, dolore dorsale, dolore al collo
- minzione dolorosa (*disuria*), dolore renale
- flusso mestruale a intervalli irregolari (*metrorragia*), disturbo testicolare
- tumefazione dovuta a ritenzione di liquidi, in particolare del viso, delle caviglie e dei piedi (*edema, edema della faccia, edema periferico*)
- debolezza, sensazione generale di malessere, febbre
- dolore toracico, dolore
- risultati delle analisi di laboratorio anormali (ad esempio esami del sangue o del fegato)

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- complicazione post-procedurale

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
- sensazione di irritazione
- problemi al fegato, ingiallimento della pelle o degli occhi
- maggiore sensibilità alla luce solare[#]

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- riduzione del numero di globuli rossi a causa di un aumento della degradazione cellulare che può causare stanchezza e cute pallida (*anemia emolitica*)
- riduzione del numero di piastrine che può portare a sanguinamento e lividi (*trombocitopenia*)
- sentirsi arrabbiati, aggressivi, sentirsi spaventati e preoccupati (*ansia*), stato confusionale acuto (*delirium*)
- allucinazione
- mancamento (*sincope*)
- convulsioni (*crisi convulsive*)
- sensazione di iperattività
- cambiamento nel senso dell'olfatto (*anosmia, parosmia*)
- perdita totale del senso del gusto (*ageusia*)
- debolezza muscolare (*miastenia gravis*)
- tracciato elettrocardiografico (ECG) anomalo (*prolungamento dell'intervallo QT*)
- pressione arteriosa bassa
- infiammazione del pancreas che provoca forti dolori addominali e alla schiena (*pancreatite*)
- cambiamento del colore della lingua
- infiammazione dei reni (*nefrite interstiziale)* e insufficienza della funzione renale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5 Come conservare Zitromax Avium

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zitromax Avium

- Il principio attivo è azitromicina (come azitromicina diidrato).
  Ciascuna compressa rivestita con film contiene 600 mg di azitromicina (equivalenti a 628,9 mg di azitromicina diidrato).

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- Gli altri componenti sono: amido pregelatinizzato, calcio fosfato acido anidro, sodio carmellosa, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.
  Film di rivestimento: titanio diossido, **lattosio** (vedere paragrafo "Zitromax Avium contiene lattosio e sodio"), ipromellosa, triacetina.

Descrizione dell'aspetto di Zitromax Avium e contenuto della confezione
Le compresse di Zitromax Avium sono compresse rivestite con film ovali, incise, di colore da bianco a biancastro, con inciso "ZTM 600" su un lato e "Pfizer" sull'altro lato.
Le compresse di Zitromax Avium sono disponibili in blister di PVC/Al in confezione contenente 8 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore
Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156, Km 47,600 – Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).