

# Formelsammlung Statistik

Lukas Warode

## Maße der zentralen Tendenz

### Modus

- Nominales Skalenniveau
- Häufigster Wert

$$x_{mod}$$

### Median

- Ordinales Skalenniveau
- Mittlere Ausprägung bei Anordnung der Variable

Ungerade Anzahl an Fällen (n):

$$\tilde{x} = x_{(\frac{n+1}{2})}$$

```
set.seed(42)
```

```
random_sample <- sample(1:42, 11)
```

```
sort(random_sample)
```

```
## [1] 1 7 10 18 20 24 25 26 36 37 40
```

```
median(random_sample)
```

```
## [1] 24
```

Gerade Anzahl an Fällen (n):

$$\tilde{x} = \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}$$

```
random_sample <- random_sample[random_sample != max(random_sample)]
```

```
sort(random_sample)
```

```
## [1] 1 7 10 18 20 24 25 26 36 37
```

```
median(random_sample)
```

```
## [1] 22
```

## Arithmetisches Mittel

- Metrisches Skalenniveau
- Summe aller Fälle durch Anzahl der Fälle teilen

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

```
random_sample
```

```
## [1] 37 1 25 10 36 18 24 7 20 26
```


```
mean(random_sample)
```

```
## [1] 20.4
```

## Verteilungsformen


### Symmetrisch (Normalverteilung)

$$x_{mod} = \tilde{x} = \bar{x}$$




## Linkssteil / Rechtsschief

$$x_{mod} < \tilde{x} < \bar{x}$$



## Rechtssteil / Linksschief

$$x_{mod} > \tilde{x} > \bar{x}$$



## Streuungsmaße

### Spannweite

- Ordinales Skalenniveau
- Differenz zwischen größter und kleinster Ausprägung

$$R = x_{max} - x_{min}$$

## Interquartilsabstand (IQR)

- Ordinales Skalenniveau
- Intervall der mittleren 50% der Stichprobe

$$IQR = Q_{0.75} - Q_{0.25}$$

## Variation (Summe der Abweichungsquadrate)

- Metrisches Skalenniveau
- Englisch: *Sum of squares / sum of squared deviations*

$$SS_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

## Varianz

- Metrisches Skalenniveau
- Standardisierte Variation

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

## Standardabweichung

- Metrisches Skalenniveau
- Quadratwurzel der Varianz
- Durchschnittliche Abweichung von Werten zum Arithmetischen Mittel

$$\sigma_{x_{Population}} = \sqrt{\sigma_x^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$
$$s_{x_{Stichprobe}} = \sqrt{s_x^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

## Variationskoeffizient (Abweichungskoeffizient)

- Metrisches Skalenniveau
- Relatives Streuungsmaß, d.h. nicht abhängig von der Maßeinheit der Variable
- Standardabweichung in Relation zum Arithmetischen Mittel

$$V_x = \frac{s_x}{\bar{x}}$$

## Standardfehler

- (Durchschnittliche) Abweichung von Stichprobenkennwerten zu Populationskennwerten, z.B. vom Mittelwert

### Standardfehler des Arithmetischen Mittelwertes (*Standard error of the mean*)

- Symbol des Populationsmittelwertes:  $\mu$
- Symbol des Stichprobenmittelwertes  $\bar{x}$

$$\begin{aligned}\sigma_{\bar{x}_{Population}} &= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \\ s_{\bar{x}_{Stichprobe}} &= \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{s^2}{n}} \\ \hat{\sigma}_{\bar{x}_{Population, geschätzt}} &= \frac{s}{\sqrt{n-1}} = \sqrt{\frac{s^2}{n-1}}\end{aligned}$$

### Standardfehler des Anteilwertes

- Symbol des Populationsanteilwertes:  $\pi$
- Symbol des Stichprobenanteilwertes:  $p_x$

$$\sigma(p_x)_{Population} = \sqrt{\frac{\pi_x \cdot (1 - \pi_x)}{n}}$$

Schätzung der Populationsvarianz:  $\pi_x \cdot (1 - \pi_x)$  aus der Stichprobenvarianz:  $p_x \cdot (1 - p_x)$

$$\hat{\sigma}(p_x)_{Population} = \sqrt{\frac{p_x \cdot (1 - p_x)}{n}}$$

## Konfidenzintervall

- Generalisierbarkeit von Parametern aus der Stichprobe (auf die Population)
- Geschätzter Intervallbereich, in dem Parameter der Grundgesamtheit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegen
- Z-Standardisierung:  $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

### Konfidenzintervall des Populationsmittelwertes ( $\mu_x$ )

- Kleine Stichproben: t-Verteilung
- Große Stichproben: Standardnormalverteilung

Bestimmung der Intervallgrenzen:  $\bar{x} - \frac{s_x}{\sqrt{n-1}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \mu_x < \bar{x} + \frac{s_x}{\sqrt{n-1}}$