

# Chapter 4

## Higher Order Differential Equations

### 4.1 Method of Undetermined Coefficients

Table 4.1: Particular Solutions for Undetermined Coefficients

$g(x)$	Form of $y_p$
1. 1 (any constant)	$A$
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\sin 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
7. $e^{5x}$	$Ae^{5x}$
8. $(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
9. $x^2e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
10. $e^{3x} \sin 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \sin 4x$
11. $5x^2 \sin 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \sin 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)e^{3x} \sin 4x$

# Chapter 6

## Series Solutions of Linear Equations

### 6.1 Solving Linear DE's without constant coefficients

Table 6.1: Maclaurin Series Representations

Maclaurin Series		Interval of Convergence
$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$	(6.1)	$(-\infty, \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$	(6.2)	$(-\infty, \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$	(6.3)	$(-\infty, \infty)$
$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$	(6.4)	$[-1, 1]$
$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$	(6.5)	$(-\infty, \infty)$
$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$	(6.6)	$(-\infty, \infty)$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$	(6.7)	$(-1, 1]$
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$	(6.8)	$(-1, 1)$

# Chapter 7

## Method of Laplace Transforms for Solving DE's

### 7.1 Definition of Laplace Transform

Table 7.1: Transforms of Some Basic Functions

$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$	(7.1)
$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$	(7.2)
$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$	(7.3)
$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$	(7.4)
$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$	(7.5)
$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$	(7.6)
$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$	(7.7)

### 7.2 Solving I.V.T by using Laplace Transform