

作业2

(数值算法与案例分析)

李维杰

2024 年 9 月 22 日

题目1. 针对复矩阵的高斯消元/LU分解,其执行过程中加减/乘法运算的操作次数是否相等?

解答. 设对于同一大小的实矩阵进行高斯消元/LU分解时,执行过程中加减和乘法运算的次数分别为 p_1, p_2 .另设 $z_1 = a_1 + b_1i, z_2 = a_2 + b_2i$,则复数加减操作为

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2)i.$$

即复数加减操作的运算次数 $q_1 = 2p_1$.

复数的乘法操作为

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i.$$

即复数乘法操作的运算次数 $q_2 = 2p_1 + 4p_2$.

又已知 $p_1 = p_2$,故 $q_2 = 3q_1$,即复矩阵在高斯消元/LU分解的过程中,执行加减/乘法运算的操作次数不相等.

题目2. 用两种算法求对称正定阵 A 的Cholesky分解.(即求下三角阵 L ,满足 $A = LL^T$)

解答.

算法1

设

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}.$$

则由 $A = LL^T$,得

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik}l_{jk}, \quad 1 \leq j \leq i \leq n. \quad (1)$$

对于第1列,由式(1)在 $j = 1$ 时的特例 $a_{i1} = l_{i1}l_{11}$,即得

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{l_{11}}.$$

特别地,有

$$a_{11} = (l_{11})^2 \Rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}},$$

从而可以计算得 L 阵的第1列元素.

对于第 j 列,由式(1)可得

$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}.$$

特别地,有

$$a_{jj} = \sum_{k=1}^j (l_{jk})^2 \Rightarrow l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} (l_{jk})^2},$$

从而可以递推计算得 L 阵所有元素.

算法2

设 L_0 为单位下三角阵,设 D 是对角元均为正数的对角阵,令 $A = L_0DL_0^T$,得

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}d_kl_{jk} + l_{ij}d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n. \quad (2)$$

对于第1列,由式(2)在 $j = 1$ 时的特例 $a_{i1} = l_{i1}d_1$,即得

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{d_1}.$$

对于第 j 列,由(2)式可得

$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}d_kl_{jk}}{d_j}.$$

特别地,当 $i = j$ 时,有 $l_{ij} = 1$,则

$$d_j = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}d_kl_{jk}.$$

从而通过递推计算得 L_0 阵和 D 阵的所有元素,进而得到

$$L = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ l_{21} & d_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & d_n \end{bmatrix}.$$

题目3. 证明: 严格对角占优的矩阵 A 在高斯消元过程中得到的子矩阵依然严格对角占优.

解答. 设

$$P = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & & & \\ -\frac{a_{31}}{a_{11}} & 0 & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{11}} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

设一步高斯消元后得到的矩阵为 $B = PA$,则

$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}.$$


于是

$$\begin{aligned}
 \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |b_{ij}| &= \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \left| a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}} \right| \\
 &\leq \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{ij}| + \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \left| \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}} \right| \\
 &= \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{ij}| + \left| \frac{a_{i1}}{a_{11}} \right| \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{1j}| \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{ij}| - |a_{i1}| + \left| \frac{a_{i1}}{a_{11}} \right| \sum_{2 \leq j \leq n} |a_{1j}| - \left| \frac{a_{i1}a_{1i}}{a_{11}} \right| \\
 &< |a_{ii}| - |a_{i1}| + |a_{i1}| - \left| \frac{a_{i1}a_{1i}}{a_{11}} \right| \\
 &< \left| a_{ii} - \frac{a_{i1}a_{1i}}{a_{11}} \right| \\
 &= |b_{ii}|.
 \end{aligned}$$

从而矩阵 B 严格对角占优.

题目4. 比较全主元三角分解和列主元三角分解的效率.

解答. 全主元三角分解(红线)和列主元三角分解(蓝线)在不同大小的系数矩阵下的运行效率关系图如下



题目5. 证明: 存在误差矩阵 E ,使得 $(A + E)x = fl(Ax)$.并确定 E 中元素的上界.

解答. 设 $b = Ax = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$,则

$$b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

设

$$S_{ik} = fl\left(\sum_{j=1}^k a_{ij}x_j\right),$$

则

$$\begin{aligned} S_{i1} &= a_{i1}x_1(1 + \gamma_{i1}), |\gamma_{i1}| \leq \mathbf{u}. \\ S_{ik} &= fl[S_{i(k-1)} + fl(a_{ik}x_k)] \\ &= [S_{i(k-1)} + a_{ik}x_k(1 + \gamma_{ik})](1 + \delta_{ik}), |\gamma_{ik}|, |\delta_{ik}| \leq \mathbf{u}. \end{aligned}$$

故

$$fl(b_i) = S_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(1 + \gamma_{ij}) \prod_{k=j}^n 1 + \delta_{ik}.$$

令 $1 + \varepsilon_{ij} = (1 + \gamma_{ij}) \prod_{k=j}^n (1 + \delta_{ik})$,则

$$fl(b_i) = \sum_{j=1}^n (1 + \varepsilon_{ij})a_{ij}x_j = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + \varepsilon_{ij}a_{ij})x_j.$$

其中

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ij} &= (1 + \gamma_{ij}) \prod_{k=j}^n (1 + \delta_{ik}) - 1 \\ &\leq (1 + \mathbf{u})(1 + \mathbf{u})^{n-j+1} - 1 \\ &\leq (1 + \mathbf{u})e^{(n-j+1)\mathbf{u}} - 1 \\ &\leq (1 + \mathbf{u})[1 + 1.01(n - j + 1)\mathbf{u}] - 1 \\ &= 1.01(n - j + 2)\mathbf{u} + o(\mathbf{u}^2). \end{aligned}$$

则对于误差矩阵 $E = (e_{ij}), i, j = 1, 2, \dots, n$,有

$$|e_{ij}| = |\varepsilon_{ij}a_{ij}| \leq 1.01(n - j + 2) |a_{ij}| \mathbf{u}.$$

其中 \mathbf{u} 是机器精度.