

作业12

(数值算法与案例分析)

李维杰

2024 年 12 月 7 日

题目1. 实现GMRES算法,并用至少两个包含1000+个未知数的稀疏线性方程组(对称的和非对称的)测试,绘制残差的变化历程.

解答. (代码见Problem1.m)




图 1: GMRES算法分别作用于包含1000个未知数的两种类型线性方程组的表现

题目2. 给定对称正定阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 设 r_k 是SD算法解 $Ax = b$ 时的第 k 步迭代时的残差向量. 证明: 当 $r_{k+1} = 0$ 时, r_k 是 A 的一个特征向量.

解答. 根据SD法的迭代步骤, 有 $x_{k+1} = x_k + \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k} r_k$. 则当 $r_{k+1} = 0$ 时, 我们有

$$Ax_k + A \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k} r_k - b = 0,$$

即

$$r_k = A \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k} r_k \Rightarrow Ar_k = \frac{r_k^T A r_k}{r_k^T r_k} r_k.$$

题目3. 给定对称正定阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 设 x_k 是SD算法解 $Ax = b$ 时的第 k 步迭代时的近似答案. 证明:

$$f(x_{k+1}) \leq (1 - \kappa^{-1})f(x_k),$$

其中 $f(x) = x^T A x - 2b^T x$ 并且 $\kappa = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2$.

解答. 由于

$$\begin{aligned} f(x_k) - f(x_{k+1}) &= \langle x_k, x_k \rangle_A - 2 \langle b, x_k \rangle - \langle x_k + \alpha_k r_k, x_k + \alpha_k r_k \rangle_A + 2 \langle b, x_k + \alpha_k r_k \rangle \\ &= -2\alpha_k \langle x_k, r_k \rangle_A + 2\alpha_k \langle b, r_k \rangle - \alpha_k^2 \langle r_k, r_k \rangle_A \\ &= \frac{(r_k^T r_k)^2}{r_k^T A r_k}, \end{aligned}$$

又由于 A^{-1} 也是对称正定的, 故

$$\begin{aligned} f(x_k) &= \langle x_k, x_k \rangle_A - 2 \langle b, x_k \rangle \\ &= \langle A^{-1}(b - r_k), A^{-1}(b - r_k) \rangle_A - 2 \langle b, A^{-1}(b - r_k) \rangle \\ &= r_k^T A^{-1} r_k - b^T A^{-1} b \\ &\leq r_k^T A^{-1} r_k. \end{aligned}$$

则证明 $f(x_{k+1}) \leq (1 - \kappa^{-1})f(x_k)$, 等价于 $\kappa \geq \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k+1})}$, 即只需证

$$\frac{r_k^T A^{-1} r_k}{r_k^T r_k} \frac{r_k^T A r_k}{r_k^T r_k} \leq \kappa = \left(\frac{\lambda_n(A^2)}{\lambda_1(A^2)} \right)^{1/2}.$$

事实上由Rayleigh-Ritz定理, 我们有

$$\begin{aligned} \max \frac{r_k^T A^{-1} r_k}{r_k^T r_k} &= \lambda_n(A^{-1}) = \frac{1}{\lambda_1(A)} \\ \max \frac{r_k^T A r_k}{r_k^T r_k} &= \lambda_1(A) \end{aligned}$$

于是

$$\frac{r_k^T A^{-1} r_k}{r_k^T r_k} \frac{r_k^T A r_k}{r_k^T r_k} \leq \frac{\lambda_n(A)}{\lambda_1(A)} = \left(\frac{\lambda_n(A^2)}{\lambda_1(A^2)} \right)^{1/2}.$$

题目4. 使用SD算法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 20 & \\ & 1 \end{bmatrix} x = 0,$$

实现时,以 $x_0 = [1, 5]^T$ 为初始假设, 并绘制中间近似值 $x_k (0 \leq k \leq 10)$.

解答. (代码见Problem4.m)




图 2: 中间近似值 $x_k (0 \leq k \leq 10)$